

HERMOLAI BAR-

BARI PATRITII VENETI ET

Aquileienfis Patriarchæ, in Dioscoridem Corollariorū

LIBRI QVINQVE.

Adiectus est Index eorum quæ hisce libris explicantur,
quem post Dioscoridis indices consul-
tò locauimus.



COLONIAE APVD
IOAN. SOTEREM, ANNO
MDXXX. MENSE FEB.

BEGNATIVS

LECTORI



N TIBI LECTOR OPTIME BARBARI COR-
rollariū libris quinq; tandē absolutū emittimus, quos non dubito
tantō tibi gratiores iucūdiōresq; fore, quō tibi magis iam pridem
persuasum forsitan erat, aut ab autore nō perfectos suo, aut ab ali
is interceptos, aut apud Hermolai fratres situ squaloreq; obfisos
atq; capite diminutos latere. Sed & ille iandudum cōcepto operi
fastigium imposuerat, & sartum tectum, quod aiunt, uel ad libellā
exhibuerat; & Didymus Fertinus eius anagnostes diligenter ad
modum asseruarat. Fratres quoq; ipsi, ut thesaurum ac gemmas condiderant. Nec sanē
fallebantur opinione sua: Sunt enim hi libri tales, quibus nihil eruditius, cultius, copio-
sius, ornatus, centesimū abhinc annum in lucem prodierit. Qui cum Latinam linguā
plurimū illustrent, Græcam etiā aliud agentes, non negligant. Qui quicquid ueteres
Græci Latiniq; scriptores in hoc olim genere prodidere memoriæ, completantur: ut ta-
men recentia quædam feliciter attingant. Accessit ad hoc singulare quoddam Barbari
iudicium, & candor animi quidā egregius in his aut æstimandis, in quibus autores ipsi
diuersi abeunt: aut arguendis, in quibus uel incuria uel imperitia peccatum ab aliis sit.
Quid dicam quanto studio, quantis uigiliis, qua industria in hisce libris usus ipse fuerit?
Nam ut Plinianæ castigationes non parua cum laude uirum ad rem literariam iuuan-
dam natum exercuerint: ut Aristoteles Latinitate donatus clariorem illustrioremq; illū
facturus mox est: sic sanē libri hi quinque ab illo perpolitī, & per nos tandem editi, in o-
mnes ætates illustrare illum, & patriam etiā atq; etiā possunt. Quæ cum reliquis
urbes domestica externaq; laude facile antecellit, tum ingeniorum copia & sublimitate
nulli Italicarū cesserit. Ex quo enim literæ Latinæ ac Græcæ reuirescere atq; effloresce-
re apud nostros homines cœpere, cum multi & clari in literis patritii nostri rates semper
uiguere, tum uero in hac una familia Hermolaus senior, Franciscus auus, & ipse deniq;
Hermolaus noster adeo præstitit, ut obscurare maiorū suorum penē laudem potuerit.
Quæ cum ampla & multiplex sit, in literis tamen iuandis & ornandis aliquantō am-
plior & uberior extat. Quare eō libentius id nostri præstare debent, quantō eorum inge-
nia longē alioq; excellent, & uirtutis ampliora præmia illis proposita sint. Bene uale.

HERMOLAI BAR-

BARI PATRITII VENETI, ET AQVILEIENSIS PATRIAR-
chæ, in primum Corollarij librum, PRÆFATIO.



VI POPVLORVM AC PRINCIPVM RES EGREGIE
gestas, aut quamvis aliam studiorum partem illustrandam suscipiunt, solent illud in
primis profiteri, nihil sibi maiori curæ esse, nihil æquestudere, quàm ut uitæ usuiq;
mori alium consulant. Hanc laudem atq; eorū animi propensionem, ipse etiam a pue-
ro semper admiratus, quantum mihi otij à priuatis publicis'ue officiis impetrare li-
cuit, id totum honestis artibus, ac liberalibus disciplinis perapiendis impendi. Nec sa-
nè quicquam antiquius unquam habui, quàm ut studio, curâ, industriaq; mea uitæ ho-
minum prodessem, deq; ea optime meritis uis existimarer. Asecutus id sim nec ne, alio-
rum malim esse iudicium quàm meum, illud certè pro iure meo testari possum, nos hac mente animoq; elaborasse, ut
quicquid cogitando, scribendo, consequi possem, id omne ad mortalitatis fructum & utilitatem transferrem. Quam-
obrem Themistium adolescentem penè ciuitate Romana primū dnoauimus: tum uerè dis omnibus Aristotelis eiuq;
interpretum uoluminibus, omnem operam atq; industriam adhibuimus. Quod opus infiniti penè laboris cum mihi
Plinianæ castigationes excussissent de manibus, his mox editis, tanto animi ardore, quæ remissem, ab soluenda su-
scepi, ueteraq; studia reuocauit, ut nō multa mihi uertenda superessent. Subijt interim non minor hisce omnibus cura,
ac nescio an maior etiam cogitatio Dioscoridis in Latinam linguam transferendi. Quem cum emittere uel hortanti-
bus amicis uellem, eadem animi inductione, quàm à teneris hauseram, promerendi opus omnium maximum ac labo-
riosissimum aggressus, Dioscoridis ac Plinij, & (ut ingenue fatear) omnis rei literariæ illustrandæ noua communi-
catione, suscepit: ut nihil uel apud Græcos uel apud Latinos ad hanc diem extet in hoc scribendi genere, quod non in ho-
sce commentariis regeberim. Ausus etiam non pauca ex recentioribus attingere, corruptis scilicet, & indoctorum
pertinaciā non satis adhuc explosa, Hosce libros Corollarij nomine nuncupare uolui, quod hi uelut appendix addita-
mentum' quæ essent legitimo iustq; operi tralati Dioscoridis: neq; uero Dioscoridis solum, sed meorum planè studio-
rum, scriptorumq; omnium. Sic enim mihi persuadeo, me quantum ingenio perficere, quantum industria elaborare,
quantum studio ac cura consequi potui, quantum deniq; iudicij in literis habui, in hosce libros contulisse. Qui si tales
erunt, quales ut essent, contendimus, gratulabor mihi & omnibus quibus hæc scripsimus. Sin uero aliud doctorū fue-
rit de his iudicium, non recuso, quin quantum de his libris, taneundem de studijs ac uigijs detrahatur meis, illud cer-
tè petitum ab omnibus uelim, eodem animi candore nostra æstiment, quo uel ipsi nostra scripsimus, uel nos de alijs
indicauius, uel ut illi perpendi examinariq; sua ab alijs uellent.

HERMOLAI BARBARI PA-

TRITII VENETI ET AQVILEIENSIS PATRIARCHÆ,

Corollarij liber Primus.

IRIS ILLYRICA

CAPVT I.



RIS ÆSTATE FLO-
ret. Folio arundinaceo.
Caulem habet cubita-
lem atq; rectum, simi-
lem asphodelo, sed mi-
norem duriorēq;. Sunt
qui hierida appellant:
unde consecratrix quo-
que dicta sit in Latino.
E rebus in unguēta ue-
nientibus, nihil in Europa nasci præter iridem, autor
est Theophrastus. In Illyrio commendatissima est, par-
te mediterranea, maximèq; septentrionibus exposi-
ta: &, ut inquit Nicander & Plinius, in syluestribus
Drilonis ac Narone. Laudatur iris radice tātum. Ma-
cedonica candidat. Illyrica duorum generum est: ra-
phanicis à similitudine, quæ & melior, rizotomos,
subruffa. Non improbat & Ptsidica Selgentiū. Fos-
suri tribus ante mensibus multa aqua circumfusa, hoc
ueluti placamēto terræ blandiuntur: circūscriptam
mucrone gladio'ue triplici cū legerint, protinus in
cœlum attollunt. Præcipiturq; ante omnia ut casti-

petant. Nullos cultus exigit, nisi quod ablaquearam
reficcare solēt. Tractatu pustulas ambusti modo fa-
cit. Tere dinibus non sicca modo, sed in terra quoq;
celerime infestatur. Ostendit nobis iridem in horto
suo o felix Sophia Padug, re presentabat eius flos pru-
na perquam matura odore, ob quod mire appetit à
formicis. Radicē quoq; uidi ruffam extra, intus per-
candidam. Genus unum eius troglodyticum appel-
lant: quam qui manducauerit, uinum quamvis co-
piofo eo hausto nō obolet, ut Aphricanus scriptum
reliquit. In Paulo non troglodytin sed astragalitin le-
gas in pastilli compositione, pantolmij uocati. Phil-
lus flores iridis lycos uocari tradit, quia labiarum
lupi specimen reddat. Apollonius Herophili discipu-
lus irin ex Elide ac Cilicia probabat. Est & orbiculus
pastillus'ue iris appellatus in medicina: is ex croco,
alumine myrrhaq; conficitur.

ACORVS II.

A
Corus & acor, folijs iridis, sed pediculo lon-
giore. Radices ei Dioscorides subalbidas, Pli-
nius nigras minusq; uenosas reddidit. Ipse
rubentem intus uidi, foris colore inter nigrum acq;
can

candidum. Raram inuentu falſo tradit Apuleius, nec niſi cum flore emiſerit, cognobiliſ, locis cultis, & horis pratisq; naſcente, legenda Auguſto meſe, aphrodiſiam & ſanducē nauticam, & ſingentianā, alio codicē, radicē nauciā, & ugentianā, & piperapiū uocatam: ut deprauatum in Dioſcoride quis putet piperacium, pro piperapiū. Quandoquidē apes, ſuſpēſa in uaiſis eaſq; herba, nunq̃ diffugere, idē autor prodiit reliquit. Arbitratur & ea parte mendā eſſe, qua in Dioſcoride aſpectione appellari legiſ: aſplenon ueniū exiſtimat, q̃ radix acori lienē comminuat. Optimæ Ponticæ, poſt Galaticæ, mox Creticæ candidiores Ponticis: ſed primæ in Colchide iuxta phaſin amnē, & ubicunq; in aquoſis. Recētiſ ſus uirtus maior q̃ uetuliſ. Sic cātur utribuſ in umbra digitalibuſ fruſtis. Sunt qui radicē ruſci acoron uocent, proinde ut hanc nōnulli acorq; ſylueſtre appellare malint. Acoro flores aureos croceos uē attribunt. Semē ſpiſſum atq; glicēſ non ſine odoris gratia. Haberi ſerunt in Chio, Helleſpontio, & Euxino mari radicē acori ſub rubentem, ueniſ indigneſcus neruoſus, prætenuiſ & candidiſ: eaſq; indigenſ iris loco uti.

M E V.

III.

MEu Græci mēon producta priore ſyllaba, nō diphthongo ſed uocali longa, ex Galeno. Genera eiſ duo: nobiliſ Athamantiū, ita dictum q̃ ab Athamante inuentum ſit, ſiue quod laudatiſſimum in Athamante reperiatur. In Italia nō niſi à medicis ſeri ſolitu, ſoliſ aniſ, caule interim bipedalī, radicibuſ multiſ et obnigris: alterum ruſſiſ. Eſt & geum inter herbaſ longe diſtans à meo, radicales, ut inquit Plinius, tenuēſ & nigraſ habent, & beneolent. Pectoriſ & lateriſ doloribuſ quæreda, cruditatibuſ quoq; diſcutiendiſ, iocundo ſapore. Sit tamen Pliniani codiceſ, in quibuſ gethin hæc, non geum ſcribat, quā recte neſcio.

C Y P E R V S

IIII.

Cyperus gladioli nomine apud noſtroſ, aliud eſt q̃ cyperuſ iſ, quem Latini radicem iunci, ut Dioſcorideſ hoc loco Columellaq; teſtant, uel iuncū quadratū, ut Corneliuſ. Cyperuſ pro gladiolo, ut Theodoruſ Gaza uerit, à Theophaſto peculiarem habere quandā æqualitatem in caule deſcribitur: radice tamē inæquali, partim craſſa carnoſaq; partim gracili atq; ſurculoſa. Hanc & in altum agi, ideoq; contumacē emori atq; uelli. Naſci ē latere huiuſ radiculā, unde caulicuſ erumpat aliuſ. Sunt qui nō diſtinguant uicinirate nominis fallente, ſed diſcrimine multo ſeparant. Cyperuſ ſiue cypriuſ iſ, qui Latine gladioluſ, & xiphion à Dioſcoride ſuo loco diciſ, radice bulbola, laudatiſſimuſ in inſuliſ Creta, dein Naxo poſtea Phœnicie uſitur. Cretico cādor odorq; propinquuſ nardo, acrior hic Naxio, exiliſ Phœnicio, nulluſ Aegypto, nam & ibi prouenit. Tradunt non egredi Barbaroſ domibuſ, niſi ab hoc ſuffitu: uegetioreſ em ſirmioreſq; ſic fieri. Pulciſ huiſ radix, & quæ decocta, panem etiam gratiorem faciat, ut inquit Theophaſtuſ, unde ſumpſit Pliniuſ, pōderoſior utiq; ſimul ſubacta. Hoc ipſo nomine paluſtriſ alter cyperuſ ſiue gladioluſ oſtenditur, quē ſuſio meſe ad radicē ſecant præcipiunt: tertio die in ſole contineri, dum candiduſ ſit. Quoſdie autē ante ſolem occidenti in rectum referri, quoniam nocturni roreſ paluſtribuſ officiāt. Sit paluſtriſ hic, qui ſloreat uere cū uiola nigra, ſed utiq; poſt anemonem,

quæ timonia uocat, comitatuſ hyacinthiſ, & gladioluſ appellatuſ, an, quod magiſ puro, xiphion, Theophaſtuſ ſecutuſ, quærenduſ & æſtimandū relinquo. Eſt enim uaguſ & cōmune multiſ nomē gladioluſ: ſoliū ſimile nomini. At cyperuſ de quo nunc agitur, iunctū trianguli, ut Pliniuſ interpretat: ſit Celſuſ, quadrati ſpecieſ, iuxta terrā candiduſ, cacumine niger pinguiſq; proſiliſ: cuiuſ radicē cum oblonga eſt, cyperidē appellat. Lauſ prima Hāmōniacoſite cunda, Rhodioſ: tertia, Thracioſ, ſi Pliniuſ ſequāre: nouiſſima Aegypto, qui & confundiſ interſtiti: quoniā & cypriuſ ibi naſciſ, qui eſt gladioluſ. ſed & cyperuſ pro iuncto, diuſiſſima, uixq; ſpirāſ in Aegypto. Cæteriſ odor ipſam nardū imitantiſ. Nonnulli diſtinctioniſ gratia cypiron pro gladiolo, cyperon pro iuncto triangulari ſiue quadrato, nominant. Non deſunt qui pseudocyperuſ uocēt gladioluſ: de q̃ Pliniuſ ſemel, qd meminereſ, dixit: Ocyſſima omniū cypriuſ & pseudocyperuſ frutex, protinuſ em, inquit, ſloret, ſementib; profert. Quadratuſ & angulariſ, ad diſſectiam rotundū iunci, quē Schoenon Græci uocat, cognominatuſ intelligiſ. Penultimā cypri quandoq; diphthongo longa, quādoq; uocali breuē Græci ſcribūt. Dicitur hæc & neutro genere cyperum à Paulo. Habetur & cyperuſ Indica, quā Pliniuſ cyperin appellat, etiamſi quibuſdam exemplariſ cypera legitur. Non poſſum non mirari, quā obreſ Laurentiuſ Valla cyperum in Herodoſo ſiler conuerſerit.

C A R D A M O M V M

V.

Cardamomū Theophaſtuſ reſert alioſ ē Mediæ putare, alioſ ex India cū amaro arguendo & plurimū id genus aduehi. Simile amomo frutice toto prædicant, ſemine oblongo. Quatuor eiſ genera uiuidiſſimū & pingue, acutiſ anguliſ, fricantiſ pinax, quod & maxime laudatur. Proximū è ruſſo candianſ: Tertiū minutuſ atq; nigriſ: Peiuſ uariū & friariſ facile, odorib; parui, id qd ueriuſ eſt, uicinioſ eſſe coſto debet. Pretiuſ optimiaſt Pliniuſ in libraſ denarij. Recentioreſ Mauritiani hoc non cardamomum, ſed cordumēni, & ſylueſtre caruſ uocat. Cardamomi uero nomine genus aliud intelligunt, in geminiſ diuiſum ſpecieſ: alterum leniſ amplitudine, alterum ciceriſ obnigriſ, in quo granum albū ſit, guſtu mordaci: utruſq; odoratuſ. Quid quod officiāre cardamomū utitur alio, q̃ quod & Mauriſ & à Dioſcoride perſcribitur: dupliciſ ſit: gūminuſ & maiuſ appellanteſ? cui ſimile id ſemen ſit, quod uulgo o melligeta dicitur, prælatum uiribuſ.

N A R D I S P I C A

VI.

Nardū ſiue narduſ, in Thracia exili odore naſciſ, ſiue ut Theophaſtuſ ſcripſit, radicule potiſ quædā, imitanteſ odore nardum, ſed leuiter: quanq̃ Pliniuſ inuentū in Thracia nuper habā dicat, cuiuſ folia nihil ab Indica nardo ſpecie diſſentiant. Principatuſ in ugentiſ nardo apud ueterēſ ſtetit. Frutex eſt grauiſ & craſſa radice, ſed minuta, nigraq; ac fragili, quamuiſ pinguiſ, ſitum redolente, qualem cupreſſiſ, alpero ſapore, folio paruodentib; Cacumina in ariſtaſ ſe ſpargunt: Ideo gemina dote nardiſpiciſ & folia concelebrant. Alterum genus apud Gangē in totū reſciſ. Adulterā pseudonardo herba, quæ ubiq; naſciſtur, craſſiore angulariſ folio, colore languido, in candidū uergente. Sit hæc fortaſſe quam Dioſcorideſ ſamphariūcā appellat. Item ſua radice permixta, ut ſtibio ponderiſ gratia, & gummi,

gummi, & argenti spuma, & cyperi cortice. Pretiū spicē in libras denarij lxx. folioꝝ uero eius, quod maiora hæc habet, hadrospheron uocatur, denarij xxx. Sed aliud quod minora & meliospheron dicitur, denarij lxx. At eius quod minima, & ob id microspheron appellatur, laudatissimū ēst, denarij lxxv. Odoris gratia, omnibus maior, recentibus. Nardo color, q̄ in uetere auit, nigrior melior. Indica Syriacæ præferatur à Galeno, Nigrior & ualidior etiā nonnunq̄ Syriaca. Reliqua genera in mēione Gallici nardi montanū dicemus. Sed poscimus identidē, quæ sint illæ non uem species, quas nardū Indicū representare Plinius existimet: an Gangetis prima, ætialī ab legulis purgari & elui curiosissime moris sit: fortasse q̄ hoc sit aut nō dissimile, quod pharicon à Dioscoride Plinio, phariacō ab Atheno dicitur, gustu nardi omnino, sed resolutionē faciēs nēuōs cū alienatione mentis atq̄ spasmo. Aduersari aut̄ huic ueneno maxime cydoniā Philarchus prodidit. Notatu dignū à Dioscoride cæterisq̄ ueteribus, hardū cyperi odore cōmendari, à Plinio cupressi. Malim quidē libarū fuisse culpam: sed si Plinio tribuēdus error foret, affinitate uerbi lapsus esse, dicere, *καρυφαι* i. *cyperi* pro *καρυφ* legentē. Neq̄ dici potest contrā, decepti esse Dioscoridē, non Pliniū: quādoquidē cyperū idem ipse Plinius odorem nardi referre alio loco scribat. Aduertendū est & illud omnia nardi genera herbas esse, præter Indicū. In ijs probatio una, ne sint fragilia & arida potius q̄ sicca folia. Hirculus porō qua uiriari nardū syncerā dicūt, nō grauitate odoris modo, sed similitudine etiā nonnulla animalis eius, nomē accepit: Syriacū *ῥῖν* uocat. Illud, ne quē fallamus, noscendū: Syriacū nardū duplicis esse generis, unū in India, sed parte montis in Syriā spectante, quā Plinius sub Indicæ uocabulo cōplectitur: alterū in orbe nostro, id est Syriā, Ciliciāq̄: hoc aliqui Gallico præponūt: aliqui contrā, Gallicū Syriaco talī præferūt. De Gallico mox dicemus. Galenus Indicā hardū accipit, quociens absolute *σάκων*, id est spicā nardi nominat, quasi spicā cæteræ nō habent, sed herbā duntaxat, quē admodū & Plinio uidet. In Cedrosia q̄q̄ nardū est, sed sub Indicō cōtineri credimus.

NARDVM GALLICVM. VII.

Nardum Gallicū, siue ut Græci appellāt Celicum, laudatur in orbe nostro post Syriacū, quippe qd̄ Syriaco sit leuius, neq̄ multū ab Indicō differēs, ut Plinius existimat. Pretiū siclis xxi. Hoc & aliq̄ uocari Dioscorides alpinis populis tradit. Credo saluicā legendū, à uicinitate puro saluicæ, quā nostri soliosam quidē, sed breuē, & que neq̄ nō possit, describūt. Radici numerosā coheret herbæ uerius q̄ flos, deſa, ueluti manu pressa, breuiterq̄, cespes sui generis. Pannonia gignit hanc, & Norica, & alpinū aprica: urbiū, Eporediæ, tanxæ suauitatis, ut metallū esse coepit. Vestibus interponi eam gratissimū. Seruius hanc uulgo appellari orci tunicā putauit. De hirculo herba, cuius Dioscorides hoc loco meminit, superius mox absolui.

NARDVM MONTANVM. VIII.

Nardus montana, quā & Syriacam & Ciliciā uocare possis, à Galeno *νυρίν* appellata est: nec priuatiū à Plinio describitur, sed inter nardi genera promiscuē refertur.

ASARON.

IX.

Asaron præter cæteras differentias molliora quoq̄ folia obrinet q̄ hedera. Radice Gallici nardi: semine saporis calidi ac uinosi. Bis anno floret, autumno & uere. Optimū in Ponto, proximum in Phrygia, tertium in Illyrio. Effoditur cum mitis folia, situm ocysissime trahens ac senescens. Error librariorū est in Plinio, qui alicubi iuber uideatur sic candum in sole, alicubi in umbra: nisi quis posteriorē locum ita legat: Non q̄ sic candū sit in umbra, sed q̄ situm celerrime in umbra sentiat. Nō ignorandū baccharē aliud omnino esse q̄ asaron, etiam si medicinas, quas Dioscorides asaro dicitur, Plin⁹ apud nos bacchari magna ex parte acceptas retulit: nec mirū, cum sit eorum natura uiribus & effectu proxima. Cæterū perpersam, siue perpersam (nam utrunq̄ legitur ut in baccharē latius exposui) nō asaron ut Dioscorides, sed baccharē intelligi secundum nos uoluit. Contrā quodq̄ descriptio asari à Dioscoride facta, congruit bacchari multis partibus: Primum, q̄ odor ei ciuamomo uicinus redditur, ut asaro: deinde, q̄ gracili nec humidō solo prouenit, ut asaron. Alioqui reprehenduntur à Plinio quī nardū rusticum radicē baccharis appellauere, quia nardū rusticum proprie sit asaron. Quod uero Dioscorides coronamentariā esse dicit herbā asaron, id bacchari potius q̄ asaro cōuenit: propterea q̄ asaron uocari scribunt, quoniam in coronas atq̄serta non addatur. Legebatur in Dioscoride Romanos asaron peritresam uocare: nos perpersam aut̄ perpersam ex Plinio correximus. Autor is eandem opinor herbā xxi. libro perpersam, xxvii. perpersam nominat. Codices etiam uino sunt, in quib⁹ nō perpersa sed sparsa legitur, ut existimo, corrupte. Legitur & asarus, non pro asaro, sed pro asarō mēdose. Quid enim incolumē relinquit medicos impetitia? De asarō agemus suo loco.

PHV.

X.

Phu Creticū nardū nonnulli uocant. Radice uiliosa imitante q̄ uiuum pedes. In Plinij codicibus corrupte aliphu pro phu legitur.

MALABATHRV.

XI.

Malabathrum Plinius arborē Syriæ affirmat esse, folio conuolutō, arido colore. Fertilius in Aegypto, laudatius in Indiæ paludibus, sine radice fluitans. Improbant candidū. Celerrime situm in uetustate sentit. Odor in uino sufferuesciti antecedit alios. In pretio quidē prodigio simile est, à singulis denarijs ad tercentū peruenire libras, ut idem inquit autor: oleum autē ipsum in libras lxx. Sunt codices in quibus, non oleū sed solū scribatur. Si hæc uera sunt, malabathri gemina conditio: alterū palustre, ut Dioscoridē uidetur: alterū ex arbore nunc medici nec primū, nec secundū, sed tertium malabathri genus nouere, appellatū à Mauritanis suis Tembul, cuius surculi cum folio, quale arbuti siue lauri est, pollicares plerumq̄ ad nos ferantur, & fructus quoq̄ laurinis baccis similissimū. Omnia tria genera folij appellatione significari consueuerunt, sed priora duo maxime. Foliatum inde unguentum, quo fecundas loci pleres oblini Romæ solitas Galenus auctor est. Græci

quæ nunc cassia fistula dicatur, colore rubro nigra, laminis intus carnosis, quas parietina discludunt, semini bus siliquæ ceraræ, ad descendentem bilem usum mire ualens, sed pro lignea siue aromatica, cuius una quoque species, ab ipso Dioscoride *ἡ καὶ τὴν ἐπὶ τῆς* id est lata fistula nuncupari cernitur. Cassius certe Felix, si modo liber eius est qui circumscribitur, appellatio fistulæ simpliciter, cassiam odoratâ, siue aromaticâ intellegit. Inuenio tamen apud Græcos autorem, qui Paulus et Oribasius ita loquuntur in dixerit: Cassia siringæ aduersus fluxum bilem prodest, et item eos, qui præter naturâ pallefacti item anginas, et lateris dolores et peripneumonias. Hæc Paulus. At Oribasius refrigerari ea in quæ cinoris calorem intemperatos. Hæc recentiores Græci calidâ, et humectâ abscessu primo perhibent. Idem fere Mauritani de cassia qua bilis per aluuium detrahatur, propterea cathartice dici potest: nam aromatica siue lignea ex calcis, atque siccat abscessu fere tertio. Porro cassia cathartice partim in India, partim in Aegypto nascitur, folio iuglandis. Alexandria sibi usum Poticus Facinus retulit, dum ista proderet. Siliquas habet prælongas ac teretes, utrinque fastigiatis, duos fere pedes præceras, carne intus nigra, gustu prædulci, sed planè medicato, ligneis distinguendis membranis, et ossibus siliquarum intercurrentibus, ut prædixi. Eligunt ponderosam, collucentem, plenâ, et quâ si concussis, inclusa intus ligna non sentiant. Negociatores in hortis Alexandriæ nascentem præferunt. Iam et Asiae communis facta dicitur. Seritur et apud nos, uerum frustra: quia nec ad frugem peruenit, et celeriter opprimitur. Quid sit myrrha cassia Hippocrati, cuius semel laudat uolumine neceminarum morbis dicat: *ἡ καὶ τὴν ἐπὶ τῆς* inquit, *καὶ τὴν ἐπὶ τῆς* haud scio reddere: nisi quis pro smyrri herba ceperit, cuius cibo mestrui foeminarum iuuari constat. Strabo cassiam odoratâ et stagnis colligi non solum ex arboribus, in Arabia Felice, quodam in India, maiorem eius partem existimasse prodit.

CINNAMOMVM.

XIII.

Cassiam Theophrastus fruticem magnitudine salicis Amerinæ prodidit, sed multis furculosis brachiata ramis, cassiore quæ cinnamomum famento: præterea neruosis, et solo cortice comendabilem, qui ei cutis tenuitate obducitur: neque aliter detrahitur, quæ si præfusa corio bubulo uingulas bicu bira, enati uermes erolerint. Cortice tunc intacto propter amaritudinem, odorisque acrimoniam futuro. Hæc iuxta cinnamomi campos in Aethiopia, Trogodytis permixta connubio, sed in montibus nascitur. Dissentit à Dioscoride Plinius. Theophrastus, ut arbitror, sequutus: quod Dioscorides crassum eius corticem esse scribat, illi cute uerius quæ cortice uestiri tradant, quæ conteri atque in cinnamomum leuari exinanitumque pretium sit. Amplius fruticis cubitos trium, ut idem Plinius existimat. Colos triplex: cum primum emicat, candidus, pedali mensura: deinde rubescit, addito sesquipedale ultra nigricans: quæ pars, inquit, maxime laudatur, ac deinde proxima: damnatur uero candida. Eligendâ recentem maxime, et quæ sit odoris mollissimi, breui tunica: fistula, et non fragilis, quæ plurima, minimum ponderis faciat: cæterę notæ congruunt: lactis uocant talem barbaro uocabulo. Alia est balsamodes ab odore dicta, sed amara: ideoque utilior medicis. Hanc esse, quâ Dioscorides zeger et Galenus gizer, Aëtius ozem uocant, haud multum absimilem quin credam. Nominat et mortoden Galenus speciem cassiæ, uiribus proximam appellatæ gizer. Nigra unguentis expetebatur. Pretia nullis tam diuersa. Optimæ in libras xl. cæteris xv. His addidere magones quâ daphnoidem uocant, si cinnamomum cognominatâ, pretiumque eius faciat ceco. Adulteratur styrace, et propter similitudinem cortice lauri furculis tenuissimis. Fortesque pachnoides eadem sit cassia, quâ daphnicin à mercatoribus uocari scribit Dioscorides. Fabulæ sunt, cassiam cinnamomumque nidis auium decuti plumbatis sagittis, aut circa palude squasidâ colligi propugnâre diro serpentium genere, ut Theophrastus ait, uespertilionumque, ut alij. Sciendum quod ubi nos in Dioscoride cõuertimus quandâ haberi cassiâ redolentem hircinũ uirus, Mauritani odorẽ porri trãstulerunt, *ἡ καὶ τὴν ἐπὶ τῆς* non *ἡ καὶ τὴν ἐπὶ τῆς* legentes: utra lectio sit uerior, experti iudicent. Nõ cõuehitur modo cassia præterquam rarissima, inter xylocinnamomi fasciculos quâ doginuenta, nigritiæ argumẽto. Cassiam Latini correpta priore syllaba pronuntiant, etiãsi apud Græcos fere oēs geminata consonante scribitur. Vergilius: Nec cassia liquidi corripitur usus oliui. Habetur et cassia odoratâ: genus herbe, ut in thymelæa siue poti? chamæla demonstrabimus. Aliud etiam genus est, quâ ætas nostra cassiam appellat, et cognomẽto fistule, ab aromatica lignea uel discriminat, ueteribus ignotam, perinde ut ferẽ nobis modolignæ: alioqui in nostro quondam orbe feri cepta, extremis imperij Romani margine, qua Renus alluit, uiuere in aluearibus apum solita: etiãsi color aberat ille torridus sole, atque ob id simul idem odor. Cæteris scire oportet, si quãdo cassiam siringa, hoc est fistulâ, in antiquis auctoribus legere contigerit, non pro ea capiendam esse,

quæ nunc cassia fistula dicatur, colore rubro nigra, laminis intus carnosis, quas parietina discludunt, semini bus siliquæ ceraræ, ad descendentem bilem usum mire ualens, sed pro lignea siue aromatica, cuius una quoque species, ab ipso Dioscoride *ἡ καὶ τὴν ἐπὶ τῆς* id est lata fistula nuncupari cernitur. Cassius certe Felix, si modo liber eius est qui circumscribitur, appellatio fistulæ simpliciter, cassiam odoratâ, siue aromaticâ intellegit. Inuenio tamen apud Græcos autorem, qui Paulus et Oribasius ita loquuntur in dixerit: Cassia siringæ aduersus fluxum bilem prodest, et item eos, qui præter naturâ pallefacti item anginas, et lateris dolores et peripneumonias. Hæc Paulus. At Oribasius refrigerari ea in quæ cinoris calorem intemperatos. Hæc recentiores Græci calidâ, et humectâ abscessu primo perhibent. Idem fere Mauritani de cassia qua bilis per aluuium detrahatur, propterea cathartice dici potest: nam aromatica siue lignea ex calcis, atque siccat abscessu fere tertio. Porro cassia cathartice partim in India, partim in Aegypto nascitur, folio iuglandis. Alexandria sibi usum Poticus Facinus retulit, dum ista proderet. Siliquas habet prælongas ac teretes, utrinque fastigiatis, duos fere pedes præceras, carne intus nigra, gustu prædulci, sed planè medicato, ligneis distinguendis membranis, et ossibus siliquarum intercurrentibus, ut prædixi. Eligunt ponderosam, collucentem, plenâ, et quâ si concussis, inclusa intus ligna non sentiant. Negociatores in hortis Alexandriæ nascentem præferunt. Iam et Asiae communis facta dicitur. Seritur et apud nos, uerum frustra: quia nec ad frugem peruenit, et celeriter opprimitur. Quid sit myrrha cassia Hippocrati, cuius semel laudat uolumine neceminarum morbis dicat: *ἡ καὶ τὴν ἐπὶ τῆς* inquit, *καὶ τὴν ἐπὶ τῆς* haud scio reddere: nisi quis pro smyrri herba ceperit, cuius cibo mestrui foeminarum iuuari constat. Strabo cassiam odoratâ et stagnis colligi non solum ex arboribus, in Arabia Felice, quodam in India, maiorem eius partem existimasse prodit.

CINNAMOMVM.

XIII.

Cinnamomum in partes quinque concludunt: præcipua bonitate tenuissimis, ad longitudinem palmi, paulo uel amplioribus: secunda proximis, breuiore mensura. Vilissimæ, quæ radice antecedunt, quæ ibi minimũ corticis, in quo summa gratiæ: quæ de causa præferunt cacumina ubi plurimus cortex. Ipse frutex duos cubitos altitudine amplissimus palmis minimus, quatuor digitos: crassitudinis, statim à terra sex digitis furculosis, arido similis: cum uiret, nõ odoratus. Folio origani, siccitate gaudens. Sterilior imbre, ceu contraria cæteris natura. Gignit quidẽ in panis, sed densissimis in uerbis rubis. Difficilis collectu. Verior sententia est, nasci in Aethiopia Trogodytis connubio permixta, nõ ut Herodotus, quo situ Liber pater educatus esset, ex inuisis rupibus, auiumque nidis peti, et priuatim Phœnicis: neque ut alij, in Arabia. Igitur mercantes illi à conterminis uehunt per maria uasta ratibus, sine gubernaculo, sine remis ac uelis, sed hyberno per brumâ, eurus tum maxime flâti bus. Primus his portus Gebennitarum Ocyra, siue Acila ut Strabo, Ptolemus Ocelis. Proditur uix quinto anno reuerti mercatores, et interire multos. Cõtrâ reuehit uiret et ænea, uestes, fibulas cum armillis ac monilibus. Ipsum lignum in fastidio est propter origani acrimoniam, xylocinnamomum uocant. Pretium in libras xx. Quidã cinnami (nam cinnamum dicitur) duo genera tradidere, cãdidũ, nigricãs: Et quidã

pre

præferebatur candidi. Nunc cōtra, nigrum cōmendatus autore Plinio, atq; etiā uaniū præferunt candido, certissimū argumētum, si sit scabrit, atq; ut inuicē tritum cōsumat, frictur & inhorrescat. Improbatur molle imprimis, aut cui albicat cortex. Ius eius à Gebannitaz rege solo proficiscit. Is edicto mercatu uēdit. Pretia quondā fuisse in libras denariorū mille. Auscū id parte dimidia est, incensis (ut ferunt) syluis ira Barbarorū: aut etiā forte fortuna, quoniā austri cam ardētis ibi afflare solēt, ut æstibus syluas accēdant. Coronæ ueteribus fiebant ex cinnamomo in terra filiauro inclusæ. Radicem eius magni ponderis auræ patet: imposita uidisse Plinius uenit, ex qua guttæ edicæ annis omnibus, in grana durabantur. Pseudo cinnamomus galenus cinnamomidem quoque appellari scribit.

A M O M V M XIII.

A Momū quidā ex India, aliq; ex Media importari narrat. E' uite Indica, quæ sit labrusca, existimatur nasci, frutice uenoso palmi altitudine. Carpitur cū radice. Manipulatineniter cōponitur. Procinus fragile laudat. Punicī mali folijs simile, nec rugulos, colore ruffo. Se cūda bonitas pallido: herbacēū petius, pessimumq; candidi, qd & uetustate uenit. Pretiū tuæ in libras scilicet lxx. friato uero amomo, xlviij. Nascit & in Armenia parte, quæ uocatur Ocene. Adulterat mali granati folijs, & gumliquo uo coherescat uæ modo, consoluatur se se. Est & quæ uocat amomis minus uenosa atq; durior, ac minus odorata, qd apparet aut aliud esse, aut colligē immaturū. Nec mirandū si quādo Plinius à Dioscoride nostro diffonat, quoniam sicut præta res, ita et notæ, & experimēta quoq; uariantur. Nequella medicē pars incertior, qd quæ ab alio orbe qd nostro petiuit, id qd & ratio persuadet. Amomū quale nūc officinæ præferūt fabulosa specie, nec odoris argumēto, nec alia ratione congruit cum eo, qd hic describit.

C O S T U M XV.

Costus & costū dicitur, & per diminutiōem à Strabone costariū. Huius radix in pretio, fructus inutilis. Plinius Indicū duntaxat uidetur nouisse costū, primo statim introitu amnis Indi in Parale insula compertū: duo eius genera faciens, nigrum, & quod melius eo iudicat, cādīdum. Pretium xvi. in libras singulas.

I V N C V S O D O R A T V S XVI.

Iuncum odoratū *χαινόν* Græci uocāt, & Hippocrates *χαινόν μωρὸν*, & *χαινόν ἀδύσμον* & flore meius *χαινόν ἀνθόν*. Cornelius Celsus iuncū rotūdum, ut ab angulari differat, cypero à Græcis appellato: Rotūdum & in Cāpania inueniri tradunt, utiq; minus polentem. In Arabia sanē cum calamo odorato nascitur, conuale quam dicemus, nihil aspectu differens à cæteris. Prouenit & in Syria Coele cognominata. Iuncum rotūdum uinofæ mordacitatis ad gustum fenicri perhibent. Pretium in libras denarij quinque. Notēdum uero Babyloniū, & teuchitin à Dioscoride pro eodē genere intelligi, non sic à cæteris, quipæqui teuchitin eundemq; nobilissimū, quē Nabathæa sit, appellant: proximum Babyloniū, pessimum, ex Aphrica, ac sine odore. Dicitur & læticus arbor siue frutex à Græcis *χινός*, non *χαινός*, ut quidam & petriobribus falsō interpretati sunt. Vulgaris porro iuncus, quo ad uiciliū nexus utimur, item rotundus & odoratus, non *χινός*, sed *χαινός*, unde fūnes appel-

laci. Recētiōres iuncū odoratū cū funario palustrisq; cōfundūt. Græci *χινός* & palustrē & odoratū schoenon uocāt, quorū tamē de odorato intelligi uolūt, schoenū. i. iuncū absolute nomināt. Alter; uero genus helis hoc est palustris adiectiōe discrimināt. Dicitur & schoenos mēsurā quædā, sicut altarus & parafanga, Barbarorū. **CALAMVS ODO RATVS XVII.**

Calamus aromaticus, siue ut Hippocrates myreplicos. i. linguētarius & odoratus, in Arabia nascens, cōmunis India atq; Syriæ est. In qua uincit omnis à nostro mari, statijs ut Theophrastus inquit, cl. Inter Libanū montem aliūq; ignobilē, nō ut Strabo & aliq; quidā existimauēre antilibanū, lacu Genesarethide, ubi conualis amplissima & pulcherrima: quam aulonem cognominant, sed in conuali modica propē itagnum, palustribus per æstarem siccatis. In eo tricenis statijs iuncus & calamus odorati gignuntur. Sed præstantior odore calamus statim ē longinquo inuitat. Mollior tactu, meliorq; quā minus fragilis. Araneum eius, ut ait Plinius, in fituilla florem appellant: magno Domitij errore in quadam Papinij poetæ syluula, non distinguētis haridinem saccæ fundentem, ab odorata. Calamo pretiū in libras denarij xi. reliqua probatio ut niger sit, Damnatūr alibi. Nobilior quō breuior & crassior, lentusq; in frangēdo. Succum eius claterio similem excipiunt. Legi & in Meotide odoratum nasci calamum, radice subalbida, et sine fitulibus, plena intus & amara, specie acori: de quo & falsi quidam sunt, acorum eam putantes. Quāto autem amarior, tantō & calidior est Indico. Vtrūque tamen genus acorum odore superat. Terebinibz ut acorum in cessitur: omnino que uicarium pro acoro est, ab Ionia, & Ponto, & Herculis columnis profususq; apud omnes, qui mediterranea colunt Aphricæ, ut si eadem non sunt planē, maxima tamē germanitate uisuntur, ut autores plerique tradunt.

B A L S A M V S XVIII.

Balsamū aliq; punice magnitudine reddunt, ramis frequentibus, semine terebinthi, colore, amplitudine, figura: quod & odoratius quidā lachryma sua prædicat, casamū & carpobalsamum uocantes. Ceditur sub canem, parte qua maxime uideatur esse prægnans, & caudice & cacumine. Sudor ē plagæ manat æstate tota. Sarmenta quoque eius & surculi odore præstantes amputantur, & ueneunt magno, alioquin grandesceret arbutula, nisi fuscide retur. Balsamū syluestre Theophrastus reperiri nusquam testis est: Omnibus odoribus balsamum præfertur: quondā in duobus tantū hortis, utroq; regio, altero iugerū xx. altero paucior, Hiericunta nominant: quanq; & palmetis consitum tanto questu, ut ludæis opes, ex opobalsamū uetigalibus creuisset Trogus prodit. Is humilipice, quidā cyathos terebinthos ut Strabo, quidā myrtho similem exere. Sed uici similiorem esse Plinio constat maleolis feri cepta. Impletq; colles, uincetq; modo, quæ per datæ non sunt. Tondetur, nitescitq; rastris. Intra tertij annū a satū fructifera. Folij tubertis (idgen) mali est, à Plinio reddi putat, sed mendosum in eo locum esse arbitror: nec tubertis scribendū, sed rutæ: nam & exemplaria sunt, in quibus ita legitur, folium proximum rubet, corrupte ut pleraque alia, pro rutæ. Alioquin Theophrastus & Dioscorides rutæ folio sed exalbidobalsamū describit. Pausanias nunc myrto, nunc

lampfuchio, à quo non per B, sed per P, balsamū pronuntiat. Id ipse in Arabia gigni scribit, arbore uipitis obfissa, quare morfu nemo extinguitur, quā siuc eo eo paste, noxiū uirus habere desinunt. Ab Hierosolymis captis ferere ficitus balsamū cepit, proceritas intra bina cubita subsistit. Arbori tria genera, capillatū, theriacū uocat: altes cabitū, incuruū, fruticolum, odoratius, ostracon: tertium eumeces, quia procerius leui cortice, huic secunda bonitas, nouissimi matheritio. Semen eius est uino proximū gustu, colore ruffo, nec sine pingui, peius in grano, q̄ leuius atq̄ uiridius. Ramus crassior myrto. Incidebat ante ferreis ungibus: sed quoniā ferro uitalia laderent, transijt usus ad uitruū & lapides, osseosq̄ cultellos. In cidentis manus artificii libramento tēperatur, ne qd ultra corticē desquamet laceffatū, succus lanis parua colligitur in cornua, ex ijs nouo ficitū conditur, crassiori similis oleo, & in musto candidus: Rubescit deinde, simulq̄ durefcit translucidus. Sub Alexandro & Theophrasti tēporibus toto die æstiuo unā concham impleri iussit: omni uero fecunditate, & maiore horto semicōgijs bisfenos, & minore binos. At Plinij æuo etiā singularū arborum largior erat uis. Ter omnibus percutitur æstatiuis, postea deputatur: amputatio ipsa & furculus decc. uenit: intra quintum demū annum, corticis etiā ad medicamenta pretium est etiā ante q̄ ligni. Ex hoc buxofum est optimū, quod est odoratissimū. Ex semine autē maximū, & ponderosissimū, mordens gustu feruensq̄ in ore. Lachryma debet esse pinguis & tenuis, modice ruffa, & in fricadō odorata cū austero. Secundus cādidat color, peior uiridis crassiusq̄: pessimus niger, quippe ut oleum senescit. Ex omni incisura maxime probatur, quod ante semel fluxit. Vitiat semine suo, ut uix possit deprehendi fratus: tū & oleo rosæ, myrti, resina, galbano, nequissime gūmi: quoniā ipsum quoq̄ inarefcit manu inuersa, & in aqua fidet ut balsamū. Quod cera & resina permixtum est, in carbone nigriori flamma detegit. Nā mentitū melle, contrahit muscas. Metopio adulteratū, in aqua circulo candido cingitur, nec aliubi seplaxat maior improbitas: quippe sextarius, qui mille denarijs uendente fisco emebat, mox ccc. tantū denarijs constabat. Xylobalsamū pretiū, in libras sex. Romæ in triphlo Imperatores Vespasiani arbusculā ostendere. Pleriq̄ in Aegypto nasci phibent, regione quæ nūc Solis oculi, siue fons dicat, quodā Heliopolis. Incidi autūno ad liquore, qui & oleū balsaminū uocat. Strabo & in Syria coele nasci prodidit, ualle illa fertilis q̄ libanū & antilibanū interiacet, iuxta lacū Genesartim, in Arabia q̄q̄ Sabgorū tractu maritimo. Admonedi sumus, Dioscoridē in huius mentionis calce dicere, xylobalami decoctum cum iride sicca, mederi capitis uulneribus. ἀνὰ δὲ τῆς ἀντιλίβανου, nos squamas detrahare conuertimus, ut uel porriginem intelligas. Est enim porrigo, ut Celsus ait, ubi inter pilos quædam quasi squamulæ surgunt eæ, quæ à cute resoluuntur, modo sine ulcere, modo exulcerato loco, uel quædam dum recēiores, de squamis fractorū ossium. Sed & caruncula quæ inter uiuam & mortuam ossis aduerti partem subit, expleura quod abfcescit, quasi resta tenuis & angusta, ut idē Cornelius testatur, squama id est ἀλπίς à græcis appellata est, liberum ætismaturis est.

ASPALATHVS, XVIIL

Aspalathus in Aegypto quoq̄ nascitur, spina syluestris, magnitudine arboris medicæ, cū dida flore rosæ: Cuius radix unguentis expetit. Idem frutex humilior in Syria & Nisyro, Rhodiōq̄ insulis prouenit: quā alij sceptrum eliceī, alij adipsatheon, alij dipsacon, alij diacheron ut Plinius, uel diaxydon ut Dioscorides, uocat. Nascitur & pluribus locis, sed nō perinde odoratus. Tradit in quocūq̄ frutice, sed in aspalacho amplius, coelesti arcu in eum innixus, quā uita odoris inenarrabile fieri. Laudatur colore ruffo uel igneo, & odore castorei, permutatur in libras quindecim. Sane p̄ Hispanias moliti & ad odores, & inter unguenta utuntur spina, quā uocat aspalathum: Sed ea uulgaris est, ex qua tullo nix implentur urnæ, radicisq̄ usus tantum habetur. Necdum cōperi sit idē uulgaris spina & copiaria, de qua in acantho diximus. Radice nigrā Hippocrates cū uocat, radicē Galeno significat aspalathi, Crisostomi Phocidis agro commendatissimam.

BRÏON

XX

Bryon hoc est muscus, uerbū ex uerbo, dicitur & Ipnon. In Cyrenaica puincia maxime probatur: secundū locum obtinet Cypriū, ab eo Phoenicium. Fertur & in Aegypto nasci, quin & in Gallia: nec dubitatur. Sunt & hoc noīe panni arctes muscoso uillo, quales & glandiferis solafere quæ uocatur ægylops, tert: non in cortice modo, uerū & ramis dependentes, cubitali magnitudine, sed odore præstantes. Cādidissimis atq̄ altissimis prima dignatio, proxima rutilis, nulla nigratibus, & in insulis pericrisq̄ nati dānantur, omnesq̄ quibus palmas, atq̄ non suus odor est. Ex bryo & balanino oleo expeditissimum, primūq̄ unguentum fuisse ueteribus, prædunt. Differentia hæc, q̄ Bryon aliq̄ arborum cani quidā sunt, ut dixi: Bryon uero populi candidæ, uua. Circa Cnidum optima ut Cariā, in sitientibus, asperisq̄. Secūda in Lycia cedro, pertinentē ad unguētū prædicat, Paulus & in picea uel larice Bryon nasci prodidit, à Galeno priore scriptū. Est & Bryon thalation, hoc est marinum, ut suo dicebat loco, muscus. Preliosissimū odoris genus est, & quod muscus uulgo nominatur ab Aëtio, ἰεῖς Paulo, sed & à Phocione grammatico recentiore, moscū huius odoratus capreg, seu quod idem est, dorcidis peregrinæ fanies, ex umbilico eius aut uomica. Gazellam uocat animal id barbari, ut ὕβα Hieronymi ad Demetriadē: hoc nōnullis significat muscus inquit & cœnanthe, ex peregrini muris pellicula. Sed muscus Hieronymo aliud nō est quā bryon, de quo hic agitur: nā & Plinius eādem ferē mentione de bryo & cœnanthe disputat. Quis autē sit peregrinus mus, odorata celebratur pellicula, nō uideo, nisi quis animal hoc intelligat, ex quo zibettū siue ut recēiores græci uocāt zapreion excipitur: q̄q̄ & cōpositionis quoddā genus est zapreion, ex animalis musco, agallocho & oriēali succino: hæc ipsa cōpositio etiam, nec uocari solet à græcis quibusdā, sed uox est Arabica. Inuenio & muscilion dici quandam herbā ab odore musci, ut consorcio, quoniā & dorcidia uocant eam, naribus uicinos & ferentibus accommodatam, ut Aëtius existimat, nisi quis pro dictāmo accipiat, quod & dorcidium appellant.

AGALLOCHVM, XXI.

Agalloch Aëtius & medicorū uulgus xyloloen, id est lignum aloen appellat, à nōnulla simili.

similitudine coloris aloës ut arbitror. Non animaduertio ubi de hoc genere loquatur Galenus. Rectiores graeci tradunt sub terra conditi soliti agallochon, non aliàs odoratum furug. ubi teredinibus computruit. Fastigia eius summa quatuor, Indicum Sapphicū ex urbe Sappho, Speon, & hygron, id est humidū, quod ipsum deinde in species quatuor cōcidit. Arabes nonnulli semen huius arboris esse uolunt id, quod haormiam ipsi uocant, similitudine piperis miuti, colore subrubus, quia propter & piperelam dixere. Agallochon Aëcius in thymiamate myreplico idē esse quod & tarum putat. De taro Plinius ex cassia inquit & cinnamī confinio cancamū & tarum inuehitur per Nabathæos, Troglodytasq; ijs uicinos.

NASCAPHTHVM XXII

Nascaphthon prętermissum a Plinio arbitror cōsulto, quia incerta esset natura eꝑ, ut alioꝝ quoq; pluriū, quæ ille orbi nostro tantū nouis cognita esse tradit, ut sericatum gabaliūq; Paulus & lacaphthon nominat. Inter ea, quæ a quibusdā in cyphi heliacū addunt: & corticē piceæ, uel alterius arboris existimat. Ego lacaphthon idē esse cum nascaphtho ratus sum.

CANCAMVM XXIII

Cancamum ex collimitio cassiæ cinnamiq; per Nabathæos Troglodytes confines aduehit. Qui cōsedere ex Nabathæis nomine solo cōpꝑtū Plinio. Necsum nescius laccā à barbaris hoc genus uocari aliā, q̄ quæ de purpuræ floccis conficit tinctoris. Est & guttū quoddā arboris lacca dictū, & tincturis utile. Nec an ea cancamū sit hoc, de quo agitur, satis habeo compertū. Democritus certe, si modo eius liber est qui de tingenda purpura circūferret: lacchan nominat inter colores, hoc & florē achaicū appellat idē autor, sicut florē Syriacū quod rhizon priuacim uocari tradit, ad eundē usum. Sit autē flos achaicus aut syriacus id, q̄d nos modo cremes dicimus: an diuersum, non constat. Paulus odoratū esse cācamum prodidit. Differt cancamū à cancano, q̄ cancanus herba est à Galeno dicta, à Dioscoride cacalia. Nam cauialis alia est, ut post dicet. In q̄ foedissime neoterici diffiuctuant, græcī lignū quoq; atidum cancanon appellant.

CYPHI XXIII

Cyphi urebant uespertinis omnibus ægyptiꝝ, maturinis resinā, meridianis myrrhæa erat miscella, ut Plutarchus inquit, sexdecim literis sacris contenta, ex melle, uino, uua passa, cypero, resina, selseli, aspalatho, myrrha, bitumine, iunco, bryo, calamo, utroq; iunipero, cardamomo, lapatho, quanq̄ lacaphtho fortē non lapatho scribendum sit in Plutarcho, ut ex ijs quæ in nascaphtho diximꝑ comprehendi potest. Confundebantur hæc nontemerē aut fortuito, sed præuentibus de scripto qui rationē & ordinem præcineret, quo quicq; loco, tēpore, mēsurā, coniiciēdum esset. Placuit uero numerus sexdecim, q̄ is equadrato quadratus existeret: talis n. linea circumcurrentes per oras, æqualē cum area sua mensum habet, de quo latius in libello dictū est, quem ex antiquis autoribus de Iside & Osiride condidimus. Sit & aliæ thymiamatis huius & pro arbitrio cuiusq; rationēs, sed due in medicina cognomētis insignibꝑ, heliacō & seleniacū, hoc ē solarīū & lunare.

CROCVM XXV

Crocomagma uerbum ex uerbo, sex olei crocini est: nam fœces unguetōꝝ magmata græci appellāt, & consperionē intelligit, cum *βίαια* dicit, errore libratorum *βίαια* pro *βίαια* scribentium. Sed nos immutare lectiōē antiquā ausi nō sumus, ideōq; mortarijs tingendis conuertimus, præsertim cum de mortarijs atq; croco mētionem quodā loco habitam a Plinio sciremus. Afferuatur pixidecula ē cornu. Acerrima croco uis tribuitur: ut illatum manus palme, continuo perueniat ad cor.

CROCOMAGMA XXVI

Crocomagma uerbum ex uerbo, sex olei crocini est: nam fœces unguetōꝝ magmata græci appellāt, & consperionē intelligit, cum *βίαια* dicit, errore libratorum *βίαια* pro *βίαια* scribentium. Sed nos immutare lectiōē antiquā ausi nō sumus, ideōq; mortarijs tingendis conuertimus, præsertim cum de mortarijs atq; croco mētionem quodā loco habitam a Plinio sciremus. Afferuatur pixidecula ē cornu. Acerrima croco uis tribuitur: ut illatum manus palme, continuo perueniat ad cor.

HELENIVM XXVII

Helenium enula siue inula, sed duplici natura. Folio serpylli, de qua statim post dicetur. Altera folio uerbasci exilioris, de qua nunc agif breuior hæc q̄ pastinaca est, sed torosior amariorq; & nisi temperatur liquido dulci, stomacho inimicissima. Sed plurius modis austeritate uicta, gratiam inuenit. Nam & uuis passis, & defruto, & melle subigi in pollinē tusa: & pinguibus quoq; caryotis, iā cōtoncis malis, sorbis, & prunis, aliquando pipere atq; thymo, illustrata maxime liliæ Auguste cotidianio cibo. Superacuum eius semen, quoniā ut Dioscorides meminit, propaginibus serit, modo quo harundines: magnisq; interuallis, neq; uolū minus quaternosq; pedum, quoniā spatiose fructit.

Helenium hoc posterius a nostris inulam appellari posse non uideo. Theophrastus inter uelenion, Aristoteles belention, scripsere, si modo liber eius est, qui de plantis a dāuorē Aristotelem refertur.

refertur. Belenium inquit delibutorium in Perfide uenenum erat, in Aegyptū & Palaestinam translatum, sine periculo mandi coepit. Hæc cōmentatio Græcis perierat, habebatur in Arabico, demū cōuerſa eſt in Græcum ſermonē à quodam ut ſerūt Maximo: propterea quādā in eo libro barbara fructū & radicū legūtur nomina, ut ſunt benteli, nenuphar, opinalis, & aliquot huiusmodi. Nenuphar pro nympha quæ de m capitur Arabiæ, ſed benteli & opinalis quid ſit, parū liquet: niſi ſunt opinari pro filphio intelligat, quoniam ſuc cū ex eo manare leniuſculū dicat, quē priuatim uocamus opon. Bentelos autē initio ſpica ta eſſe traditur, mox in arborē grādēſcere. Sed redeamus ad heleniū. Plinius hoc Helenæ lachrymis enatum reſert, dum gubernatorē Canopum m hæmorrhii ſerpentiſcitu exanimatū fleuiſſet. Hilaritatē Hippocratis teſtimonio facit, prædulcis in eo cremor. Radix contrita mures necat: cādida intus eſt, & dulcis, Dioſcoridi uero pallida. Laudatiſſimū in Helena inſuſa. Huius rami dodranteales à Plinio, cubitales à Dioſcoride feruntur. Addebatur in coronamēta folium.

OMPHACINVM XXX.

Oleum Omphacinum fit duobus modis, olea adhuc alba expreſſa. Cādidiū deteriuſ ex drupa (ita em̄ uocatur à Græcis Latinisq; priuſq; tenera elui ſit) ſam tum luteola, coloremq; demutās: hoc uiride Cato appellat, atq; utiſ? eſt. Eſt & omphacinum ſiue omphaciū ē uite, de quo poſt. Galenus oleum, nō omphacinū, ſed dulce fieri ex drupa ſcribit. Alterum uero genus quod ex immaturis albiſq; premitur & omphacinū & αμυγδαλιν appellari tradit, unguentis utiliſſimū ē Phaulia ut Theophraſto placet. Simile omphacino ſit oleum, ſi oleg ramus in cōdituram adſciatur. Qui buſcā natura ſoli, non conſiciēdi ratio aſtrictiorū uim, qualis in omphacino ſentitur, dat, ut Hiſpanienſi nominato. Omphacinū ab omphace deducitur, unde acor ex uuis Græce appellatur omphaciū, & acerba uua αμυγδαλιν & acerbiū mel αμυγδαλιν, ab eodem omnia uocabulo.

OLEVM EX DRUPA XXX.

Oleum ex Drupa fieri dulciſſimum Galenus teſtis eſt, utiq; ſi ex maxime drupa fiat, non ſi ex drupa tantū. Olei probi notæ apud Galenum ſunt, ut ſit q̄dulciſſimū, tenuiſſimū, puriſſimū, trāſlucidum, quodq; modico eius cuti ſuperfuſo, plurimū ſeſe fundat, & facile cōbibat. cuiuſmodi eſt, inquit, quod Sabina bacca premitur. Oleum cū aqua mixtum αμυγδαλιν uocatur & αμυγδαλιν: quanq̄ poſter? hoc Homero luſtrationē ſere ſignificat. In Baetris iuxta flumen Ochum effoſſa terra fons manauit olei, qd̄ quidem traditū ab ijs, qui Alexandri res ſcripſerūt: & Strabo credidit.

OLEVM EX OLEASTRO XXXI.

Oleum ex oliua ſylueſtri tenue, multoq; amarioris q̄ ex ſatiua. Viſle hoc ad medicamēta ferētantū: de quo alia quoq; Dioſcorides in ratione oleaſtri & oliuæ cōmemorat: aridiſſimū hoc Galenus inter olea deſcribit. Poſt hoc Hiſtricū, mox Hiſpanum: pinguiſſima, Libycū & Ciliciū. In pingui uero tenue Sabinū. Inter hæc media ſere natura eorū, quæ Græciā & Aſia & Cyclades mittunt. Pauſanias Tithoreum ē Phocidē cōmendat. Hiſpanienſi prætulit & Hiſtrico pingue lentitia; tenue perſpicuitas & puritas conſequuntur.

OLEVM CANDIDVM XXXII.

Oleum candidum, aliud ſpōte, ut quod ex oliua adhuc alba exprimitur αμυγδαλιν uocatum, aliud factitium, ut de quo nunc agimus.

OLEVM SICYONIVM XXXIII.

STRIGMENTA A' BALNEIS XXXIII.

Strigmenta hoc ſunt quod Græci ῥήγες & ῥήγες appellant. Id quod ex Celſo Plinioq; colligimus: Aurium ceræ ſordeſcal Græci uocant Cypellās. Rhypon Iulius Pollux pro cera quoq; ſigilari acceptū quandoq; tradidit autoribus: niſi quis typon nō rhypon in Polluce ſcētiſet. Sed & apud Ciceronem in epiſtolis ad Atticum rhypos ſcripti eſt pro ceris ſiue formis unde ſigilla fingerbātur, fortaſſe à ſitu uetulaſtis appellatas, ut Plinianū quoque il lud: Expreſſi cera uultus ſingulis diſponebant amariſ, ut eſſent imagines quæ comitarentur gentilitia funera, deſuncto aliquo totus aderat familiæ eius, qui unquam fuerat, populus.

STRIGMENTA PALAESTRITARVM XXXV.

Strigmenta hoc genus aliud nō ſunt, q̄ puluis, qui luſtātium corporibus inſpergitur, & oleo ſuperuenit. Hæc pulueris inſperſi à Græcis λεῖπιδεβατ, puluis ipſe γυμν. Cum ipſo tequē Plautus, puluiſculo conuerſam. Et geometricum eſt puluiſculū. Palaſtris quidē optimū ē Nilo ſabulū, tenuiſſima ſui parte: Oleum quo luſtaturū peritunde bātur, αμυγδαλιν dicitur & πικρῶ, quanq̄ πικρῶ proprie cœnum eſt atq; lutum ceramēti pexmixtū: qui ſi ſudor acceſſerit, γυμναſτιον uocant ab ijs qui nimis Attici uideri uoluit, autor eſt Galenus. Locus in xyſtis huius operi dicatur, priuatim γυμναſτιον appellat Virruo.

STRIGMENTA A' PARTIBVS

GYMNASIORVM XXXVI.

Strigmenta à parietinis & à palaſtra ſignificat Plinius exiſtimo, cum ita loquitur: Vſum olei in luxu tam uertē Græci, uiriōſi omnium genitores, in gymnafiis publicando. Notū inquit eſt, magiſtra? honoris eius, octogenis ſeſtertijſ ſtrigmenta olei uendi diſſe. Itē: Quin & ſordes inquit hominis, in magnis ſecere remediſ quaſtuoforum gymnafia Græcorū: quippe ea ſtrigmenta molliunt, cal faciunt, cōplent ſudore & oleo medicinā faciētibus. Item alibi: Et in gymnafiis inquit oleū cōditur odoribus, ſed uiliſſimis. At ſtrigmenta ſtatuis gymnafiōſ detracta, in quibus Galeno autore multum olei cōburebatur: quia puluere inquit carerent. Et cum grugine permiſta colligerentur, acrioris naturæ quam ſtrigmenta cætera, noſcuntur.

ELAEOMELI XXXVII.

Elgomeli ſuit ex iſſis oleis in Syria, tenuiſ reſina, ſapore mellis, unde nomen: non ſine nauſea emollit alium. Pugnatōres certaturi præſumunt ex eo cyathi. Plinius in maritimis Syriæ ſci prodiit, citanem Palmyra longe à mari abſit: forte non maritimis, ſed palmyris legendū: niſi quis locum, unde id excerptū, nō palmyris ſed almyris legiſſe Plinium exiſtimet: quod in tanto uiro dubitare nullo modo poſſum. Elgomeli medicinæ tantum gi gnitur: ſit hoc idē quod & aëro meli dicit, quaſi mel æthereum ac celeſte, quod ſacra ltera: Manna uocent, ut non planē contendo, ita certē propoſiſſimum ſum ut credam: ſed ita tamen ut intelligatur aliquod diſcrimen eſſe inter id quod mādi poeuerit, & id qd̄ medicinæ tantum naſcitur. Decerpi hoc Amyntas ſcribit

scribit unā cum ipsis quibus hæsit frōdibus, & in of-
fas pastillos uē, aut etiā orbiculos conuolui, ut cum
uisus postulat, in lignea pocilla, quæ tabaitas in Asia
cognominat, aliquo humore diluatur. Planē ab exor-
tu lyderis cuiusq; sed nobilissimè maxime, ut Plinius ex-
stimat, aur celestis arcus, si nō sequatur imbres, sed
ros, tepescat solis radijs, medicamēta potius q̃ mella
gignunt oculis, ulceribus, internisijs uisceribus do-
na celestia. Quod si seruetur, inquit, hoc siccio exori-
ente, casuq; congruat in eundē diem, ut sæpe Vener-
is aut Iouis Mercurij uē exortus, non alia suauitatis
usq; uis mortaliū malis à morte reuocandis, q̃ diui
necētis fiat: nisi hoc ut alia, fraus hominum per-
niciē corrumpet.

OLEVM CICINVM. XXXVIII.

○ Leū cicinū ē cici arbore fit in Aegypto copio-
sa, ubi sine igni & aqua sale aspersum expri-
mitur: cibus scōdū, in minimis lucernar, pro-
pter nimiam pinguiū dinē in epulū obfcurum.

OLEVM AMYGDALINVM. XXXIX.

○ Leum ex amygdalis neopū uocari legitur in
Plinio. Puto corruptū esse lectiōē, & aut ne-
topum ut Hippocrates, aut metopiū ut Dio-
scorides, legendū. Adde q̃ unguentū Aegypto
familiare quod metopium appellatur: ipsum q̃q;
de nucibus amaris conditur, ut post liquēbit. Paulus
amygdalinum, inquit, metopium quoq; dicitur, pro-
pter galbanum quod metopium in Aegypto nomi-
natur, & in oleum hoc adscitur. Aētius oleum hoc
etiā halinon uocari tradit, ab amaritudine uropinor.

OLEVM BALANINVM. XL.

○ Leū balaniū ē glande fit Aegypcia, quæ my-
robalanus quoq; dicitur. Simplex huius com-
positio diu fuit, de inde resina quoq; mixta.

OLEVM SESAMINVM. XLI.

○ Leum sesaminū Indis refertur acceptū, qui ē
castaneis quoq; atq; oryza conficiant.

OLEVM CARYINVM. XLII.

○ Leū ē iuglandibus iners & graue corpori est,
sapore ingrato: etenim siquid in nucleo com-
putruit, totus modus deperit. Nunc tota fere
Liguria Insubriaq; promiscuum & cibus & lu-
mini, haud magnopere molestum.

OLEVM HYOSCYAMINVM. XLIII.

○ Leum hyoscyaminum ex seminibus Apolli-
naris herbæ conficitur, quam hyoscyamon
Græci uocant. Cauendum in potu, quoniam
cerebri motus faciat.

OLEVM GNIDIUM. XLIII.

○ Leum gnidium ex gnidio grano, id est gni-
dio ecco fingitur.

OLEVM CNICIVM. XLV.

○ Leum cnicium ex cnicio herbæ, quā celebrant
Aegyptij, oleo tantum non cibo gratam. Ita-
lie ignota Plinij temporibus.

OLEVM RAPHANINVM. XLVI.

○ Leum raphaninū ex radice Latinis appellata.
Aegyptij raphanum maxime cupiebant fere-
re, modo licuisset, quia & quæstus maior q̃ ē
frumento redibat, & minus tributū pende-
bat, nullumq; copiosius erat oleum.

OLEVM MELANTHINVM. XLVII.

○ Leum melanthinum nomen habet à melan-
thio, quod est gich, quasi nigellam, uerbum ē
serbo dicās: nam melanchemon anthemis

est, quam modo chamæmilon uocari frequentius
animaduertit: q̃q; Plinius utrang melanthion appel-
lat, nisi lectio deprauata est, qd & crediderim.

OLEVM SINAPINVM. XLVIII.

OLEVM MYRTIVM. XLIX.

○ Leum myrtinū ē hoc ē laetifolia nigra sylue.
63
Strigij præstatiū, quā oxymyrsinē, aliq̃ cham-
myrsinā uocant. Aliqui acoronā similitudine:
est enim breuis & fruticosa, minore semine,
ut docebimus. Fieri & aliter oleum myrteum solet,
Tunduntur bacca asperæ calida aqua, de in coquū-
tur. Myrtas Cato baccas huius arboris appellat. In-
terest uinum an oleum facias. Ad uinū baccæ in arid-
itatem siccantur: ad oleum nō siccantur, inest huic
oleo uini quidam sapor, simulq; pinguis liquor, præ-
cipua uī ad corrigenda uina facis ante persusis reti-
net quippe fecem, nec præter purum liquorem tran-
sire patitur: dactylē liquatis commendatione mira
quasi comitem.

OLEVM LAURINVM. L.

○ Leum laurinum ē drupis, inquit, instituitur.
63
Nam drupa non olearum modo, sed alias q̃q;
baccas uocant, Græcos imitati, Ἀπυρτὺς ap-
pellantes. Quidā folium & corricem baccarum adhi-
bent. Laudatur syluestris & nigra baccis. Ex Delphi-
ca uero ad acopum & cerata utilissimum.

OLEVM LENTISCINVM. LI.

○ Leum lentiscinum ē lentisco fit, Græci λένισιν uo-
cant. Nam λένισιν iuncus est, de qua uicinīte
nominum sæpius scule decipimur. Durius hoc
paulo q̃ rosaceum, cætero eiusdem effectus. Nec mi-
hi planē certum est, an hic iuncinus potius q̃ lenti-
scinum interpretari debeam: quandoquidem & iun-
cinum rosaceo simillimum esse prædicant. Duobus
quoq; locis Plinius hac similitudine rosacei, altero le-
ntiscinum describit, altero iuncinum: alioqui saluum
aut lapsum affinitate, autorem illum diligentissimū
qui putem præsertim cum fieri possit, ut rosaceo fit
utrunq; natura proximum: nam & therminum, qd
ex lupinis constat, proprietatem rosaceo sororiam
habere, Plinius idem testatus est.

OLEVM TEREBINTHINVM. LII.

OLEVM MASTICHINVM. LIII.

○ Leum mastichinū ē mastiche, cuius species
64
multæ suo loco numerabuntur. Resinam len-
tiscinam Dioscorides appellat.

VNGVENTA IN COM-
MUNE.

V Nguenta Græci μύρα uocant à myrrha, siue
quasi μύρα ut Chrysippus inquit, q̃ infatuati
uino & crapula, ferē ut soleant unguentis. E-
tenim cum bellarijs & corollis unguenta se-
cundis mensis inferebantur, quod & Socrates apud
Xenophontem ut meretricium accusat, ut uestem,
ita odorem, alium pudicas, alium impudicas decere
prædicans. Lacedæmonij cerē unguentarios effie-
bant urbe, quasi corruptentes oleum: quemadmo-
dum & infectores, ut qui candorem uellerum accē-
sitis medicamentis inquinare uiderentur. Prohibuit
& Solon, ne quis unguenta uenderet. Proinde Sopho-
cles & Callimachus Veneri speculū & unguenta tribu-
unt, oleū Mineræ: q̃ illa uoluptati, hoc uirtuti natū
esset, Primus omnium Archilochus usurpauit unguen-
tino-

ti nomen, hoc est myron: etiam si res Homero quoque nota fuerit, oleum non myron appellatur. Vnguenta sane, quæ non de floribus sed de aromatatis conficiebantur, thymomata uocabantur, quod et Homerus nouit, cum *thymomata* hoc est delibutum eo genere lunonici corpus fuisse cecinit. Dicuntur et myromata, non myrisomata: Hippocrates odoramenta, hoc est aromata et suffituta appellauit. Nomen et à patria uinguentis est quibusdam, ut Panathenæicon Athenis sacrificari solitum, et Babylone Babylonicum. Quod Apollonius auctoritatem et præstantiam uinguentorum non locis aut regionibus, sed peritæ artificum et industriæ acceptam retulit: nam Ephesia quondam in pretio habebant, nunc exoluere. Habebatur et Alexandrina propter duas reginas opibus et luxu diffuentes, Berenice et Arsinoë. In Cortyna quoque diu laudatum est rosaceum: Berenices maioris temporibus, Oenanthinus Adramytti modice commendabatur, postea et Stratonice primum Eumenis nomen obtinuit. Syriacis præsertimque telino summa fuit olim autoritas, sicut et Asiaticis Pergamo, uingenturque occasione libanotion et thure commendantis, quod antea nusquam fuisse. Vnguentum porro pretiosum innatatum infusum uili: contra mel probum uitiosum melli additum, fidei. Nec omnia sane uinguenta omnibus placebant: quin sua singulis fere partibus corporis erant dicata, ut in bachari monstrauius. Infames huius luxuriæ Lydi sunt, à quo Sardianum mundum poetæ pro uinguentis capiunt. In mentione sunt et brethyon ex Lydio pro crasso et pro anthino quæ acceptum: et sagda siue psagdan: etiam si Nicander in uerbo sagda non uinguentum sed homines effeminatos et profligatos moribus intelligit. Alij uero suffimentum genus. Helæi celebrant ab inuentore dictum Plagoninum. Athenis uinguentum hemina quingentis pondi argenti uenibat: aliqui decem produnt. Vnguentum frequens, ut inquit Aristoteles, caniciem oblinetibus siccitatis uitio conciliat. Icesius, qui de odoribus scripsit, uinguentorum quod facit discrimina: deliciarum, quod et *χρυσον* siue *χρυσον* dicitur, et uulgare ac promiscuum, et fere palæstris dicatum, quod *ἀλμυρον* cognominant et *ἀλμυρον* et *ἐνδομυρον*: de quo uerbo Festus quoque apud nos unde *ἀλμυρον* et *ἐνδομυρον*, quos non striunctores et reuinctores uocant: à Græcis frequenter coniata, christæ ac pedotribæ nominantur, ut quæ à limo dictum epalima ob uilitatem scriperunt, errauerint, etiam si mediastini non medicorum ipsi medici reuingerent. Habentur et quæ sicca uinguenta hoc est xeromyra dicuntur: ut liquida, quæ hygromyra foeminarum auribus experita. Sunt et moschata, quæ alij moschemyra, Paulus moschelæa uocauit: in quæ sicut in Arabica quoque uinguenta, genus illud, quod arnabonem Paulus et Aëtius appellant, queritur: sed quid sit arnabo, non dum comperimus. De moscho siue muscho diximus alibi. In multa odoramenta uenit et camphora, quam Aëtius caphura nominauit, in eo uingento quod salca dicitur, axillis et auribus foeminarum dicato: nam et suffimentum moschatum in eodem Aëtio legas, in quod et sandala et nuces Indicæ desiderantur, comitante Orientali succino: Est autem nux Indica, fructus, ut Mauri putant, palmæ cuiusdam Indicæ præmagnus atque pinguis, cuius oleum butyro quoque præferunt, bonitate succi. Sandalorum uero tria genera: candidum, rubrum, lutum: camphoræ quaternum. Arboris ea summi est, in quibusdam locis medulla non aliter prouenit magno, quam si

terræ motus, et tonitrua multa fuerint: initio maculis rubentibus, post uel calore solis tosta, uel ignium candescit. Inuenio et alua et sarua et scylmaris folia siue scymatis odores, suffumigandis domibus idoneos. Primum in eo thymymate quod Cyrix Romuli ascribitur: sequens in eo quod ad Embolarchum refertur autore: Tertium in eo quod myrsephon uocatur. Scylma certe hoc etiam ad calliblepharon probatur Aëtio. Nominatur inter suffitus et masucha siue maluaphion à Paulo: sed ea compositio est non faculas simplex aliqua. Vnguenta sane, quæ ceram uel resinam uel aliquid huiusmodi recipiunt, non myra simpliciter, sed myracopa dicuntur, quoniam similia sint acopis: ralia sunt, amaracinum, et decamyron, à decem rebus unde constat appellatum, sicut à quingentamylon.

VNGVENTVM ROSA

CEVM.

LV.

Vnguentum rosaceum id est rhodinon Phaselii maxime diu placuit. Commendabatur et Neapolitanum, et quod in Sepasia Capræ diuendebatur, ut inquit Apollonius. A quibusdam addi salem, et anchusam, et rosaceum, et Dioscorides, et Plinius auctores sunt. Dissimulatum hoc fortasse capiendum est, cum ea sit uinguenti faciendū irregulari, quibus anchusa adiecta est, sal uti ne addatur. Simplicissima eius mixtura diu fuit, additis omphacio, flore rosæ, crocino, cinnabari, calamo, melle, iunco, salis flore aut anchusa, uino. Huc candidus color erat. Quimacerant in sole rosas oleo conditas, uitreis uti præcipiuntur. Vnguentum Cyrenis est rosa pretiosissimum Theophrastus prædicat: quoniam rosa ibi odoratissima fit, inuentum est, et rhodomeli facere, hoc est mel rosaceum, et aquam hydrosotam appellatam, recentioribus Græcorum.

VNGVENTVM ELA

TINVM.

LVI.

ELatinum est palma sit elate, quam nostri palmam abietem uocant: dicenda per se in loco. Lachrymam eius in uingentis misceri tradunt ad oleum domandum, id est, stygmatis uice: huius et furculos et lachrymam uocauimus. Abietem certe Græci arborem ipsam elaten et spathen nominant: lachrymam fere spatham. In Theophrasto nomen huius uingento phenix.

VNGVENTVM ME

LINVM.

LVII.

Melinum prælatum in Co. Et cotoneis malis et struthis fit. Quidam genus hoc tum demum in uingentum transire perhibent admixtis cyprino, sesamino, balsamo, calia, abrotano. Queritur uti ne in humidis nata sint, quæ in hoc parentur: ideo utilissima esse, quæ in Sicilia nascantur, minus probari struthæa, quam uis cognata.

VNGVENTVM OENAN

THINVM.

LVIII.

Oenan.

Oenanthinū in Cypro, deinde Aegypto præpositum est ex Adramycto. De cenæthe in loco agitur. Sic hoc unguentum idem cum anchino ab Hippocrate uocato, mulierib⁹ malis utile, an diuersum & anethinū potius, non liquet. Alioqui uidetur anthinum dici posse unguentum omne, qđ ex floribus componitur, lilio, narcisso, rosa, iride. Cu iulmođ maxime in Bœotica Chæronea fingebatur, commēdata Pausaniz. Vinū porro anthine, siue anchinon, aliud est qđ vinū cenāthinon, ut in uua cenāthe diximus. Vnguentum cenāthinon etiam cenantharion dici posse testis est Paulus, qui nō eō nominatū putat qđ accipiat cenanthem, cum sepe fiat sine ea, sed à uino, & floribus lilij. utebantur, inquit, hoc ueteres à balneis: spargebant eo mēsas, & nares linebāt, & contra pestilentia ualere iudicabatur, præsertim possidonianum cognomēdo mesopotamices

VNGVETVM TELINVM LIX

Telinū ē silicula id est scenogræco nomen, ratio nemq; habet. Addebāt huic & mel & sertā Cāpanicam, & cyprū & mellum & marz & amaraciū in Telo insula etiā Menādri ætate celeberrimū. Quid sit mellū Plinio, quod & in uina ficticia & in suisinū addi meminit, haud ita dum inueni, forte non mellum, sed mel in rjs locis scribēdum sit. Nā amellū de qđ & Virgilius & Columella, frutices fert apibus gratissimos, aureo ac luteo colore, ab imo foliosos, floribus purpureis, aspero gustu, cuius radices succo, ægrotō examini cum amineo uino dari p̄cipiūt. Dicitur uero amellū, quod pallores cū curua legāt prope flumina mellē, is Galliz amnis est. Quēdam o dum à Lemano lacu, Alemanni, ut Seruius existimat. Est & amilla flos apud græcos auctores quosdā, galli co uocabulo, herba ea quæ uocat anthemis, siue chamemilū, ut forte amilla, uel idē uel similis sit amello, nihil aileueram⁹, sed i mediū posuisse nihil offecit

VNGVEN. SAMP SVCHINVM LX

Sampfuchino calamus accessit, in Cypro & Mycenis optimū, ubi plurima sampfuch⁹. differt hoc Dioscoridi ab amaracino, qđ aliæ res in sampfuchinū, aliæ in amaracinū quæritur. dubitationē Pliniana uerba faciunt: E sampfuchin, inquit, oleū fit quod sampfuchinum uocatur, aut amaracinum.

VNG. OCIMINVM LXI

VNG. ABROTONINVM LXII

VNG. ANETHINVM LXIII

VNG. SVSINVM LXIII

Svinum omnīū tenuissimum est, hoc & phylli nō, & lilion, & lilyrum & lirinū, & liryum, ut Galenus, inquit, & Syrium quoq; uocabat, & crinomyron, unguinosum erat, hoc & ē lilio qđ sub diuo sole, luna, pruina, maceratū, fiebat, ipse quoq; succus floris syrium dicebatur atq; mel, lilia purpurea oleo faciendo, maxime præferuntur, quæ in Syria, & Pisi dia Pamphyliz Dioscorides cōmemorat. Hinc Syrium appellatum crediderim. Nunc omnes fere succi, unde syrapi uulgo, nam syrapi oliuæ condicæ genus est, Columellæ, Suisinum porro dicitur à suo quod liliū significat. Vnde Susa Persarū regia ut inquit, Athenæus, ob amēnitatē dicta fuerint. Theophrastus liliū Aeginecum, & ē Cilicia commendat.

VNG. NARCISSINVM LXV

Narcissinum ex narcissi flore cōponi desijt Plinij ætate, id de unguento eius dictū accipio. Nam de oleo narcissino medicinas idem Plinius persequitur.

VNG. CROCINVM LXVI

Crocinum in Solis Ciliciæ diu laudatū, mox Rhodi, additū huic & cinnabari & anchusa & uinū, Theophrastus & ex Aegina cōmēdauit.

VNG. CIPRINVM LXVII

Cyprium in Cypro cōmendatissimū, deinde in Aegypto, huic & abrotanū quidā adijciēbant, alijs panacē optimū, postea phœnicion ē Sydone fuit, mox Aegypto: Si nō addatur selaminū oleum, durat quadriennio: excitatur cinnamomo: uiris dicabatur cyprinū & rosa celi: colos cyprino cādus Theophrasto, uiridis Plinio, pretium in libris quinq; ē. Cypro canopica in ripis Nili nara, laudatissimū, Ascalone Iudææ proximū, in Cypro tertium, ita mutatur sæpe autoritas. Vnguētū ipsum à Theophrasto nō cyprinū sed cyprus qđ dicit. Nā cyperion ē cypero quē Cyclades ferunt insule, componit euetricon à Theophrasto nominatum.

VNGVEN. IRIVM LXVIII

Iriū Corinthi, postea Cyzici placuit, ipsa quoq; per se iris illyrica nobile unguētum facit. Sunt qđ unguentum hoc catirion quoq; uocent.

VNG. GLEVCINVM LXIX

Gleucinum dictū est, quia ex musto conditur, ab alijs mustū incoquitur uapore lento: Alij permittunt, sine igne cōsumatur oleo mustū alioqui non sampfuchum tantum admiscēt, sed pretiosiora quoq; odoramenta.

VNG. AMARACINVM LXX

Amaracinum duplex, uulgare, & quod priuatim componebatur in Co, cui & nomen peculiare inditū hedychrum, ideoq; seorsum agitur de utroq; qđ nō distinguit Plinius. Laudabatur & Melo insula, ut scribit Apollonius, hedychrū à colore dictū uideri potest, quoniam Theophrastus inficit hoc & radidit radice syria, quā chroma uocant, unde chromafius forte color nomen uulgo traxit: quāuis & aliam originē dicemus in saxifraga: Meminit & herba cuiusdam syriæ uocatæ Aristoteles, quā Theodorus suriam conuertit. In Columella radix syria genus quoddā, ut nōnulli tradunt, raphani significat. Et in carmine assyriam radicē uocauit, quā zyrium commendari cum lupino macerata cecinit. Ipsius quoq; amaraci cyzicene succo pretiosum unguētum fiebat: paucarū, ut ait Plinius, accessiōe specierū, melle, falo, flore, omphacio, agni folio, uel ut quidā legunt agno polea, panace. Plinius & alijs amaracum hac parte pro sampfuchō uolunt intelligi ex quo amaracina unguēta nominētur. Seruius grammaticus: Puer fuit inquit unguentarius Ammaracus qui casu lapsus, maiorem ex cōfusione odorem creauit: unde optima inquit unguenta dicuntur amaracina: alioquin amaracis proprie Galeno & Paulo est herba illa, quæ à Dioscoride parthenion uocatur.

VNG. MEGALIVM LXXI

Megalium propter gloriam appellatū ferūt, qđ ex cullis telinū ante se cātatissimum: alijs ut à Megalio inuētoe qui Siculus siue Athenienfis fuerit, existimant. In qua sententia & Aristophanes & Pherecrates & Stratio comici poetæ unt: huic nōnulli & casiam sciscēbant, huius proprietas

erats ut pectetur in coquendo donec olere desinat. Rursus refrigeratum odorem suum capit. Iulius Pol lux & metallicò à Metallò Siculo inuēto celebrat, nisi quis mendose pro megalio scriptum metallicon eximit.

VNG. SIVE MASMA HEDYCHRYM LXXII

Hedychrum & hedychroon à colonis hilarita re dictum, ut præfati sumus. Idē uidetur esse cum amaracino, nisi quod nomen hoc proprie habet in Co, ubi nobilissimū: hinc pro uerbio locus, nihil cū amaracino fui, ut est apud Gelium, inuenio & in theiacen regni hedychroon: quā diuersa eius compositio probatur. Andaracaron per uerse appellat Arabes. Ingre diunt in hedychrum, ut græcos sequamur, asarum, amaracum, aspalathus, carium, semē, calamus odoratus, iunci flos: xylobalsamū, opobalsamū, phu ponticū, cinnamomū, costū, myrrha Troglodytica, foeniculum, spica nardi, amomastiche, uinum uetus odoratum.

VNG. METOPIVM LXXIII

Metopium in Aegypto præferebatur quondam Cyprino, ablitit inde gloriæ Phœnice, hoc ē uilissimum erat.

VNG. MENDESIVM LXXIII

Mendesio colos niger, à loco ubi Mēdes hoc ē caper colit, ueteribus inter laudatissima & post. Deliacū in Aegypto prælatū quondam uel Cyprino. Celebratur & mendesiū uinū ex Aegypto, item mēdasiū ex Thracia Hippocrati contra renum uitia.

STACTE VNGVEN. LXXV

Stacte dictū quoniam à stillatitia duntaxat myrrha fiat colore pallido, suauitate mira. Sed amaritudine præcipua. Cōstabat & myrrha unguētū regibus Persicis dicatum, quod illi capite, ceu diadematis uice imposuit gestabant. Sed addebatur myrrhæ labyzos appellata, quam multo præciosior ē quā myrrham esse Dinon scribit. Appellatione unguētū Aegyptij stacte uenire auctor ē Athenus. Hippocrates pro eo quod ex acanthos uocatæ floribus conficitur, & pæderos ab alijs uocatur. Olei uero ægyptij uocabulo, idē Hippocrates cicinū significat, ubi uero adijcitur candidū Aegyptium pro Libyno capitur, ut Galeno placet.

CINNAMOMINVM VNG. LXXVI

Cinnamominū quod mel accipit, odoratū sitā nonnullis quæritur, pretia eius prodigiosa à denarijs xxxv. ad ceex.

VNG. NARDINVM LXXVII

Nardinum Galenus spicatum Romæ dici solitum, & foeminis præcipue diuitibus familiare prodidit. Nardus uero pisticus, siue unguentum de quo mentionem literæ sacre faciunt, probam & fidelē, & quæ adulterata nō sit nardū significat Hieronymo. Quidam à loco nomē id fuisse putāt. Nardinum ē Tarso Ciliciæ commēdatissimū: unguētū nomē est & nardus Cyzicena, in quod tamen nardū quādoq; non queritur nisi Gallicū. Ingre ditur & arabico. Iulius Pollux & Babylonici nardū pro unguēto uidetur accepisse.

VNG. MALABATHRINVM LXXVIII

Malabathrinum succo folij eius, nullo præte rea coniecto, nobile unguētū, pretium in libris. lxx. foliatū quoq; appellari dixim⁹: quā dicat aliquis nardinum quoq; foliatum uocari posse

quia folium malabathri quandoq; accipiat, quod & Dioscorides in nardino meminit. Paulus quādoq; foliatinum pro foliato appellat. Idem foliatum, spicatum, rasphaleon & Comagenum foeminis ad odorem tantum quæri affirmat.

VNGVEN. IASME LXXIX

Iasme si quis interprete tur, uiolaceum significat, quā uiolaceum illud quod triuale est, iaton potius appellat græci. Theophrast⁹ leucoiō, ut ipsam quoq; uiolam. Aliud hoc quā quod regale nominatur à Persis conditū argi Parthis. si feceris animæ uirus, multitudinem ciborū & ebrietate natū, accersita odorū commendatione, summouent. Vnguētum hoc & lasiminū & lasimeleoni & lasime dicitur: quæ uox admonet me, ut ex ea ferē uiola compositū intelligā, quæ uulgo lefeminum uocatur, distinctiones & harundines flores parietes in hortis opere topiario conuestiens, flore candido, præcipua suauitate, solum in uiridi nigrens, oblongum, fastigiatum: mucrone languido, magnitudine rosæci, sed angustum. Hoc uiolæ genus Persicum & Parthicum, & omnino peregrinum uocauerim, ab alba uiola nostratæ longo intervallo distans, ueteribus (ut arbitror) incognitū saltem Italiæ. Recētiore tria iasines sine iesimini genera constituit, albam colore, ceruleam, & in Aegypto luteā, qualē & in Venetiā nasci mō cernimus.

MYRRHA LXXX

Myrtha græce silyna dicitur, & zmyrna, ob d & notis duob⁹ zz. scribi solet à medicis, hæc & myrra uocat Hippocrates: minor altitudine, sed fruticosior est thure, ad v. tñ cubita cre scere arborem Plinius meminit, caudice duro intortorū, & crassiore quā hominis fura, & ab radice etiā tūre liqua sui parte, corticē leuē, proximūq; unedoni Andrachnē ue. Foliū olusatū, quidam oliuæ tradū: uerū crispus aculeatū extremitate ut iligneū. Theophrastus ulmeo simile, nisi quod suspicor librarios mēda sit, pteleas pro aleas contrahē scribētum. Scabrum alijs spinosumq; dixere, cætera similē cerebintho, aut iuniperō etiā gustatu, foliū etiānum rotundius, ueteris odoratior lacryma ē, ut in thure. Prima eius partitio, ut aliā stactem hoc est stillatitā, aliam plāsten hoc est sictitā m à Theophrasto nominatā sciamus, p̄mixta arboribus thuris nasci tradūt. Alij separatim. Sed & alijs Arabiæ locis proueniūt, & syluis quosq; laudata, quā à Troglodytis Sabæi trāscit maris perunt. Satia syluestri præfertur. Gaudet rastrois & ablaqueationibus, melior radice nuda refrigeratq;. Falsum est ē thuris arbore utriusq; gigni. Incidit bis, si idēq; cū thure tēporibus, sed à radice usq; ad ramos qui ualeāt: si dat sponte anteq; incidatur, stactē uocatā, cui nulla præfertur: post hanc fatiua, & in syluestri quoq; melior astiua. Regi Gebennit⁹ quartas partes myrrhæ pēdent. Deo nō dāt, quia & apud alios nascatur. Cōtēptā passim ac pluribus locis in folles confarcit, ipsiq; unguētarij probitates digerunt odoris & pinguitudinis argumētis. Aliiter nomina generū tradidit Plinius quā Dioscorides, hoc ordine: prima stacte cui pretium à xii. ad l. Secunda fatiua, cui pretium summum ad xxii. Tertia syluestris. Syluestrium genera complura, primūq; inter eas locus Troglodytica, cuius nucleo p̄itiū ad xvi. probat pinguedine aspectu aridiusculo, sordida & plane barbara, acrior cæteris, proximus Erythræ, quā intelligi Arabicā uolūt. Mineam uocat alijs, præcūm

tiumq; eius ad xvi. Huius species quatuor: staethea, Atramitica, Gebennitica, Adfiritis. In quibusdā exem-
plaribus nō habetur staetha. Tercius, Dianitidi: quar-
tus, Collatitiae: quintus, Sembracenae ad ciuitate regi-
ni Sabaeos mari proxime. Haec hilaritate insignis ē,
sed uiribus infirma. Sextus, Drusitidi. Est et candida
uno tantū loco, quae in Messalū oppidū confertur. Di-
uersa fit ad praedictis odoraria cognominata atq; ita, qm̄
pleriq; sextam in Plinio non seam legunt, haud con-
sistat: cui pretium redditur ad xiiii. In plenum proba-
tio myrrhae glebis exilibus, nec rotundis in concre-
ta, albicantis succi et tasecentis. Secunda bonitas, in
ius varia: pessima, quae intus nigra: peius, si sit etiam
foris. Adulteratur lentisici glebis et cucumeris succo,
amaritudinis causaficis ponderis, fupuma argēti. Re-
liqua uitia deprehenduntur, sapore gummi dente
lentescens. Fallacissime autem Indica myrrha, quae
ibidem quadam ē spina colligitur, multo deterior:
atq; hoc foliū peius affert India. Nascitur et in Gedro-
sia, ut inquit Strabo. Argillōsa uero terra crustōsa q;
prouenit in Arabia. Describitur ad Dioscoride et uoca-
ta cauialis, colore atro, retorrida, in pueris: conuerti,
maturitate insignis: quemadmodū et exoletos & ex-
oleta dicimus, quae Graeci ἰσχυρὴ et ἰσχυρα. Quidā cor-
ruptū locum putant, et ἰσχυρὰ legendū arbitran-
tur, hoc est praedurū atq; icabrum, quod et barbara
illa Mauritania Serapionis interpretatio secuta est: ἰσχυ-
ρὴ et ἰσχυρὰ etiam hilaris speciositas transferri potest,
quale m Sembracenā fuisse diximus ex Plinij senten-
tia. Haec, inquit, ante alias hilaris est, sed uiribus tenuis.
Sorum indicabitur & herbæ genus apud nos myrrhis
et myrrha nominantur: itemq; apud Græcos:
q; pro aromate illi quidē proprie nō myrrham, sed
myrram uocant.

MYRRHA BOEOTICA. LXXXI.

STYRAX. LXXXII.

STyracem Syria supra Phœnicē gignit, ad Gaba-
lae: huc ut Dioscorides scribit, Carabala et Mara-
thūta, et Cassiū Seleucia Pteriae cognominatæ
montē. Arbor et lachryma eodē nomine est. Haec illi
ex austro iucundior. Intus arbori similitudo harun-
dinis, succo prægnans. In eam serper canis ortum
aduolant pennati uermiculi erodentes: ob id in sco-
be fordescit. Laudatur et ē Sidone, Cypro: et Creta ue-
ro minime. Ex Amano Syriæ medicis, sed in ungenta-
tijs magis. Placet maxime purus. Improbatur colos-
cano situ obductus. Adulteratur cedri resina, uel gū-
mi, aut amygdalis amaris: omniaq; ea gustu coargu-
untur. Exit et in Pamphilia aut Pisidia prope Selgam
Lacedæmoniorū in eo tractu coloniā: sed acrior mi-
nusq; succosus, ut Aelianus auctor est post Strabonē.
Ibi syluam eius ligni fertiū fuisse tradunt, et quo missi
la cornes similia confecerunt: unde ortum, ut ton-
sillæ præparatæ, quas Græci alio nomine uroscos uo-
cant, styrares appellari consueuerint. Ibi caudicem
uermiculorum tamenta q; congerit ad radicē, dein de flu-
it humor, et scobi se ad radicem collectæ miscent.
Pars quæ nō leprosa modo sed terrosa quæ est, odo-
rator ut inquit Strabo est. In Aethiopia quosq; styra-
cem prouenire scribunt. Pretium optimo xix. Quali-
tatem eius non unam esse argumento sunt cogno-
mina in compositione medicinarum frequētia, chry-
matias, calamitis, apros, hoc est, ut puto, candidas.
Chrymatiam Arabes interpretantur eum, qui rarus

inuentus et gummi similia describitur. Idem calami-
tin: q; harundine sua mixtus ipso nomine significa-
tur, proliquo tamen accipiunt: et fastigia styra-
cis duo faciunt, siccum et liquidū, confusione magna:
q; aliquādo liquidū styracem pro myrrha staetha stu-
munt, aliquādo ex eadem arbore colligi utrumq; pu-
tant, liquidū atq; siccum. Aliunt Arabes styracem et Sy-
ria petentes in pellibus hircinis urere, ut odorum suo-
rum thuris et myrrhae faciat et acrimonia peregrini
ligni redimant. Idem petunt Elymeos, arbore bru-
tam, cupressō Susae similem, ex albidis ramis, iucun-
di odoris accensam, et miraculo ut inquit Plinius, hi-
storij Claudij Cæsaris celebratā, cuius Parthi folia
potionibus inspergant, odore cedri. Fumū eius con-
tra ligna alia remedio esse prædicant. Nascitur ultra
Phasim Tigrimq; in finibus oppidi Scinae, in monte
Scanthro. Sunt autē Elymaei Assyria gens, Susianæ
Persiæ contermina. Petunt et in Carmanos arborem
strobū, quā uino palmeo perfusam urunt, sufficit q;
recta. Nidor ad lacunaribus ad solū iocundus recipi-
cat, qui citra dolorem caput aggrauet, et somnum
agris conciliat.

BDELLIUM.

LXXXIII.

Bellium in nomine est, ut Galenus inquit, Scy-
thicum et Arabicū, Scythiū nigrius resinosi-
usq; Arabicum tralucidius et siccus. Vbi nos
Sambracenae conuertimus in Dioscoride, Saraceni-
cæ legebatur: sed nos Pliniū secuti sumus, q; de myr-
ra commentantes. Cæterę optionem de utrum
proben qui hac cognoscunt, ut obiter criticos effu-
giam.

THVS.

LXXXIII.

Thuris arboris altitudo ad quina ferē cubita, ra-
mis frequētibus, folio piri, sed multo minore:
coloris herbacei, modo rutę, leui cortice ut lau-
ro. Alij folium laurileuē q; prodiderunt alijs lentisco si-
mitem etiam fructū, folio subrutilo: nonnulli proxi-
mam terebintho faciunt: alijs terebinthū esse, et hoc
uisum Antigono regi, allato fruce. Sunt qui ex eadē
arbore thus et myrrham manare putent. Diodorus
paruam, Aegyptiæ spinæ albæ similem, folio salcis,
flore aureo, Placet Theophrasto et Plinio sententia
eorum, qui lauro similem tradunt: quoniam talis arbor
fuerit Sardibus studio, regum Asię delubro quodam
sata, suba rex contorti esse caudicis, siue ut placet So-
lino, uiminis scribit, ramis aceris, maxime Pontici: suc-
cum amygdalæ modo emittere, talesq; in Carma-
nia apparere atq; Aegyptio, cura Ptolemæos regnā-
tium confitas. E uirgis certe ad nos comenatibus
credi potest: matrem quoq; teretem et enodi frutice-
re trunco. Thus collectū et myrrha quoq; Sabotam
camelis conuehitur, porta una ad id patente in delu-
brum solis, quē Sabini uocāt, armatis ibi custodib;
tabella super struem posita, descripto quē modum
attulerint, quantiq; indicent: mercatores tabellis per-
lectis, pretium thure sublato deponunt: idq; absenti-
bus dominis sit. Sacerdotes partem pecuniæ tertiam
deo reponunt: reliquū dominis redeuntibus nume-
rant, auctore Theophrasto. Thus Spōtinū præter Ara-
biam nullis, ac ne Arabiæ quidē uniuersæ. Commē-
datissimū quod spectat ad Persas, ut Straboni placet:
cæterę in medio fere eius Atramytae sunt pago Sabę
ortum, qui caput regni est. In Sabota monte arduo,
ab hoc mansionibus octo distat regio eorum thuri-
fera,

fera, Sabaꝝ appellatur. Solum id rubrum elacteo traditur. Syluas: longitudo passus C. milia, siue ut alij, passus V. & L. milia. Terra ibi argillosa crustacea, raris fontibus ac nitrosis per Minæos proximū pagum euehitur, tramite uel singulis angusto: hinc & rus Minæum uocatur. Ius in thura esse familiarum dicunt, quæ ob id sacre dicantur: & cum arborem uulnerant, nec feminas congressus, nec funem pollui. Quidā promiscuum ius his populis esse perhibent in syluis. Alij per uices annos diuidi. Duplex eius uindemia: prior canis ortu, cortice, qui pregnans & tenuissimus tenditur, laxato plaga, non adempto: quod hęsit in arbore, ferro depectitur, ideo corticosum: tanta inter barbaros fides. Saucias arbores nemo custodit. Contrā Alexandriæ ubi thus rude interpolatur renouaturq; nihil tutum a fure. Autumno legitur ex partu æstiuo. Hoc purissimū & candidum, carphiati uocant. Sequens uindemia uerna: incisis per hyemem arboribus. Ruffum hoc exit, nec comparandū priori: dathiatum appellant. Nouelle arboris candidius, ueteris odoratus. In iusulis melius, in Arabia suauius: q̄q̄ in iusulis nasci negatur a Iuba rege: Masculū thus a specie testium uocari, sunt q̄ credant. Præcipua gratia mammofo, cū hærante lachryma priore consecuta. Alia miscuit se. Singula hæc manum implebant, cum tardus depecteretur. Hoc modo stagnatū & atomum thus uocabant. Minores guttas orobiam appellant. Inueniuntur tamen etiamnum guttæ quæ denarij: xxxix. pondus æquent: Conuehientibus thura capitale est digredi uia. Decimas deo mensura non pondere sacerdotes Solis accipiunt: nec ante mercari licet. Inde impensæ publicæ tolerāt: nam & benigne certo dieꝝ numero deus hospites pascit. Euehi non potest nisi per Gebanitas: horū regi penditur uetigal. Caput eorum Thonna abest à Gaza, nostri littoris laticæ oppido, lxxx. xxxvii. milia passuum, quod diuiditur in māsiones camelos: lxi. Thure qui conuehunt commutant: Si quid in itinere opus est queri in singulos camelos sumptus denariū de lxxxviii. ad nostrum litus colligit: Pretium optimi libra xvi. secunda, xv. tertia, xiiii. Resina picæ nō quacūq; adulteratur, sed gemma ea quæ interuenit ei, tam similis thuri, ut mixta uisui discerni nō queat: & inde fraus. Laudatur in thure candor, amplitudo, fragilitas, neu den tem recipiat potiusq̄ in micis frangatur. Omnia hæc cum Theophrasti tum Plinij temporibus. Thus aut à uerbo Græco θύω sacrificium significante flectitur, aut certe à tusis glebis ut tus Latine scribi debet. Porro cum dicat in Fastis Ouidius:

Thura nec Euphrates, nec miserat India costum,
Videri potest aliunde q̄ ex Arabia in urbem comporari solitum: forte quoniā in Carmania quoq; nascebatur, unde ad nos inuehi non poterat, nisi transmissio amne illo: aut certe quia Chara oppidum Arabiæ mundinarium, haud procul Euphrate situm erat sinu Persico.

CORTEX THVRIS. LXXXV.

⁹¹ Cortex thuris. Plinius medicinas nec thuris, nec myrrhæ priuatim exequitur: cum tamen styraçis & peregrinæ rerum multas describat: credo q̄ usus horum uagus & amplior esse uidebatur, q̄ ut loco uno includi posset. Arbor porro ipsa libanos & dendrobianos: lachryma uero libanotos à Galeno dicitur. Interim confundi usum cum com-

perias. Sophocles ut Galenus: Euripides contrā libanum pro lachryma, libanoton pro arbore thuris accipit. A iuuenē Aslyrio cui nomen esset Libanos, in hunc fruticem conuersū, dictā Græci fabulantur: quæ deos rudissimè colentem inuidi occiderint: hinc nihil esse dijs thure gratius. In Sabæis & larimnum odoris, ut inquit Strabo, præstissimū genus oritur: nec quale id sit demōstrat: quemadmodū nec herbā illam in ora littoralī eiusdem tractus nascentē, suauis simi odoris, fed qui celerrime uanescat.

MANNA THVRIS. LXXXVI.

Manna thuris est hypossima, quod Plinius mi cas consensu elisas interpretatus est, ubi de præuata dictione, mammās nō manna uollegitur. Id autē sit gestatū atterentibus se glebis, ut inquit Aëtius. Differt a thure manna, qd plus astringit propter corticis fragmenta quæ remanent: nam quod thuris chondros à Græcis dicitur, nos thuris granum interpretamur, secuti Plautū in Poenulo: Qui nullū, inquit, thuris granum faciscant. Est & genus mannæ recentioribus dictū, & à sacris quoq; literis acceptū, de quo superius in elæomelie. Manes certe uasis nomē est, & in cottabo pars extātor ac prominula, quā Sophocles aheneum caput uocauit. Erat autem cottabus siue cottabis, uasarium iacularis in conuiuio iactus conceptaculū, propositis uictori præmij quæ cottabica uocabant: id quod ei aculabantur, liquida erat materia, hoc est, id quod in poculo reliquum obmanerat. Latagæ itemq; latæx appellatur, in eo uase pars, quæ sonitum reddebat, percussa casu lataginis, phlastinx nominabatur. Sinistro cubito innixos dextra molliter & per gyrū iacere legitur erat. Cottabi mentionem in Plauto quoq; habes: Medici cottabum ex imperitia uocabuli, ut Athenæus inquit, potionem à balneis: siue ut Photion, uomitionem ante balneas uocabant, non pridem inuentam & sanitatis usu detestabilem, & ab Erasistrato uehementer damnatam.

FVLIGO THVRIS. LXXXVII.

Fvligo thuris Græce lignys, & æthalon, & ethal nominata: nam lychnis herbæ coronamentariæ genus est, utliquet, & alio modo scribitur. Dicit æthalida & rubiginem satorum lego: & à chymistis quoq; uideo æthalen uocari diuinum laticem, unde philosophicum illud pharmacum siue lāpiscō sistat: à quibuscūq; etresios & androdanias quoq; dictus, & aurum poculentum, & alijs nominibus innu meris, ut mazyss & per diminutionem mazygion & chalcyrion: alioqui maza æs ipsum Iudæis significat. Idem fuligines hemisomata, hoc est semi corpora appellant.

FVLIGO MYRRHAE ET ALIORVM. LXXXVIII.

Fvligo myrrhæ, styraçis, resinæ, lachrymarum omnium.

PICEA. LXXXIX.

Picea ueteribus est, quam Græci πικρα ferē uocant. Huius speciem Theophrastus & Plinius *πισύλον* hoc est pediferam tinea famq; appellant, quia totis paniculis non prima tantum in parte ut abietes, nucleos & minores & nigros habet: sed ipsas quoq; paniculas minores gracilioresq; sunt aut paniculæ nucamenta quædā, quæ è ramis arboris resinam fundentium callo squammatim compacti, li dependent præterq; larici. Negant aliqui florere

piceam, sed uice floris esse nucamenta illa, quæ *κινδύριον* Græci uocant, grôssis prædictis fici proportionem respondentia. Hac compressiora maribus sunt, ac minus resina madent, quæ forminis. Preuenit germinatio huius florem abietis, quia paulo ante solstitiū erumpit, diebus ferè xv. & ad proportionem fructificat post uergilias. Differt à pinu picea, quæ pinguior ac tenuior folio est, quæ min⁹ alta minusq; recta quæ pinus assurgit. Præterea consti minorē & magis argentē. Nucleos quæ resina perfusus obtinet. Vtriusq; foliū capillamenti modo prætenue, ac breui seta uillosum. Vtriusq; crassior dura, quæ ceu cu pressus. Materies candida & abiecti similior. Pinus uisus radicibus non repullulat. Picea repullulat, ut in Lesbio accidisse Theophrast⁹ scribit, incenso Pyraei mōtis nemore quod piceis sca tebat. In quo scire oportet Pliniū larici tribuere, quod Theophrastus de *κινδύριον*, hoc est, de pinu prodiit. Decuminationio quam Græci *δωδεκάτη* appellant, piceæ, pinos, abietis, palmæ, aliqui addit & cupressi & cedro, perniciem asferre perhibetur. Picea nauigijs expetitur. In Cypro præstantior etiam quæ pinus. Eadem & ad fabricas cæteras, malleos grandiores, scandulas, cupas & alia secamenta utilis, celerius tamen quam abies corruptipitur. Vsus & in carbone metallis argēti. Mōtes amat & frigora. Feralis arbor & funebri indicio ad fores posita ac rogis uirēs, iam tamen & in domos recepta tonsili facilitate, rami penē statim ab radice modici, uelut brachia lateribus inhaerent. Hec plurimam resinam fundit, interueniēte cādida gemma, tam simili thuri, ut discerni uisū nequeat: & inde Sepalsiariorum adulteria, ut in thure diximus. In Hispania & piceastrī sunt, ex quibus resinā, unde pix coquatur, colligunt. Pinus procerā est, hanc uerē sollicitatam octo cubitis longiorem effici Theophrastus affirmauit: ac ne sic quidē solidā radice, sed abrupta. germinatio cepta in pinu, sicut in robore abietis, intermittit: ideoq; turget, & terna edit germina: quod genus arbores *τρισσάκοντος* appellāt, ut qui ter inchoatum opus in lesbio multisq; repetat. Theodor⁹ Gazarē quāmolās interpretatur est, credo eum *τρισσάκοντος* non *τρισσάκοντος* legisse. Germinatio prima Februatio ineunte: quanq; in monte Ida serius ac ferē Idibus. Secunda mensē Martio, quā & omnis galla gignitur. Aprili tertia, paucioribus interiectis diebus, quæ inter primā secundamq; fuerāt: quanq; tempo ra hæc ad rationem Latinā trās lata non congruūt, ut in galla de robore disputauimus. Cædēt uere, ubi cortex tātum detrahendus est, ad opus in rotunda: nam ad quadrata, ubi germinatio deserit, & si ualidior queratur, etiam ubi fructum excoxit: sed tum uermiculī quidam sub cortice nascuntur, qui summo tenus caudicem non erodant, sed uelut inscribāt, unde quibūdam sigilla: hoc non in pinu uel larice tantum euenit, sed in omnibus quæ post fructus maturitatem cæduntur. Et illa communis omnibus quæ cæduntur in arte fabrica uel distinctio: ut aliæ quadratissimos uenarum cursus habeant, bipartitos alig uel omnino simplices, hoc est, ut Theophrastus inquit *τρίλαβος, διλάβος, μισγέστος*, quæ Gaza me⁹ quadriuiuas, & biniuiuas, & uniuiuas cōuertit, errore manifesto, quod *τρίλαβος, διλάβος, μισγέστος* legisset. Nos in eare Plinium & Vitruuium autores habuimus. Ex pinu nauigiorum rotūda sunt, & onerarijs carinæ: quāquam nec ex queru negligunt. Sed illa trirēibus idonea magis est, ut diximus. Aesculiflores carbonem

piniquerno præferunt: non quia uiribus parem, sed quæ ad statum cōmodius respondēat, nec ut quernus marcescat. Resina huius à germinatu colligit, detracta prius tēda. Ex omnibus resinam ferentibus scandulas ē pinō firmissimas esse constat: ex cæteris faciles omnino, sed imbecilles. Folium pinō pinastrōq; aculeatum, mucrone prælōgum, exile. Pinus sett minum resinæ, interdū ex ipsis nucibus, uix ut ascribatur generi. Pinastr nihil aliud est quæ pinus syluestris, mira altitudine & à medio ramosa, sicut pinus in uertice. Copiosiorē dat hæc resinam. Gignitur & in planis eodem modo *κινδύριον* dicta. Easdem arbores alio nomine esse per oram Italiæ, quas stibulos uocari Plinius existimat. Ego strobilos legendum arbitror, & nataliū cognatiōe ita dictas: sed graciles subcinctioresq; & enodes. Liburniarum ad usus penē sine resinā, cura degenerant. Florem abietis taxiq; preueniunt diebus circiter xv. ab occasu Vergiliū. Eadem proportionē resina suos asserunt. Aliqui genera duo faciūt, in Troade, montanum siue Idæum, recta, celsa, crassa materies, nucib⁹ oblongis, uiridibus, sero dehiscentibus, ut pote syluestris pice copiosa. Maritimū folio tenuiore infirmioreq; cortice leuiore, & corijs utiliore quā Idæi, nucē rotunda, breui⁹ apetiēda, ualida & robusta materies. Alij ut Macedones marem intelligunt sterilem, breuiorem, folio duriore: forminam proceram & folijs pinguior mollior & simplicibus, atque non rigentibus. Lignum maribus retorridum, prædictum medullā, durum & ad fabrorum opera contortum. Nigrior radix foemina, mollior & omnino tractabile securibus. Pinus foemina habet quam Græci uocant ægida, mellei coloris, pictorum tabellis immortalē, nullisq; fissilem rimis. Proximum medullæ, corpinus à Theophrasto nominatum, quæ in abiete lussion appellatur. Nasitur hæc in foemina dumtaxat, ut quæ minus tēda cea sit quā mas: leuiorā quæ ad exprobiar cursu meatum. Ficū uocant Idæi tedarj, cum grandium arborum medullæ securis adigitur: quibus prostratis partes candide ambientesq; computruerint, colore uehementer abiecto, & neruo pretenui: nam id quod in pinu rubidius tēda nascitur, mares potius habet quæ foemiū: hoc maribus tantū accidit, & odore grauissimo est: neq; tēdam redolens, nec ardens, sed abignire silis, syce non stacte dicta, ut in Plinio correxim⁹. Pini morbus est ut tēda fiat tam parte caudicis externa quā corde, id quod abundantia succi & ubertate largā luxuriantis naturæ prouenit. Mares hanc tantū ferunt. In quo noscendum superiōra, quæ de pinu Theophrastū secuti diximus, omnia ferē ascripta esse larici à Plinio, ut præmonuimus. Nec mirū, quādo & perpetua fronde uirent omnes, & in Macedonia & Arcadia. Circa Elin permutant nomina, nec constat autoribus quod cui⁹ generi attribuant. Larici ergo finis idem quæ piceæ in montibus eademq; facies. Materia præstātor longe. In corrupta uis emori contumax, rubens, odore acrior, nec ardet, nec carbonē facit: nec alio modo ignis uis cōsumitur quæ lapides, cum cætera quæ piceam & resinam fundunt, immodice accensa carbonem expuāt, cum eruptionis crepitu, ei aculanturq; longe. Flusculum huic melleo colore atplentiore, nunq; duracētis. Tēda uero proprie dicta & à Græcis *τῆν* & *σκληρόν* uocatur, sed & sui generis arbor in Illyrio est, redundantiā humore quæ reliquæ, parci⁹ liquidiorq; quæ picea, *κινδύριον*

mis & lumini sacros: quoq; grata. Impropr̃ie uero te-
das appellamus tum alia quog; ligna, quæ flamma
olei uel picis illitu cõcepta, faculæ modo luceat, tum
piceæ satiuæ partes imas, qualẽ in nucleor; piceor;
capite mōstrauimus. Ex ijs quæ dicta sunt cõstat, in
Europa sex haberi genera cognata: arbor; quæ resi-
nam ferat, pinũ, pinastrum, piceã, abietem, laricem,
et eam: Addi potest & septicim; piceaster in Hispania.
Pinum uoco piceas nucs ferentẽ, quã Græci *κιννυ* ap-
pellant: pinastrũ & laricem, quã *πινκλον*, in Troade us-
fenda magnitudine, quatuor & uiginti pedum am-
bitu, altitudine duor; iugerũ, præterea q; cubitor;
quindẽcim: piceam, quam *κιννυ* & poetæ *Βασιλιν* ut
quidã rentur: et eam porro, quam *δάρ* & *Δαδονα* atq;
omnia hæc Pliniũ sequentibus: Nam Theophrasto
pinus atq; larix idem quẽmadmodũ sapissimẽ testa-
ti sumus. In Palladio corrupte legĩt̃ tinus pro pinu.
Idem autor lignum Gallici uocando aut laricem aut
ei simile quid significat, ut multi sentiunt.

PITYIDES.

XC.

Pityida fructum piceæ Dioscorides uocari scri-
bit, itemq; pini: sed impropr̃ie, ut Galenus in-
quit. Plinius ē pinastrum nucs ita nominat. Hip-
pocrates pityida pro resina ē pinu siue picea potius
intelligit, ut eĩdem Galeno placuit.

NUCLEI PINEI.

XCI.

Nuclei pinei Græce *σπίλοι* dicuntur, q̃q; strobi-
los & tripudij genus est siue saltationis apud
Iulium Pollucem. Galenus etiam coccalos uo-
cat nucleos eos in Hippocrate. Sunt qui coccalos nō
pro nucleis pineis ut cæteri, sed pro cocco Gnidio ac-
cipiant, ut idẽ Galenus ex alterius Dioscoridis sen-
tentiã testatur. Arbor ipsa *κιννυ* & quandoq; *σπίλοι*,
cum decocti melle sunt in taurinis aq̃uiculi nomina-
tur. Dulciarij quoq; genus quoddã ex uua passa nu-
cleus pineus ex amygdalis unã costis *κιννυ* & appella-
tur apud eundẽ Iulium Pollucẽ. Nucs quorũ genera, du-
rum, quod & uulgare: tenerum & putamine digitis
fragili, ideoq; auibis expositum, Tarentinam uoca-
bant: Tertium ē picea satiuæ, nucleorum cutem mol-
lissimum adeo, ut simul mandat ur: quod autore Pli-
nio sapium uocetur & nucleis: quanq̃ uerbum nu-
cleis in eo melius fortasse pro nucib; sapineis q̃ pro
arborẽ ipsa capitur sexto decimo volumine. Pliniani
certẽ codices libro quintodecimo non sapium sed
apinum habent: nos apum, & ita dicis, & inscriptio-
nis, & exemplariũ, quæ manu scripta sunt, argumen-
to legitimus: & Columellæ, apud quem nuc sapinea
legitur. Quidam apinas à uilitate dictas arbitantes,
literam s dictioni ueræ detraxerũt. Imas arboris huius
partes, ut idẽ inquit Pliniũ, tedas appellamus. Omni
noq; nihil aliud q̃ picea est, feritate paulum mitigata
sacu. Nam sapinus siue sapinea, fustern; pars est abie-
tis inferior: nō, ut Seruius scribit, species abietis apta
nauibus: Nam superna eius arboris à duritia nodor;
fusternæ simpliciter appellantur. Vtriusq; memine-
runt & Plinius & ceteri. Mouit hominẽ grammati-
cum Varronis credo autortas parũ intellecta, qui
dixerit in montanis prolixiores uenire abietes, & sa-
pinos, firmioresq; propter frigus: Quartũ *πινιδες*:
quas proxime descripsimus. E nucleis quoque pi-
neis nonnihil resinæ colligitur.

LENTISCVS.

XCII.

Lentiscus q̃ & Græcis uocata, resinã ubiq;
sudat: mastichem uero dictam in Chio tãtum
insula ferẽ. Lentisci fructum Hippocrates schi-
nida nominauit, etiam silibarior; culpa, non schini
des sed echinides legatur, sicut & cechrides procedi-
des. Lentisci folia quibus modo pelles ex coriari con-
ficiunt apud nos, Iudaico uico plurima ex Illyrio cõ-
uecta, & uulgo folia dicuntur. Plinius lentiscum Ita-
licam dicẽdo, uidetur præter Chiam alia quoque ge-
nera nouisse. Fructus initio rubet, post nigrescit: qui
& la mbuci specie in racemis depõdet, folio pistacij,
sed minore, per extremitatẽ rubente, in summo sili-
quæ pifos, fed corniculi modo intortæ, in quibus re-
sina odoris iucundi continetur. Romæ demonstrat
in rudemb; monumẽtisq; lentiscus folliculis in auidis
& deformibus, ijs cõfractis culices euolat frequẽtes.

RESINA LENTISCINA.

XCIII.

Resina lentiscina in Chio mastiche est. Impor-
tatũ & ex India quadã & spina mastiche, itẽ
ex Arabia, lamam uocant: sed ex Asia & Græ-
cia ueræ q̃ simillima, ex ixime herba, quam Theodo-
rus Gaza chamaeleontem album intelligit, & car-
dium pineã apellat: id autẽ q̃ rectẽ, diximus in-
ter herbas. Ex Ietisco Chia gummi modo nascitur ni-
gra & candida. Pretium candidã in libras xx. nigra
xii. Ex Ponto quoque uenit mastiche bitu mini simi-
lior atq; nigra, uino condendo. Cæter; laudatissi-
ma inter omnes Chia cãidia. Adulteratur ut thura,
resina, ut Plinius ait, sed ut Dioscorides thure & resi-
na. Galenus in duo genera colligit, nigram & candi-
dam: nigram Aegyptiam, candidam Chiam uocari
prodens. Ex Aegyptia uenientũ aut oleũ ferẽ silere
negat. Non arbitror quenq̃ monẽdum q̃ longe à uero
sint qui mastichẽ a silphio non separant.

TEREBINTHVS.

XCIII.

Terebinthus *ἑρπύς* Græce dicta, messib; tri-
ciaut paulo ferẽ fructificat. Mas sterilis. Foemi-
næ distinguuntur: Alia fructum procerius ru-
bentẽ, magnitudine lentis edunt, qui concoqui non
potest: Alia uiridẽ pallidum, uẽ primo, demum ru-
bentẽ, nouissime cum uua maturescẽtẽ & nigres-
centẽ: qui & odore iucundior, amplitudine fabæ,
interim maiorẽ & resinofum tactũ, sulphurosumq;
In Troade circa Idam & Macedonia breuis & fru-
ticosa & contorta. Da masco Syriæ insignis, copiosa,
decoro aspectu: ubi mons terebintho nec alia sylua
scatens. Materies admodum lenta radicebus ualidis
actisq; in profundum, fidelis à ductustat. Flos race-
mosus oliuæ modo, sed rubens: folium numerosum
ab eodem pediculo, figura lauri digesto in uersus us
sorbo, unicum ad cacumen exit, & numerum pa-
rem conturbat: minus tamen angulata sunt quàm
sorbo, & similia per ambitum laurinis uidentur,
oleosa quoque ut fructus. Fert & nucamenta quæ-
dam caua ceu folliculos ulmi exẽplo, in quibus ani-
malia quasi culices erũpunt, & resinofus lentior, quã
lis è ligno, unde fit resina. Fructus quandiu maturus
non est, in aqua ferẽ supernat: niger, sicut: uulneri-
bus profundis ut abies, & quæ resinã redamq; inge-
runt. Foecundior efficitur, contra q̃ cæteræ arbores:
materia uehẽmeter nigra, spissa, splendida, præcipue
in Syria tũ ut hebenũ q̃q; prouocet: cultellis ex ea ca-
pulos, & calices thericleos detornant tã feciliciter, ut
à siglinis internoſci nequeat, Thericlei porro calices

Athenia

Athenis clari habebantur. Nomen ab inuentore datum, qui Aristophanis etate fuit, siue ut alij putant, a detornatis in eo belluarum pellibus: sacrum Baccho poculum facere. Cæterum falsò quidam extimauerunt idem esse quod carchesium, cum hoc constet antiquissimum pateræ genus fuisse. Nam poculum quod Alcmena Iupiter in facie uersus Amphitruonis eius coniugis dono dedisse fertur, carchesium uocatum perhibet, multis post seculis Lacedæmone seruatum. Terebinthus ad resinam tollendam postquam germinauerit, inciditur, quod in omnibus resinâ fundentibus custodiendum est. RESINAE XCV.

Resina multis arboribus legitur, omnibus incensis à germinatu, sed uarie. De pinu teda demum detracta, de abiete ac picea, ligno præguistato: De terebinto, radicibus, ramis & caudice uulneratis: sed melior quæ defluxit in caudice. Optima terebinthina est spissiludina, leuitate, odore: secunda bonitas abietina ac picea copiosissima, pòde rossiſſima piciq; proxima è pinu est. Portatur utribus liquida: tum spòte crescit, autore Theophrasto: nam Plinius minimum resinâ de pinu colligi scribit. Credo quia pinus theophrasto larix est, ut diximus. Resinam piceâ quæ sicca sit, aridissimâ inter oēs prædicat Aëtius, cāq; *πικρὴν φλογὸν* priuatim ceteri meminit.

RESINAE ALIAE XCVI.

Resinam Græci *ἐννύλην*, & *νύλην* quandoq; Paulus uocauit. Hanc ex pinu & picea siccam esse Plinius intelligit. Dioscorides ex ipsâ dem arboribus alias esse siccas, alias haberi liquidas uult: Item liquidas è terebinto, larice, lentisco, cupressor: nam & ex feruntur in Asia Syriacis. Fallitur uero qui eandem esse putant epicæ ægylarice. Picea pinguem & thuris modo succosam fundit. Larix gracilè, colore mellis Attici, ac melle etiam liquoris uirus redolentem. Illud notauimus, nam arborem ipsam q̄ eius resinam uocari laricem. Potest & larigna ut iligna dicinam & castellum in fluminis Padi ripa ex eo ligno conditum vitruuius larignum appellauit. Oribasius atq; Paulus resinæ genus italicæ tantum nascentis *ἐννύλην*, hoc est, lignosam commedant in dropacem: fortasse hanc intelligentes, quam Dioscorides Tyrrheniam siue gallicam uocauit, uel corticatam Columella. Resina laudatur nationum Cypria, Syriacæ: utraq; mellis Attici colore: sed Cypria carnosior, siciorq; antecedens omnis. In sicco genere candida. In omni montana & campestris, præfertur aquilonia. Terebinthi tenuissima est, cupressi acerrima sapore, crassior cedri, & facièdis picibus idonea. Arabica alba est, acri odore, difficilis coquendi. Iudaica collosior. In Asia, quæ fiat ex picea, admodum, ut Plinius inquit, cãdida, sphagos, siue ut legi maluimus, epargos à cãdore dicitur. Liquida raro utitur medicis, & in ouo ferit: nec pinea magnopere in usu: cæteris nò nisi decoctis. Resina oleo dissoluit, utiq; ad malagmata ususq; uulnere: quidam & creta sigillatim hoc fieri arbitrantur, in potiones amaris amygdalis. Colophonia præter cæteras fulua: iteratur, alba fit, grauior odore, & ob id ab unguentarijs neglecta. Abieti resinâ, ut larici teda, uitii est. Exiguû abies sudat aliquando cõtractu solis. Inuenio & acernâ resinâ, hoc est, zygian in cõpositiõe, cui nomē est baion. Est em̄ zygia tertiû genus aceris, rubens, ligno fissili, cortice luido et scabro: q̄ talij carpinû uocare maluerunt, ut Vitruuius, à iugis quæ bob̄ ex hac arbore fieri solēt,

FVLIGO RESINAE XCVII.

Resina picea, si est aqua leuiss decoquatur cõſecturq; lentescit, colore ruffo, stillatitia q; dicitur. Eligitur autem in id ferè uitia resinæ corticesq;. Picea uale æris albi terebinthina in fartagine referuenti coquitur. Est illa temperies ad trapulam. Flos crudus resinæ, cum multa assula tenuibrey aullus, conciditur ad cribrû minuta: dein deferuenti aqua, donec coquatur, perfunditur. Huius expressum pingue præcipua resina fit atq; trara, nec nisi paucis in locis subalpinæ Italiæ conueniens medicis resinâ: quæ coquenda sit, candidissima requiritur. Porro sciendum est aliud esse resinam comburi, aliud coqui, si proprie loquar. Vritur ad fuliginem coquitur uero, quia crudæ usus in medicina ferè nullus, nec extra quàm in oio, teste Plinio.

PIX

XCVIII.

Pix nihil aliud est quàm fluxus combustæ in teda sua resine: de pinu ferè omnis, ut Theophrastus inquit: quāq; in Syria terebinthi quoque picem ferunt, quia desinit ibi pinus. Epicæ quoq; cedro, palma, colligitur. Pix hyeme frigida deterior, minus copiosa, decolor: ubiq; optima ex apricis Aquilonis situ. Ex opacis horridior, uirusq; præferens. Ex Idæa & montana pinu largior, coloratior, dulcior, odore gratior, utiq; cruda: quoniam decoctâ multum perdidit, propter ferum quod in ea continetur abundanter. E paralia, hoc est, maritima, flauetior & crassior, quandiu resina est, uidelicet, quandiu cruda: sed decoctio ex ea partius absumit. Idæa tediſſima, è pari modo tediæ: imbribus admissis q̄ equalioribus pix abundantior & liquidior excipitur: hæc Idæi, priora Macedones. In Ida pinus aperitur parte solari, ablato per uulnus cortice, binis ternis uel à terra cubicis cum plurimum, singulis cum minimum. Postea cõſuit è tota pix in uclcus, nò sine teda, cum manare humor desit. Simili modo ex alia parte ceditur, ac deinde alia, & sequenti semper anno teda locû implet. Extenuata per hæc arbor facillime subvertitur uetor: quod cum fit, tota succiditur, & cor, id est, medulla eius uritur: In qua & in radice plurimum tediæ semper est. Explantur uero in pinu caua uulnerum, non cortice, nec cicatrice, quæ in hac arbore non coit: sed resina seu pice, anno maxime ab incisu proximo, si pinus frugifera: aut secundo aut tertio, si pessima. Pro bæ uices multas perferunt: uitiosæ, nisi quis modice inaniet, prouentum q; dispense, detractiõnem quartam non tolerant. Pinus nouellæ fructificant: ueteres teda non fructu sunt fertiles. Plinius hæc de pinu à Theophrasto dicta transtulit ad laricem: partim ad piceam, cuius assulas terræ proximæ laudant: Altiores amaritudinem afferre scribit. In Syria terebinthi quoque ad picem detrahunt cortices, è ramis quæ etiamum à radice uindemiuntur, cum resina tamen damnetur ips partibus. In Hispania epicæ stro quoq; sit minime laudata: quoniam resina eius arida, uirosa & amara fœtiatur. Pix conficitur hoc modo: Pauit area canali præparato, per quem humor in mediû conſuat: tum lignum in hastulas corticisum locatur stris congerie, uelut in carbonis usu: mox igni succenditur, terra undique circumdata: ne flamma erumpat: perit em̄ pix, si hoc eueniat. Quod si fumus se parte aliqua extulerit, scalis protinus admotis locum terra sepiunt, tediæ quæ obstruunt, nequa exeat. Canalis subiectus picem fluentem corripuit.

uat in scrobes, cubileis à cogerie circiter xv. remotas. Strues ipsa sexagenis aut quinquagenis cubitis; cen-
 tenis & octogenis alia pater per ambitum. Sunt qui
 per utrumq; mensum cubitos centenos agāt. Humor
 qui fluit, obiter frigsit contactu: uritur fere biduū.
 Operis perfecti signū, si rogos decumbat subsidatq;
 & quasi latus det. Summa hoc illi diligentia & reli-
 gione peragunt, ceu feriās. Et cum appreciatione
 præsentium solenni, ut pice ea tum copiosum pro-
 ba euadat: Ac primus quidem sudor, qui aquæ mo-
 do fluxit in canali, cedrium uocatur, utique in Syria,
 ubi pinus non sunt: quo in Aegypto corpora defun-
 ctorum perfusa custodiuntur. Sequēs liquor picem
 foedit, quæ in cortinas æreas coniecit, aceto spissā-
 tur: & coagulata, Brutia cognomen accipit, doliis
 duntaxat utilis, lentore ab alia pice differēs: item co-
 lore rutilāte. Et quod pinguior est, autore Plinio Brutia
 à Brutis dici constat ubi nascitur, ad oppidum
 Mamertium, feraci nemore, ut Strabo inquit. Nec
 Brutiana silam, quā obrem uocari eam picem di-
 cat comperi: Non enim silatum uinum pro picato
 significari crediderim, etiā si Plinius quodā loco spis-
 satum utilissimā medicinā Brutia, & ad uasa quoq;
 in Italia condiendo uino tradidit: quoniam pinguis-
 sima & resinolissima utraq; præbet utilitatem.
 Hanc ex mascula arbore meliorem esse adiiciunt: id
 quod intelligi nō posse Plinius existimat. Theopha-
 ras certe uti pinum in Macedonia non omnem sed
 marem scripsit, picis gratia: nec fœminæ tamen ra-
 dices negligi: quod ea tæctum pars in fœmina tedam
 habeat, ex qua omnia illa sunt. In Asia Syri non de-
 rant tedam, sed machinamq; quodam in arbo-
 re ipsa picem urunt. Fit pice resina quoq; sola pice,
 feruentibus cocta lapidibus in aluéis ualidi roboris,
 ut si aluē non sint, congesta strue, ut in carbonis fa-
 ciēdi ratione: hæc in uinum additur, sanæ modo tu-
 sa, colore nigrior, ut ait Plinius. Vitia picis acor, aut
 odor fumidus, aut piceis auditio. Experimentū, si ra-
 gmenta subluceant, ac sub dentē lentescant, acore iu-
 cundo. Asia picem Indicam maxime probat. Græcia
 ē Macedonia Piericam. Vergilius Narintiā. Conden-
 dis uinis Columella & Nemeturicam commendat,
 quæ in Liguria conficitur, & Allobrogicam, quæ cor-
 ticata dicitur. Siccata hæc uetustate, in puluerem re-
 soluitur, cribraturq;. Idem autor picis quoddam ge-
 nus crudæ Ta sim uocari tradit, in destrutū Neapolita-
 num addi solitā. Sunt qui Rheiticam, Palladius cora-
 cinam picem nominat contra formicas arborū: sed
 mēdo salectio est, & coracinū piscē legendū, id quod
 ex Græcis rei rusticæ scriptoribus elicias.

OLEVM PICINVM.

XCIX.

Oleum picinum Græci *πικινόν* uocant. Pro-
 batur maxime ē Brutia, ut quæ resinolissima et
 pinguisima sit. Color oleo fuluus.

FVLIGO PICIS.

C.

Fvligo picis, cremata pice fit: quod aliud est
 q̄ pice cocta, ut in fuligine resinae diximus.

PALIMPIS.

CI.

Palimpissa nihil aliud est quā cocta bis resi-
 na. Nam prima decoctione pix fit, secunda bis
 pix, hoc est, *πικινισμένη*.

ZOPIS.

CII.

Zopissa efficax omni resina & pice tradit,
 ad oia, quibus ille profunt, uidelicet a diecto sa-
 lis ē mari callo. Opria hæc à *τυρο* cinio nauis,

Bitumen Græci *βόπας* dicunt: unde lacus lu-
 dææ, ubi nascit Alphalites uocatus: quo for-
 danus amnis ē Tiberiade lacu altero profectus,
 influit lacum Alphalitem. Galenus in Syria cole sal-
 sum, & propterea mare mortuum uocari prodidit.
 Vitruuius sub Babylonem inquit lacus amplissima ma-
 gnitudine Alphalites appellatur: habet supernatis
 bitumen liquidū, quo Semiramis fit oia, cum Baby-
 lonem circumdedit muro. Item Ioppe in Syria Ara-
 bia, quæ lacus inquit sunt immანი magnitudine, qui
 emittunt bituminis maximas moles. Ex ludæa bitu-
 men oritur, certo anni tempore supernatās: nec po-
 test sibi tunc auelli, ad omnem contactum sequax
 atq; lentum, præterq; filo, quod menstruum mulieris
 infecerit. Bitumen alibi limus, ut in ludæa: alibi terra
 est, ut in Syria circa Sidonem oppidū marinū. Spis-
 santur hæc ad densanturq;. Liquidā sunt Zacynthiū
 & Babylonii: cui detracto subest sal, & ad lucernas
 utuntur. Babylonem nigrum & candidum gignitur:
 ubi & siccum fonte quodā, ut inquit Eratosthenes,
 Euphrati proximo. Liquidum est & in Apolloniata-
 rum agro inuentum: etiā coire in glebas à Diofo-
 ride dicitur. Fortasse defertur hoc à montibus liqui-
 dum, post concreuit. Siculum ex Agrigentino lacu
 pingue, liquorisq; oleacei est. Incolæ harūdinum pa-
 niculis id colligunt, occytime ita adhærescens. Bitu-
 men illitur aramentis, munitq; ea contra uim ignis.
 Statuas ex eo iungit solitas ferūt. Placet in ferrariis
 fabrorum officinis tingendo ferro, clauorumq; capi-
 tibus: Nam calcis usu constructos eo Babylonios mu-
 ros nouimus Bitumē ex fulmine oriri dici, unde iux-
 ta Babylonē redundat eo lacus, quæ frequentia ibi ca-
 dant fulmina, ut Seruius grammaticus existimauit.
 Haud procul Susse puteum haberi scribit herodorus,
 unde bitumen, sal & oleum extrahitur: id oleum Per-
 sas appellare rhadinacem.

PISSASPHALTON.

CIII.

Pissasphalton aliud naturale, ut Apolloniaticū,
 Babylonii, Zacynthii, & quodā lacu: Nam Græ-
 ci omnia ea modo *βόπας* modo *πικινόν* uocant
 nominant: quandoq; resina. Naturale optimum:
 ex eo quod cum feruet, innat, aliud factitium, mix-
 ta pice bitumini. Hoc genus bituminis in Apollonia-
 tarum agro inuentum, picem fossilem à Theopom-
 po dictam auguror.

NAPHTHE.

CV.

Naphthē Eratosthenes generi bituminis liqui-
 di ascribit. Sed ardens eius uis, ignis natu-
 ræ cognata, procul abest ab omni usu. Ita ap-
 pellatur circa Babyloniam & Susidem, & in Austra-
 genis Parthiæ proflus bituminis modo liquor. Cre-
 matam ea pellicem Creontis filiam à Medæa ferūt,
 ad aras accedentem, coronā igne correpta: etiā si
 radices cuiusdā ui à Circe doctam, incēdium id creas-
 se, Diodorus meminerit. Similis naturæ limus in Cō-
 magene, urbe Sāmofata, stagno emergens, mal-
 tham uocant. Flagrat ac protinus, & cum quid at-
 tingit solidi, adhæret: & sequi fugientes. Ita descendē-
 re muros suos municipales oppugnant Lucullo. Fla-
 grabat miles armis suis: aqua magis accēditur, utiq;
 non admodū copiosa: pulueris tū & luti iactu resis-
 gunt, itē q; aceto, uisco, sulphure. Possidonius in Baby-
 lone fontes naphthę geminos esse tradit: alterq; cādū
 di, qd & liquidū sulfuri sit, ignes in se cōtrahens: alterq;
 nigrū,

nigri, quod liquidum sit bitumen, & olei uice ad lucernas utile. in Mutinensi certe agro Italiae similis bi tuminis seu naphthæ potius liquor nascitur, & candidus & rufus: quem circulator ad prestigias suas utilem conferunt. In terra Mœsia Pannoniæ iuncta, inquit Solinus, parte qua Pontum attingit, herba nascitur: qua cum inficitur olei quod uocant Medi cū, dirē naturæ, aqua em̄ exardescere, terra extingui.

C V P R E S S V S C VI.

Cupressus, lōga, subrecta caudice atollitur: cæ tero quidem orbe satū, hoc est, semine suo nascitur in Creta etiam trunco, præsertim in mō colis Tirafensium ubi cædua est, & cæsa germinat, modo ab terra, modo a parte medietate, modo summa, raro ab radicibus. Semen ei perexiguum: non enim galbuli, qui nascuntur, ut Theophrastus refert & Varo mutatur, tanquam pilæ parua, cortice cupressi ni, dictæ coni, sed ipsi intus primigenia femina dedit natura, laticis proxima, perq̄ minuta: hæc pilula de hiscente, illa cū maturascit, distant & euoluant, neq; facillime colliguntur, præterq̄ a peritis. Aduena Italiae quondā & natu morosa, bacis torua, folio amara, odore uiolento, materie rara, ac penē fruticosi generis: Diti sacra, funeribus indicādis ante domos poni solita. Sterilis foemina diuise metæ aspectu, quę in fastigio ei conuoluta est, grata, distinguēdis pino rum ordinibus, faciliēse consiliū culturæ præbens, historiales picturas tenui folio breuiter & uirē super uelutens. Contra mas spargit extra se ramos, deputaturq̄ & accipit uirē. Vterq; flexus in perticas alle resq; admittitur, amputatione ramorū, qui tertio cimo ante singulis denarijs uenerint. Proinde filiarum dorem plantaria ueteres appellauerunt. Taren tinam Cato nominat, quoniā ut Plinius arbitratur, primum ē Creta uenerit Tarētum cupressus. In aena ria q̄q; succisa regerminat. In Creta quocunq; loco quis mouerit solum, nisi seratur alia, hæc sponte gi ginitur: in Idæis albisq; montibus etiam non appella ta ea proslit: libiq; summis iugis, ubi niuē nunq̄ ab sunt, plurima. Alibi non nisi in tepore prouenit, magno altricis fastidio ac labore. Commendari maxi me cupressum Milefiam inuenio. Fructum cupressi, galbulos & nuces cupressi recte uocaueris. Nam gal bae ut ait Suetonius animalia sunt exilia, quæ in æsculis nascitur. Cupressos a partu ramulorum pa rium uocatas Græci uolunt, *από τῶν πρώτων βλαστῶν*. Falsē & charitas appellari solitas Eueolia fuisse filias adnarrat: quæ dum tripudii deas sub siliunt, in putem ceciderint.

I V N I P E R V S C VII.

Iuniperi duo genera quidam cōstituant, unum, quod floreat. nec fructificet: alterum quod fructificet, nec floreat. Solam ferē arbori proroga re fructus suos in biennium, qui ne maturescant qui dem, sed decerpantur, & aliquādiu conditi seruētur: et si in arbore reliquantur, marcescāt. Materia fabri cis conueniens, tam futuris sub dio quā terra obu tiendis. Plinius hac descriptione cedrum maiorem non iuniperum demonstrauit, ut indicabimus in cedro.

I V N I P E R V S MAIUS C VIIA.

Iunipero uirtute similem capidam à Catone dic tam inuenio ad lotium mouendū: nec quid sit, dicere coniectura possum.

S A B I N A

C LX.

Herbæ Sabinae aut etiā Sauinae genus id, quod simile cupressi folio est, cupressum Creticā nonnulli uocauere. Notum est contra galli nacei generis pituitas remedium, ut cubent in fumo, qui ex herba Sabina fiat. Dioscorides hoc loco *βαλάνη* & uocari eam tradit à nonnullis: ut fortasse de hac in telligant scriptores, præsertimq; Diodorus, cum in Arabia nasci dicūt boraton iuniperum, cedrumq; que, quasi boraton pro baryto, uel contrā, exemplario rum uitio legatur.

C E D R V S

C X.

De cedro autōres uariant. Theophrastus alterā ram Phoeniciā, alteram Lyciam appellat: similes iuniperi, nisi q̄ folium cedro acutū, spinosum & durum, iuniperi simplicius ac mollius: excellior & hæc quā cedrus. Alij utraq; cedrū inquit, nominant: sed quæ proprie sit cedrus, acutām cedrum uocare malunt, id est, *ἐξ ὧν ἡ πορ*. Nodosa ē am bae, alis frequentibus ligno contorto: sed in iuniperō spissiore putrescētē. Cedro æterna materies. Vtriq; medulla rubēs: sed odorata in cedro, sicut & fructus, qui & flauus & magnitudine baccarum myrti cerni tur esculentus, hilaris: iuniperō niger, acerbus, ingu stabilis, durans annum, prius non decidens q̄ subna scatur alius. Arcades fructus in ea ternos eodem ha beri tempore confirmant. Satyrus utraq; sibi al laram sine flore, cupressi similes, scabriorē tantum cortice. Radices soluta summa cute ambabus hæ rent. Saxosa loca & algentia se quantur. Plinius lon ge aliter, quippe qui notas iuniperi cedriq; confun dat: fortasse uerius q̄ priores. Cedri summa genera duofacit, maius & minus: Maioris iterū duo, quæ flo ret, fructum non fert: quæ fructifera est, non floret & in ea antecedentem fructum occupat nouus. Se men eius cupressi simile. Quidam cedrelaten uo cant. Ex hac refina laudatissima. Minoris quoq; spe cies binæ, Lycia & Phoenicia: iuniperi similitudine, differit folio: nam quæ acutū, durum, spinosūq; habet, *ἐξ ὧν ἡ πορ* & inquit appellatur, ramosa & nodis infesta: altera odore præstat. Fructum eæ ferūt myr ti amplitudine, dulcem sapore. Dioscorides fructus myrti similitudinem cedro maiori, ex qua pix fiat, non minori tribuit. Crassiuscula cedri refina est, & ad faciendā pices commodissima. E cedro simulacra dijs præcipue, sicut in cupressō, loto, buxo, atq; etiā num oleaginis radicibus minora. Optima nauigijs Syriæ Phoeniciæq; nam Syriæ ea in montibus natæ tanta crassitudo fertur, ut hominēs terni caudicem amplecti nequeant. Solent cedri humorem quen dam reddere, ut simulacra etiam deorum quandoq; fudent. Similis in Arcadia est arbor, cedris nomine. Frutex in Phrygia pusillus, frondis æternæ, arborē scēq; nunq̄, à Theodoro Gaza uocatus cedrula: hæc & cedriam à theophrasto dici puto, quatenus arbor est, non quatenus frutex: tunc enim cedris sit, non ce dria. Cedria Theophrastus inquit differt à cedro, arbor folio pungente mucronibus perinde ut cedrus, Hippocrates cedrin Creticā & hederā Creticā foemina: in cōmodis auxiliari scribit, in uino lacteo, id est, tepido: sic enim *ἐν ὕδατι* interpretant nonnulli.

C E D R I A

C XI.

Cedria modo cedri pix, modo cedri refina uo catur, & cedro magna quæ cedrelate dicitur: nī hilyq; aliud est, si proprie loquendū sit, q̄ cruda cedri lachryma, Cedriū uero succus cedris est, & eda

b s c ius

eius concisa furnis, qui primus aquæ modo fluxerit in canali: nam se quens liquor pix iam, non cedrium est. Sed confundunt auctores, nunc pro resina, nunc pro sudore tedarū, nunc pro pice cedriam & cedrium uocantes: interim pro oleo cedrino, quod *cedrinum* ex malis cedri ut ait Plinius, appellanti omnibus emiſis q̄q̄ diuerſis, eadem tamen natura inest. Columella cedrinum liquorem uocat. Libricedum inuocant à cineis & carie uindcant. Damnar uſum Plinius propter ancipitem eius proprietatem, uicētia perimendi, perempta custodiendi: cuius tamen ratio preclara à Galeno redditur: quia tamen si adurat, ita ut ordi ne quarto calfacientiū cenſeri meruerit, inter omnia tamen erodentia medicamenta, quæ Græci ſeptica & ſeptas cognominant, inſirmiſſimum eſſe conſtet. Proinde uiuentibus a poſſitum, uitali calore adiuncto ſumit uires & quali accenditur, atque ita iugulat. Sed deſup̄ctis additum, putredinem tantum & uicioſos humores exterit & abſumit: quibus detractis, in corrupta ſeruatur. Galenus & Paulus non cedriam ſed cedream uocabant.

CEDRIDES CXII.

Cedrides fructus cedri ſunt, ut daphnides lauri. Minus urunt quā cedrus gultaſtis os, ut mandique poſſint: ſoporifica tamen ui, ſi copioſius edatur, caput tenent inflammantēq̄, interanea quoque torquent: Galenus auctor.

LAVRVS CXIII.

109 **L**aurus corrice renui deſcribitur. Degenerat ut quercus & myrtus pertinaciter, adeo ut in Antandro fructus erubro niger eueniat: quod & in myrto ibi accidit. Fert & uuam ſuam laurum tam fecunda quā ſterilis: nec tamen fecunda omnis: copioſius ſterilis, quam matrem appellamus. Genera lauri præter ea quæ in ratione daphnoidis & Alexandrinæ monſtrabimus, Delphica ex albo uiridior maximis baccis, atq̄ e uiridi rubentibus dicta, quæ uictores Delphi coronantur ea, ut triumphātes Romæ: quo & triumphalem uocabant, ad Cæſaris Auguſti tempora, ut mox dicemus. Delphicam Helianus è Theſſalia tranſlatam Delphos ab ipſis Tempe ſcribit: tū cum Pythius Apollo draconē ſagittis interfecit. Hanc Lactantius grammaticus etiam tripodem uocari dicit, quoniam radices inquit ternas habeat. Apollini dicata propter uim triplicem, diuinationis præteritorum, futurorum, præſentiu. Cypria folio breui, nigro, per margines imbricato. Criſpa, quam laurum ſylueſtre aliqui intelligūt, nonnulli ſiue generis arborem, quæ bacca ei cœrulea ſit, muſtax, folio maximo, albicante, flaccido, appellata, quod muſta cis ſubiſceretur. Muſtaxa quid ſint, & qua ratione ſiant, Caronem conſule. Diximus & in amylo. Regia quæ & auguſta dici cœperit, ampliſſima folio, baccis, arbore, guſta quocunq̄ non aſpero. Aliqui ab auguſta regiam diſſecunt, longioribus folijs latioribusq̄ quā auguſta. Baccalīa uero dicunt hanc que uulgarīſſima eſt, baccisq̄ fertiliſſima. Sterilem earū triumphalem, quod ea putant triumphantes uſos à Cæſare Auguſto, reſecta Delphica. Sterilem & laurū eam eſſe perhibent, quæ miſta ſit & celo eidē Cæſari, alitrudine minima, folio criſpo ac breui, rara inuētu. Eſt & quæ Taxa dicitur topiarij generis, excreſcente in medio folio paruula uelut lacinia folij. Habet & ſpadonia, opacitaris parientiſſima: itaq̄ quantalibet ſub umbra ſolū implet. Extra Hercules columnas in

mari naſcitur frutex, folio laureo, qui clectus, in pumicem tranſfiguratur, in Hero ſinu parte aquis exante lapidea eſt, ſimilis tamē uirēdi: magnitudo fructu bipedalis. In mari quoq̄ rubro uiuere affirmant eam, ſed ſimilem arizæ. Aria ſylueſtris arbor eſt, hymis initio fructificans, materie durīſſima, ut necceſſe ſit ante q̄ terebretur macerari eam prius aqua: quod & in robore carpin oſſeruat. Honos ei ad carbonem argentiarij officiis, ut roboſi, unedoni, piceæ, utiq̄ ad coctionem primam. Eſt & aria ſiue agria, quam proſpice aquifolia doreſ habent, ut in ſago diximus. Ex ea lauro quæ in mari rubro naſcitur, inſtrumentū muſicum pandura factum, à Troglodytis legimus. In Corſica laurus diu nulla fuit, nunc ibi ſatu prouenit. Ramo laurum ſeri poſſe conſtat, quod ueteres dubitauerunt manu ſarum, receptarumq̄ in domos, fulmine ſola non ſatuit, ignes abdicat ſalis modo crepitu. Interaneorum etiam uiria & neruorum ligno torquente. Folium eius lauream uocamus & Catoloream. Vni arborum Latina lingua nomen imponitur uiris: nam Tullius Ciceronis libertus Laurea non minabatur, qui Ciceronianas aquas epigrammate celebravit. Laureolos quoſdā ueteribus dictos ſuenaſis & Marrialis poetæ ſaris in dicat. Sunt qui lora hinc dicta exiſtunt, quæ antiqui laura nuncupabāt, à laureæ triumphoſæ, ſub qua ſolent capti uſque uincire ducendos in pompam. Vri lignum eius prophani uſibus: ſed ne aras quoq̄ ipſas accēdi eo fas erat: ut quidam mirentur unde Horatius & Papinius laurum ipſam non ſolum imperatoribus, ſed uacibus dicatā cecinerint, cum hedera poetarū, laurus ducuna fuiſſe legeretur. Quidā ſeniles baculos è lauro quoq̄ faciunt. Cæſar pontificumq̄ domos, militum arma, faſces imperatorum ornare quondā ſolita. Pacis ut olea, ſic uictoriariū laurus ſemper in dicit. In lauro uetere Spartani libum & bellania iacētes rodebāt poſt cenam, ob id folia eius cammaratas & *ſu uaciter* quod eſt rodere, uocabant, & placentas ipſas cammaratas ſiue poſta, hoc eſt poſtām oleo conſperſam, quarum loco nobilioribus epæcla, ſiue quod idem eſt matyæ dabantur, ceu ſportulæ quædam maiores pretioſioresque, ut turſi, palumbi, merule, turtures, & anſeres, & alia iſis ſimilia. Poſt obtinuit ut omne paulo ſuauius aut que laurum edulium, matyæ diceretur: ſiue ab eo uerbo, quod pinſere, unde magides & mazæ quoque ſint appellatæ: ſiue ab eo quod mandere ſignificat, unde maſtiche dicatur. Hæc quia in poſtremo cenarū dabantur, ab alijs epidoriſſimata & epidipnides appellari ſolent. Hinc iuris cuiuſdā pretioſi generis magis & capis appellantur in Plauti poetæ Pſeudulo. Nam & uas ſine uſuſ magis, quod tamen Varro à magnitudine deducit, ut capis quoque non capitis legi poſſit: Fuit enim hoc moris ueteribus, iurulentia iſa nominibus uſorum appellare, ut paropſidem & triblion. Sed & tragematis uice laurum in ſecundas menſas inferri ſolitam, Callias & Diocles, ut Athenæus inquit, auctores ſunt. Ramus lauri aut etiam oliuæ à quibuſdā uocatur arſacus: q̄q̄ & auicula erythacus hoc ipſo nomine appellari ſolet. Eſt autē erythacus à Theodoro dictus rubecula. Eſt & rubetra quædā uolucris, ab eodē coſicto nomine, quem Arilotes baton uocat.

DAPHNIDES CXIII.

Daphnides & daphnococci, baccæ lauri ſunt: daphnoides uero frutex.

CXV.

FRAXINVS. CXVI.

limes & crassæ. Cæteræ hanc florē ac fructu in Troas
disida credunt falsō: etenim fructum fert minutum
in siliquis, nucum formā qualem amygdalæ, gustu sub-
salsum. Fert & lauri modo fraxinus mufcum: & alia
quædam astrictiora gustu, circinatæq; ut pilulæ pla-
tani. Hæc partim cum fructu emergunt, partim multo
post nascuntur ei, & quæ ^{παλιν} hoc est plicamē-
ta florē inuolucra dicitur. Læx exire amat cauis ma-
dentibus glocis, scabra, sititibus & saxosis. In Macedo-
nia ^{βοτανικῶν} appellant raro corpore, minusq; cris-
pō, amplissimā & lentissimā. Fraxinus, pirus, pira-
ster, solæ in planis & materia & fructu cōmendār-
. Opportuna cædi uti mōdo est. Materies ad plurima
utilis. In Ida Troadis intantum similis cedro cori-
cæ ablato, ut Plinius: taxo, Theophrastus ementē
uti fallat. Quidā si dūifere fraxinū: campestrē cris-
pam, montāā spissā. Folia eaz iumentis mortife-
ra: cæteris ruminantū innocua, idēq; in Græcia. Nihil
iumentis nocent in Italia. Et hoc de taxo Theophras-
tus interpretatur, non de fraxino. Fortasse nomini
uicinitas fecellit prodentes, Græcis fraxinū ^{μαλικῶν}, tam-
quam ^{μαλιν} uocantibus. Matutinis occidentēsq; um-
bras eius, quīs sunt longissimæ, nulla serpens attingit.
Expertū fē Plinius dicere, si fronde cæ gyro claudatur
ignis & serpens, in ignē potius q̃ in fraxinū fugere ser-
pentē. Fraxinus anteq̃ serpēs predeant, flores: nec
ante cōditas, folia dimittit. A fraxiniflorēq; similis-
dine fraxinula siue fraxinago herba dicitē, ueteribus
nūq̃ dicta quod equidē scīā. Mauritania uel hāc uel
similē fraxinulæ seaculum appellat, in cōpositionē
ad Venērē excitandā quasitas adhibetā, radice candi-
dā & nodosa, florē uiolaceo, serē inter candidū & ce-
ruleū: semine rotundo, ut iuniperi: folio inter pifum
atq; fraxinum. Non desunt tamen quī decaculum ex
India tantum inuehi putent, notis quas modo ex-
posui: quādoquidē fraxinago hæc, quæ in nostris
habetur manibus, inefficax & infirma lenitur ad
medicinam.

СХУП.

Populus duplex, alba & nigra: alba *μύρα*, nigra, *αΐψα* & Græca appellata: utriusq; folia ut Crotonis in iuuenta circinata: rotunditas sunt uetustiora in angulos exeunt. E' contrario hederæ angulosa rotundantur, propterea meminit Theophrastus putare quosdā mutari candidā, ut croton & helix in hederā uetustate, quæadmodū & pirus in pirastum. Habet candida cum quibusdā per paucis proprietatē illā, ut ab æstiuo solstitio circumagatur, hoc est partes supinas foliorū conuertat, sicut olea, salix, ulmus & tilia: quod quidē sideris confecti rusticis argumentū est. Vtrumq; genus erexit: sed nigra procior & læuior. Foliū simile ligno: intus utriq; par canoro. Neutra uidetur florere. Populus: folijs grandifolia malauugo, Græci *χμύρα* appellant. Euolat cadidæ, ut iulius. Noltritia genera populi fecerunt: albæ, quæ uisus, bryon uocatas, ferat, unguentis: folio numero siore, bicolore, superne candido, inferiore parte uiridi: Nigræ, quā Arcades sterile putauere: sed in Creta fructifera, in ipso Idæo specus aditus: & ad fontē quodam Sauri, duodecim ab eo loco Itadys in Cindrio quod proximo ab Ida monte, & circa Tirasia parte montis. Tertij genus Lybica, folio minimo ac nigerrimæ, fungis genafentibus laudatissima. Populi ferūt in folijs guttā, ex qua apes propolim suā faciūt. Inter nigras efficacissima populus est, quæ in Creta nascitur.

nascitur. Aristoteles autor est, acheron uocari nigra populū. Pausanias candidā, ita nominatā, q̄ Hercules in descensu ab inferis apud Acherontē uidisset eam, ramūq̄ exulsiſſet: proindeq̄ non alio ligno cremati uictimas in Elide Ioui Olympio. Aristoteles omne fatū syluofum arborofumq̄, acherusion dici prodidit: ad quod forte altius p̄cedis festiuissimus, ulmorum Acheronē dixerit in Amphitruone. Resina populo exigua est. Humor ē cauis huius effluit medicina utilis. Oleū fit ē populo nigra, semine populeū uulgo, agrinonā græcis appellatū. Verno id conficitur, cum plurimum grauis est prægnaſq̄ resina: nam unguentum populeum ex uua populi, quæ bryon est, conficitur.

MACIR.

CXVIII.

M Acir græce *μακίρ* ē *βυλμυδόν*: cortex est rubēs, radicis magne, nomine arboris fuit. Conuehitur ex India, gustu acerbo, & cū quadam acrimonia, iocunde odoratu, ut galenus inquit: qualis ea sit incompertū habet Plinius. Recentiores, non radicis, sed nucis odoratæ corticē ac folliculū esse affirmant: idq̄ uero propius est, & planē ita modo certatur. Hanc nucē græci modo caryon myristicon appellant, hoc est nucem unguentariam, quæ sanē diuersa est ā glande unguentaria, ut post constabit.

POPVLVS NIGRA.

CXIX.

P Opulus nigra: qualis ea sit, indicatum est in cādis. De ipso autē electro: funt qui tria eius genera constituant, ex arboris succo primū, quod inde succinū dicatur, ut non hoc fit qd̄ Homerus nouerit: Secundū naturale, quinta parte argenti, ut in calienſi auro: Tertiū cura fit, ex tribus auri partibus & una argenti: q̄q̄ quod quintā partē argenti excēdit, incandibus non resistit. Errat Plinius existimat q̄ melius esse putant naturale, cuius probatio, ut uene non accepto & fridore emittat, & uarios quasi arcus celestis in dissimilitudinē reddat colores. Narratur & hæc ad lucernā lumina clariis argento splendē. Electrū inquit Strabo, purgamentum ipsum auri est, coctura prima, quod ex sulphurosa cuiusdā cretæ comitatu fit. Argentiū aurūq̄ in se complexū, chy miste Phaethontē uocant. Diuersum ab hoc uidetur genus esse quod ambrā siue amparcani num dicitur, Aëtius ambar, nos succinū orientale primi nominauimus: incompertū ueteribus, ut arbitror: multis locis scaturiens, bituminis & sulphuris modo. Discrimen eius triplex: Ruffum & pingue præferunt, Selachiticū ā municipio quodam Indiæ uocatur, ubi nascit̄: Subalbidū ex Arabia Felici. Minus probatur ē maritimo quodā oppido, cui Secchra nomen est: Determiū nigrescit, quod pices deuorauere: de hoc tamen alij aliter: nos Græcā fidem sequimur.

VLMVS.

CXX.

V Lmū *βύλμυδον* Græci uocat, utiq̄ campeſtrem, quæ & fruticosior: Altræ genus mōtanæ *βύλμυδον* nomināt. Folij diuissimū, leuiter perorā ferratū, oblongius q̄ piro, scabrū. Arbor grandis & celsa, irriguis amica, ligno flauo, neruoſo, robusto, ut quæ tota cor sit. Vtuntur eo ad fores lautiores, ad cardines, allamenta portarū & torcularia, fontū caueas, & ad carpentariū quandoq̄ opus. Viridis facile cadit, sicca difficile. Sterilis habetur arbor. Gradæ ulmo, ut fico, robori, platanoq̄ gignuntur. Vuā fert, & in petiolis lachrymæ modo gummi, & bestiolas culicibus caprifici similes, in folliculis & autūno, ca-

chyres uocatas, complures minutas atque nigras, ut Theophrastus scribit. Italiæ quatuor ulmi sunt genera: nostrates denſiore folio, & ab eodē pediculo numerosiore: gallicū, syluestre: quartū Aتينias uocant, excellissimas, & in his Sicanas illis præferunt, quæ nō sunt riguæ: steriles Aتينias: ideo plantisferuntur, autūno uicibus, & maritas appellamus. Reliquæ proueniūt samara siue amara, ut Columellæ placet (ita nominatur ulmi semen) Colliguntur circa Marias kalendas, cū flauescere incipit, priusq̄ folio uestiant ulmi. Columellā ulmorum quatuor tantum genera putauit: Gallicum, & uernaculum: illud Aتينiam, hoc nostratem uocari: qui & Tremellium Scropham reprehendit, q̄ Aتينiam ulmum non ferentem amaram, falsū sit opinatus: nam rarior ē inquit sine dubio cetera: & iccirco perisq̄ sterilis uidetur, feminibus inter frondem primæ germinationis latentibus: itaq̄ nemo inferit ex amara sed ex foliobus. Est autem Aتينia longe lætior & procerior noſtrate, frondēq̄ iucundiorē bubus præbet. Amara, ut dixi, dicitur semen eius Latina uoce: nam Græce *ἀμύρα* non hoc significat, sed riuium & incile, rigandis hortis, ita dictum, quia marcescere prohibeat: sed & aurum cauernæ dicuntur ā græcis amare.

CARIES LIGNORVM

CXXI.

Ariem lignorum *καρύνειν* Græci uocant, & embion poetæ.

HARVND.

CXXII.

H Arundo *καλαμὸς* ā Græcis dicitur, ā Phœnici bus gingros, ab Adonin, quætingrē uocant, & lugent: Radices eius uiuaces, geniculatæ, ac ferē infolias, similesq̄ partibus, quæ supra terram eminet. Huius duo summa genera: Tibiariū, hoc est *ἀλμυγρ*, uulgarē posterius: hoc in characiā, hoc est ual larem, crassam & ualidā, quæ græcanica quoq̄ uulgo dicitur, & ā Vitruuio ceterone græca. Et in plociā siue plocimon diducitur, hoc est fluctū uel nexilē, gracilio rem & imbecilliorē priore: utraq̄ Orchomeniū circa lacū. Superior in ripis expatiantis stagni, & in comythibus (sic enim harundinetū prædensum & farctū appellat) se quens subtilis, in infusis fluitantibus quas græci ploadas uocant, in immensum prolatiſq̄ q̄s Cephissus amnis abluisset, ut cecinit Pindarus. Interim cum auletico nascitur characias, sed longior cæteris, & uermibus obnoxia. Tibialis hyeme gelat, uere tunicas eximunt: æstate per internodia cadunt. Optima fieri armamenta ē medio geniculo: molissima ē superioribus: durissima ex imis asserūt. Peruasum erat & ligulā ex sua quantitatū harundinis parte congruere: & eam quæ radicem antecesserit, leuio tibias lateri conuenire: quæ cacumen, cetero: cæterū internodio in duas partes dissecto, utriusq̄ ligulæ os inficere cōmittitur: aliās negatur congruere: Theophrastus auctor, Plinius magno nominum ambitu calamos enumerat, & ægyptios chartis seruat, probatiores tamen onidos, & quin Asia circa Anæticū amnem nascitur. Noſtratis fungus fior natura, bibulos, cauo intus corpore, tenui superne ligno fissiles, præcacta semper acie geniculatos. Gracilitas nodis distincta, leui fastigio tenuatur in cacumina, crassiore paniculæ coma, qua pro pluma implentur strata capouarū: & hæc ad nauium cōmissuras in Belgis, glutino quocunque fidelior rimis explendis. Bono niefes ē Rhenomamne, quibus plurima inest mædulla, pondusq̄ uolucres: contra flatus quoq̄ petui-

peruicax libra, ut nullus sagittis apior sit calamus. Post hos Cretici & Belgici laudantur. Creticus carnosissimus, longissimus internodijs, lentissimus si calseat, *ῥῆγιδι*, id est sagittarius, ob excellentem eius usum à Theophrasto dictus: Nunc scriptorius ex ea insula præcipuus, nec alius de ferè expetitur. Omnibus præterest Indi, ut qui hastarum quoque uicem præparat, hoc est cupidibus additis præbeant: *ῖς* amplitudo arborea est: nec dubitatur e quass radicibus, ut Solino placet, succus exprimitur ad suauitatem mellis, quasi saccharis interpretari possis. *ῥῆγιδι* subrecta rum triginta ferè passus: humi uero serpeticum, quinquaginta. Crassitudo cubitorum ternum, interim semilem ferentes, e quo suauissimus panis conficitur, æque fabulosum acgillud: quod in ea dè insula duas nasci tradit herbas, supra quas iacentes palcidissimo somno moriantur. In Aethiopia certe populi radicibus harundinum in farina tritis uictitant, & ob id *ῥῆγιδι* nominantur. Spissius mari corpus Indi tradit, sceminæ capax: nauigio etiam loco singulis eorum internodijs circa Aësinè maxime annè ternos homines capiente alueo. *ῥῆγιδι* moros concauus, ita dictus, quia fistulis utilissimus: quoniam nihil si ei car tilaginis atq; carnis, ut Plinius existimat. Dioscorides crassa e carne descripta. Tibialis Orchemeni? id est auleticus, continuo foramine, peruius est: fruticosissimus *ῥῆγιδι*, nō nisi in aquaticis natus, Latine canna: quanq; canna apud nos, ut inquit Columella, gracile & degenerem significat harundinē. Apud ægræcos fistellæ genus canna dicitur, ut apud Pollucē. Præfertur aquaticis siccus. Laconicis foliū uariū, & ab ima parte densius, tuncis longioribus, quales circa stagna, diffusimiles amnicis. Est & obliqua harūdo, nō excelsa, sed iuxta terram fruticis modo se spargens: suauissima in terreatate pecori: ab aliquibus uocaf elegia. *ῥῆγιδι* calami dicunt, armamentarius Theodorus interpretatur, cum in amplitudinē aucupatorium adolefcent aulectici lacu Orchemenio, influente Cephiō amne, permanentesq; anno: celerius autē recedente, graciliores bombycinæ appellabantur. Horum genetum sceminæ, spadōes & eunuchiæ uocari solite, folio latiore, candidiore, nulla uel modica lanugine. Hinc erant armamenta ad cantus inclusos, quæ græci iugamenta siue paria, hoc est *ῥῆγιδι* ad dexteram & sinistram tibiam utilia, uocabant: quod ita essent coniunctæ, ut altera eiusdem carminis incertitia, altera succentia foret: ad bacteriā à Theophrasto (nisi fallor) appellatos. De Bacteria meminit & Plutarchus & Pollux, gestamq; theatralium personarum de monstrant esse, ut scipionem Plautus rectum insignibus, curuum ignobilibus. In sacris certè lictis bacteria dicitur inuocatio ea, quæ post præptionem addi solet. Quid si quis, in Theophrasto nō ad *ῥῆγιδι*, sed *ῥῆγιδι* legendum putet? Erat autem hoc & loci nomē, ut inquit Pollux, & theatralis cuiusdam operæ cantionis, ut genus statarium, & circa saltationem ac tripodum, quo Lacædæmonios & Arcades uti solitos incinente modulos & frequentamenta quædam simplicia tibiae, Athenæus commemorat, quod et *ῥῆγιδι* uocauerint: etiā *ῥῆγιδι*, hoc est ingressione incessionemq; ut est apud Gelium. Ob id inclusos cantus à Plinio dictos intelligo,

quibus antiquitas in theatro contenta erat, simplicia adhuc musica, hoc est, ut Theophrastus inquit, *ῥῆγιδι*, conprimenibus e tibiaturum ligulis, quia temperstive cæderentur: Ideoq; ad uarietates flexusq; sonorum, in uicibus: ad hoc exempli: *ῥῆγιδι* uocabant, cuius inuentor Aristonicus fuisse dicit, ut Athenæus meminit. Illos autem quibus operosa ratio canendi placuit, *ῥῆγιδι* uocum inflexione appellauerunt: quod nomen in Carini Cæsaris uita deprauatum correximus. Correxat hoc luxuria & per solsticia cædi placuit, ut in trimatu demū utiles fieret, a peritioribus earum ligulis ad flecendos sonos. Armamenta scinè Plinio est, ubi pro iugamentis uicinarum pedamentis uocauerit. Tibicines græci & monaulos & calamaulos & rhapsaulas quoq; dicunt. Habetur & illa distinctio: Tibiæ alie uirginales & puellares: alie uiriles, & perfectæ & plusq; perfectas cognominant. Sunt & citharisticæ quædam tibiæ: item quæ dactylicæ uocantur, & quæ lydiæ & tragicæ: lydiō uero dicebatur, qui missos quosdam sub personis muliebribus agebant, ut uirilibus magodi. Nam elimi tibiæ apud Sophoclem in Niobe, nihil aliud uidentur esse, q̃ Phrygiæ, quas & scytleas ob crassitudinem appellant, & obliquis, ut inquit Varro, siue impares: quæmadmodum serranas quæ pares essent, & æqualibus cauēntis: cū in Phrygijs dextera unū haberet foramen, sinistra duo: quarum inuentor Midas. Nominantur & *ῥῆγιδι*, hoc est, biforæ, quibus & nos utimur, sed e buxo alia uer materiæ: hæ corniculorū tubarumq; sunt & semper fuerunt comites. Habebatur olim & *ῥῆγιδι*, hoc est semioræ, quas & minores, & imperfectas, & puellares uocabant atq; tetrenas, hoc est, moluculas, epulis adhiberi solitas, ut hoc uideat Plautus intellexisse, cū semimonarios artifices quosdā nominat. Item Mesocampi & hyporretæ, quod alteræ in medio forat, alteræ ad imum pertulæ forent. Tityrina quoq; tibiæ eadem est quæ harundinæ: nam magadis & paleomagadis ea est, quæ acutum grauemq; sonum reddidit, genus citharisticæ tibiæ, q̃ magadis & p'alterij nomen est idem cum sambuca & pectide, ut multis placet, nec tamen omnibus. Alias quoq; tibiās in arbore lotodiximus. Singularem tibiā monocalamon & monaulum uocant, sicut mul'iplicem polycalamon: priorem Marfias Celæni, aut Mercurius inuenit. Alij Scythæ & Rhonacæ Medos homines inuenisse quide, sed Marfiam uinxisse cera putant: Aleas Silenus siue Marfias, quosq; poëtæ Græci tibiām plerumq; lebyn uocant, ab inuentoris patria, ut Duris scriptum reliquit. Varro præcenciū & succentiū cōnumerat: quas si usus ad pulmūaria præcinendi subcinēdiq; à quo & præcentores & subcētores appellatur. Item uasas foraminibusq; præcenciæ pluribus. Lydiās porro eademq; thurarias uocabant, q̃ inter thura adhiberentur. Gingrinæ tenuiorē sonum edebant q̃ uasas: clarissimæ Aegyptiæ: gamulū Arabicæ, ob id græci nugacem hominem Arabicum tonarium pro uerbio factō nominant. Acutissimæ gingrinæ habebantur & Corinthiæ, ut inquit Solutus. Gingrinās ab asnerina uoce dictas putant: nam & græci *ῥῆγιδι* pro eo quod est tibia sonare, dicunt. Ego à ginge qui sit Adonis, ut huius capitis initio mōstrauimus. Erant & suæ funerum tibiæ siue tube, ut inquit Gellius, quarum peritos stiticias uocabant, non quasi siccinistas à genere tripodij, sed quod ad siros, hoc est ui-

est uita functos & terra conditos sonaret. Erant & tonaria, quibus ut errachus solebat; ad componendā in cōcone uocē, eburneis. Nota est hystoria. Est & in Italia nascens, ex qua fit a darca nomine de qua post dicemus. Aucupatoria sanē harundo à Panormo latidatissima legit & Panorito: piscatoria abaritana ex Africa. Musica harundines ex insula Siciliæ Thermitano agro sita laudantur, ut Solinus ait: Sunt & aliæ sine nominibus haridines, pccitate, breuitate, crassitudine, exilitate similibusq; distinctę, adeo ut uigintinoue eas genera demōstrasse Plinius se dixerit. Harundo omnis ex una stirpe numerosa atq; etā resicā deusta q; foecundior. Folia Indicis tantū breuiā: omnib; à nodo complexus initū est, mēbranis per ambitū tenuibus, rarior non à medio genu procūm benicibus: latera in rotunditatē bina, super nodos alternō semper inguine: hoc à dextra, illo ab leua, superiore per uices: inde exeunt aliquando ramī, qui sunt calamitenuēs. Mira huius & filicis discordia. Vtriusq; radix contrita & imposita, stipē alterius ejicit infixū corpori. Ad hunc usum ex harundinis radice medicamentū Hippocrates epipastron orchomeniū uidet quibusdam appellasse: Magna cum altero genere cōcordia: siquidē ut Cato precipit, optime corru da feritur, ubi sint harundines. Harundinibus septentrio domos suas operit: duratq; ita in altitudine tegulum earū in reliquo orbe cameras lufissime suspendunt. Harundinis Italice usus ad uineas quoq; ut Arpino agro. Panicula florē illā autribus infestū dicitur Græci appellant.

PAPYRVS.

Papyrus & papyrū Latine dicitur: in palostrib; Aegypti aut quiescentibus Nili aquis nascitur: quæ regio Delta & inferior pars uocatur: Item Syria, circa quē odoratus ille calamus lacū nascitur: & in Euphrate circa Babylonē. In Aegypto non ex cē dēte bina cubita gurgit altitudine, uolari hominis robusti brachialiq; radicis crassitudine. Obliqua hæc atq; densa, nō amplius q̄ cubitor; decē longitudinis, Triangulis papyros lateribus, quā tēra multis partibus tolluntur, pedibus, ut inquit Strabo, decē, uel ut aliq; cubitis quaternis. In gracilitate fastigiati sustinentur, nec ignis tantū gratia, sed ad alia quoq; utensilia uasorum, aut quæ proba & alta materie sint. Ex ipso quidē papyro nauigia texunt. & libro uela tegetesq; necnō & uestis genus, & stragula, & funes. Māduunt crudū, elixū suco deuorato, corpus expuētes. Scitur & usus ex eo ad chartas ueteribus: nunc alia earū officini inuenta ratio est. Habetur & in Aethiopia & Italia papyr; uel promiscue, Ciminio lacu plurimum, sed alterius forte generis, nec ad chartas utile: quādoquidē Aegypto propria tribuitur, & biblos appellatur: alioqui Strabo in India quoq; nasci biblū scribit. Idem autor in parte Nili quæ dicitur inferior, abundare tradit eam: quoniam ibi præcipue colatur: & duorum esse generum, deteriorē, & meliorem, quæ hieratica dicitur, unde & nomen chartę Plinio. Herodotus ueteri cōsuetudinē pelles quoq; hircinas & ouillas biblos uocari tradit, q̄ ijs in penuria chararum ueretur uita.

MYRICE.

CXXIII.

Myrice, tamaricis uocantur Corinthi, & in Achaia: quæ circa est, brya dicitur: & cū plus

iusto adoleuit, promalea uicq; poetis. Syluestris & sterilis forte quia fructus ei, Epipastros, hoc est muscosus: nam satiuæ similis gallæ prouenit, quæ in Syria & in Aegypto copiosa etiā est. Hanc & amaricē nonnulli appellant, simile copias Amerinis prodentes: neg tamen omnibus eandē esse tamaricē & amaricē placet. Myrices certe infolicia ligna uulgo nominant, quoniam nihil ferat præter flosculum de quo diximus, muscosum: nec feratur unq;. Huius cū uno uiscerū liene tanta dissidentia est, ut affirmat à Democrito sumentes, si ex ea calicibus uel factis bibat fues, sine liene inueniri: Et ideo homini splenetico cibum potūq; dant in uasis ex ea fabricatis. Illud obiter indicandum est Columellæ stu diosis, ut locū in viii. eius libro corrigant, ita scriptū: Succurrit, inquit, si fabricentur canales tamaricis & rusco. legendū est, tamaricis & trunco. autōr Dioscorides. Nec illud nō do tendū, qui uitro soluēdo firmādoq; accurant, ex hac arbore potissimū igni suo eācā ministrant. Huius radicē officinæ casia uocare solent: & quæ palā impericia medicorum est, pro casia odorata utuntur. Folium myricæ sunt quæ Sabinæ herbæ nonnulli simile pronuntiant.

ERICE.

CXXV.

Ericem colore tradunt roris marini ac penesolio: propterea Theophrastus uertimā Libanotide ericē nasci refert. Mel q; & flore huius apes faciunt, ericē uocatur, simile arenoso, syluestre, improbumq;. Conuehitur post primos autumnii imbres cum erica. Sola floret in syluis. Asia Græciatq; fruticibus ascribitur. Athe nientes hæc, ut ait Plinius, tetradicen, Euboea sifag, siue ut Varro, sifara, unde liquidū mel stat putantq; apibus esse gratissimā: fortassis quia tunc nulla alia sit copia. Theophrastus tetralicen non tetradicē, nisi mendosus codex est, appellat in genere fruticū aculeatā & germinantē alta te. De hac erice intelligat nec ne, haud scio: ga tamen bis anno floret erice, prima uidelicet & ultima syluestrium, nec inter aculeatas ponitur, fieri potest ut alia sit tetralix sua Theophrasto, alia que pro erice Athenis capitur: nisi quis hanc tetradicē, illā tetralicen uocari malit. Meminit & tetragonia uocat Theophrastus, sed inter arbores quæ tardissime germinat, ut thyia taxusq;. The odoros quadratoriā interpretatus est, melius si quadrangulā. Columella ericē intelligit, cum amaricū siue amaricē & amaricinos flores cōmemorat: q̄q; ubi lectio corrupta in eo feret nam & amarachini pro amaricinis, & tamaricē pro amarice scriptū fere inuenias: cum sit tamarice non erica, sed myrica. Cōsuidit hoc Palladius, qui tertiam mellationē tamaricis floribus (ita enim uocat ipse tamaricē) constare tradidit, cum erices id est amaricæ, non tamaricis pabulo fiat, autore Plinio: nisi quis tamaricis appellatione ueteres & ericē & myricē significare uoluisse dixerit. Plinius ericē licet simile describit. Credo myricē non licē legendū, cū Dioscoridis autoritate, tum q; ita modo cernitur in Patauinis montibus: non quidē folio, quod ei roris marini simile tribuitur, sed musco, quē floris uice habet, ut myrica. Quod autē erice uideatur etiā uocata siderites, libro Plinij xi. Nos eum locum in castigatiōe Plinianā deprauatum ostendimus.

ACACALIS.

CXXVI.

Acacalin Paulus acallida nominat: Galenus ubi meminerit, nondum cōpēnt. Nomen fructu

tici à nympha dauū crediderim Acacali: quæ ab Apolline cōpreſſa, Phylacidē & Phylandrū ediderit in Creta: miraculo ab Elytæis inſula populū conſictō: nuntios à capra coſuiſſe: cuius rei monumētū in Apollinis quoq; Delphici delubro monſtrabat: auctor Pauſanias. Apolloni⁹ poëta in argonautico Acacalin Minois regis filiā ab Apollīne quidē uitiatā cecinit: ſed quæ in Aphricam relegata filium ediderit nomine Amphithoon, qui & Garamas quoq; uocaretur, Naſamoni⁹ & Caphari⁹ pater, ex nympha Tritonide.

R H A M N V S. CXXVII.

Rhamnū igniarij⁹ uti⁹ ſerunt, præſertim cōceptaculo & craticulæ. In duo genera diuiditur, nigrū & candidū. Vtriq; fructus parentū colore. Nigrū folliculoſum fert, ſylueſtreq; habetur. Huius radice decocta in aqua, ſit medicamentū quod uocaſ Lycium. Rhamnū intertribog⁹ genera deſcribitur. Hæc Theophræſtū Pliniūq; ſecuti diximus: aliter à Dioſcoride monſtratur. Photion rhamnū à quibuſdā agnō, à uirtutis ſimilitudine uocatā ſcribit, q^{uod} Venerem cohercet ut uiter. Rhamnū Dioſcorides à noſtris ſpinā cerualē dicit appellari. Quo argumento uideri poteſt, haud diſſimile huic genus eſſe q^{uod} hodieq; uulgo ſpinā ceruinā uocamus, fructū myrti, foris nigro, intus uirido: ob id uelad colore eum pingēbus idoneo. Cortex arbori ſubnigr⁹ & nitidus quaſi ceraſo: intus uirens, poſt leuē lignū extra cādidū, interior medulla rubet.

H A L I M O N CXXVIII.

Halimon noſtri, ut air Plinius, aureonē uocāt. Cōuoluit ſe ut hederā. Locis ſaliſis naſcitur, ſalſuginēq; præfert. Sit hæc de qua Dioſcorides & Plinius à quibuſdā aſphodelon ſiue albu⁹ cū exiſtimatā perhibēt, an alia, mihi paſſim cōſtat. Reperio autē in autorib⁹ modo aſſatā, modo nude ſcriptā primā literā: placet aſpiratio, quoniam maritimū olus credat, & halmij⁹ etiā à ſalſilagine dicat ab Aëtio. Aſphodelon appellari halimon ab Heſiodo quidā falſo interpretat⁹: qui tamen error à græcis ortus, peruenit & ad Latinos. De halimo diſcrepat ſententiæ: aliq^{ui} fructū eſſe uolūt, deſum, candidū, ſine ſpina, folijs oleæ mollioribus, laciſioribus, quæ cibo coquatur: addūt in maritimitas nationi. Alij ſeparat, maritimū olus dicentes halimon & ſalſum: unde nomē folijs in rotunditatē longis, q^{uod} & mādatur cōdiaturq;. Duoq; præterea generū, ſylueſtre & mitius. Folij ſylueſtri tenuius, maiores effectus. Crateias tertij⁹ genus facit, longioribus folijs & pulſioribus, odore cupreſſi, naſcēs ſub hederā. Galenus halimū in Cilicia provenire copioſam, ibiq; folia recentis in cibos recipi, & in uſum cōdita ſeruari ſcribit. Solinus halimon in Creta naſci tradit, mirabili ſi credamus effectu, q^{uod} aduerſa ea faſtes interdiu nulla ſentiantur: ut nomen inde impoſitū ei ſit, quaſi ſamē ſcarcat, propterea q^{uod} nec aſpirationem primā litera recipiat.

P A L I V R V S. CXXIX.

Palivrus ut in fructu⁹ genere colloceatur, in magnitudine arboris aſſurgit. Ab occaſu uergiliarū fructificat. Fert in liquis rerna & quaterna ſemina, lentorē quendā pingui⁹ emittentia, ut lini ſemē, cōſula. Amat naſci aridis, quemadmodū & rubi, nec min⁹ dilutus. Folij excidui ſicut rhāno. Cyrenis laudatiſſimus, ubi loro q^{uod} præferūt, eodē folio deſc^{endit} fructu diuerſo, ut qui nō latus, ſed rotundus ruberq; ſit nucleo, qui nō ſimul mādatur ut in Punicis. Magnitudo ei quæ fructibus cedri paulo⁹ ue amplior, nominatā ab Afris zura, iocūdus per ſe, atq; ſuauior etiā uino aſſuſus: cōtra q^{uod} uina ſucco ſuo cōmendās. Palivrus ſpinofa ramis, ut rubus. Agathocles palivurū ab

Alexādrinis connaq; uocari tradit, enatā ſcribēs iſto fulmine ſepulchro: ulmi atq; pinus amplitudine, ramis frequētibus, prælōgis, ſubaculeatis: folio uirido, rotūdo, molli, biferānā & uere & autūno fructū parit, oliuæ Phauliæ uocatæ magnitudine, cui & nucleo & carne ſimilis eſt, ſapore uincēs. Crudus uirēſq; mādū: ubi exoleuit, ſarinā ex co fieri, atq; iſta eſtari, nec ſubactā nec cōſperſam aqua. Ichthyophagi piſciū carnes ſemine paliuri cōditas inueterāt: Troglodytæ ſucco paliuri po uino utitur uulgo: nā proceſſes florē quendā exprimit, cuius liq^{uor} noſtrati muſco ſimilis aſpiciunt.

OXYACANTHOS.

CXXX.

Oxyacanth⁹ quæ ſit, in Plinio nō cōperi. Medicinas certē quas Dioſcorides ei tribuit, paliuro Plinius dicauit. Dicitur hæc & oxyacantha Olympe mōte plurima, ſylueſtriū arbor, frōdis eter-næ, ab occaſu uergiliarū rariſſima, flore coronario, fructū cedri atq; myrti. Rura modo hæc criſpinā, quaſi a creſpinā uocatā, ut multis placet: ex cui⁹ a cinis uinū etiā cōſicit criſpinū uocari, eodē ſerē uſu, q^{uod} uinū ex malo Punico. Singulares in acinis quibuſq; nuclej ſunt. Acini oblōgi, & race matim cōgeſti: folia q^{uod} poblōga diuerſum gen⁹ eſt q^{uod} uā ſerit criſpinā uulgo dictā, ueteribus præteriti⁹, acinis cādidis, & in maturitate dulcibus: aculeato fructe, folio ap^{er} ſerē, in hortis frequēs. Habet & alter frutex, æque ſpinis horridus, ſed copiaribus magis, & uitis puſilli, folio rubētis uue ferrilis: nec in Italia modo, ſed in Germania q^{uod} mihi uiſus.

CYNOSBATO S.

CXXXI.

Kynobato⁹ & caninus uulgo rubus, à Theodoro caninibus, Columella ſentē canis: fructu maturograno ſimili, ſubrubido, media inter arborem fructicēq; natura, & proxima Punicæ. Folij ſalicis Amering, Theophrasto anni, q^{uod} legendum puto *κνυγν*, hoc eſt, ut ueſtigio humano ſimile dicat, quod Plinius ita uerterit. Er ſane uſam aſe rubū quidā teſtatur in ſyluiſ hac ſpecie, ut quaſi ſolea eſſe uideret. Flata uero ſerit huius legendū præcipiūt, alioqui periclitatur oculi. Plinius hæc ab alijs cynosbaton ab alijs neuroſpaſiū uocari ſcribit. Vuā ſerit nigrā, in cuius acino neruus ſit, unde neruus paſſus dicat. Idē ſit hoc nec ne cū eo q^{uod} Dioſcorides itēq; Theophrastus deliniant, cōſiderandū peritoribus exiſtimo. Rubus certē qui ſimilitudinē roſæ fert, & caſtaneæ ſimilē pilulā, cynosbatos à Plinio dicta eſt. Alia uideſſe eſſe cynorhodon, de qua diximus inter roſas. Nec illud conſtat, nūquid rubi huius ſit roſa quæ coroneola uocatur, munus autēmi, odore uicūdo, ſed exili⁹an potius cynorhodi appellatā. Nec illud omittere cōſtituit, cynorhodō à cynosbato nō flore roſeo, quē ſerit utriq; ſed ſpōgiolis diſtingui, quas cynorhodon habet, cynosbatos nō habet. Parit & uā nigrā cynosbatos, ut prædiximus ex Plinij ſententiā: quod quidē nemo præter eū (quod ſciā) confirmat. Hoc ſi error eſt, fortāſſe nat⁹ in ſit, qm̄ hederā Cilicia, hoc eſt, ſimilax aſpera, labruſcæ modo ſerēs uuas, cynosbatos à quibuſdā uocari ſoleat, ut Dioſcorides teſtatur.

CYPRV S.

CXXXII.

Cyp^{rus} quidā, ut Plinius inquit, eē dicitur arbor, quæ in Italia liguſtri uocat, ſemine coriandrifolio ziziphi. Præſert Canopica, poſt Aſcalonica, ultimus locus Cypriæ. Seruius grāmaticus liguſtri florē ſcribit eē cādidū ſimū ac uiliſſimum: forſaſe hunc intelligens, qui ē cōuoluo herba naſcitur: nam & hic barbæ ac uulgo dicitur liguſtrum, ut in clematide ſecunda monui. Cyprus & hemicyprus

uasis & mensuræ genus est, coquis, ut placet Iulio Pollucio cognitur.

TILIA.

CXXXIII.

Tiliam Græci φιλύρα, nostri quoque phelyræ et philyræ, sed tunicas ex ea tenuissimas appellant. Corona læniscis celebres ueteribus, inter corticē & lignū membrana multiplici contentas, e quibus uincula tilix uocantur. Materies mari sentico fa, dura, nodosa, ruffior & odoratio: cortex crassior, ac detractus statim inflexibilis, sine semine, sine flore. Crassior sceminae arbor & materies candida est, atque præcellens, e qua tilix philyræ uiles quas diximus. Arbor hæc serotina, folijs dulcibus esculētis, que pecori, sed fructu animalibus omnibus ingusta bili. Teredinem non sentit, proceritate perquam modica, uerū utilis, ut operibus intestinis uel obediētissima, etiā si abies, ut Theophrastus inquit, pulcher rima defenditur. E cortice sceminae & cunæ fiunt atque ciste, nauium longasq; asseres, & arcule, mensurarumq; nonnulla genera eligno: probat & ignarijs. Medulla exigua est, nec magnopere cætero corpore mollior: est em̄ materia eius tota mollis, ut inter carnosas mollissima calidissimaq; dicatur, quonia cistifimæ retidat ascias, tincturā eaq; caloris sui ui resoluens. Cæditur autumno. Cinefias poeta flagitiosissimus, in quem Lyfse oratoris plena conuicijs & sto machi legit oratio, tā gracilis fuisse dicit, ut tinaceis asseribus corpori circumdatis, imbecillitatē suam fulcriter, ut Phileras alter poeta plūbes orbiculis circū pedes adalligatis, ne ueto subueri posset. theophrastus quādoq; nominat & philycam. Syluestris inquit arbor est philyca fronde perpetua, Olympo monte fructum suū ab occasu uergiliæ edit, celastri modo cādida. Theodorus philycā hanc à tilia siue philyra differre censuit: Vt angustam & candidam & alendū pecori uilem demonstratā, legebat & serotinam. Celaster porro syluestris arbor perpetuo uiuens. Fructum sero perficit, atque hyemis superuētu perdit, ut quidā putant. Cacuminihus montium gelidissimis in nascitur: cura deterior efficitur: usus ad baculos senibus. Plinius odoratiorem tilix mari corticē quā sceminae: Theophrastus contrā, sceming quā mari tribuit. Flos calicaceus, pediculo quisque suo annexus, uridi quandiu alabaistro includitur. Dehiscētes ijs hauescunt. Floret pariter cum mitibus & urbanis. Fructus oblongus, & ad fabæ magnitudinem rotundus, similis a cino hedere, maiuscul⁹, angulis quinis, ceu nerui quibusdam in acutum depressis extuberrat. Partitionem hanc exilior indigestam & omnino confusioiem habet: maior, si scabatur. Semina emittit pusilla & præter uia, ut uideri possint atriplicis. Folij hederæ, nisi quod se in acutiorem angulum rotundat, incuruum qua pediculo innectitur, e medio sui prodiit in acumen: crispum per orbem mollior ac ferratum. Laurentius Valla in Herodoto conuertit tiliam falsā, quæ autor ille iteā uocat, quæ salix est, nō tilia.

CISTVS.

CXXXIII.

Kis & Kistæ & a cisso differt, quod cissus hedera tantum est, cistus siue generis frutex: quæ uicinitas, nisi quis aduertat, facile cōfudet intellectum. Describitur maior thymo, folijs ocimi, & sanè inter hederas mēcio eius a Plinio habita est. Præterea hederæ speciem uidentur auctores existimasse, qui ladanum capris depecti tradant, quæ florem hederæ pauerint: cum constet ex Dioscoride, fruticem,

unde id fiat, ciston uocari, speciem alteram cissi huius, de quo nunc agimus, ut in commentatione post hypocistidem proxima explicabitur.

HYPOCISTIS.

CXXXV.

Hypocistis & ὑπόκιστος. Triplex huius ratio à Dioscoride proditur: Alij ruffa & cādida sunt contenti, ut Plinius. In montibus Patauinis hypocistim uidere licet, & ciston, sub qua nascitur ocimi folio, ut præ diximus, flore cādido quasi rore syluestris: radice lignosa & prædura, e cuius fete medio hypocistis uelut infixæ pullulat.

CISTO ALIA.

CXXXVI.

Cistos siue ledon & lada: sed ladanū in Arabia Nabathæis tantū nascitur, qui sunt contermini Syriæ. In iuria illa qua diximus capræ, sed nō e lada herba, uerū ex omni sylva. Hoc genus strobem uocari placuit. Est & genus aliud in Syria & Africa, toxicon dictū, quia neruos in arcu lana circumdatos trahunt per sylvas, adhærescente roscida lanugine: sed uerū ladanū Cypri in insula fit, quæ celyphū hircorum in pascendo genibus atque barbis hæsit, hederæ ut Plinius inquit flore derafo, passibus maruinis cū est rotulenta Cypirus, siue funibus tractis, quo dictū est modo. Non omitrendū hederā quidē putari cisto à Plinio, de cuius flore colligat ladanū: Non quæ cistos aliud non fit hederæ quæ cistos à Græcis appellata, sed quæ species eius una etiā fit, à nostrate multū diuersa: quandoquidē & Paulus Aeginita scribit Ladanum ex hedera ladoc cognominata fieri. Et Dioscorides ciston à quibusdā cissarū quoque dicit tradidit, quasi hederaculā inter præteritis aude hedera ginē. In Carmania & super Aegypti fruticē esse narrat per Ptolemaeos translatis plantis, ex quo ladanū fiat: sunt qui ladanū gummi modo ex arbore laxati corticis uulnere, ut thura colligi, & caprinis pellibus excipi cōmemorent. Adulteratur myrti bacis & animalium sordibus. Synceri odor debet esse ferus, & solitudinē redolens: ipsum accensum fulgere, odore in hyemum dum reddere. Myrtata in igne crepant. Placet cui e rupibus calculi potius quæ pulvis inhæreat. Pretia lada cissimo in libras, asses xl. Aëtius ciston e qua ladanum fit, eandē esse cū cisto nostrate, sub qua hypocistis nascitur, affirmat: fed calidioris naturæ ob qualitatem soli.

EBENVS.

CXXXVII.

Ebenus siue ebenū spissitudine ligni & pondere in aqua non innatat, sed mergitur tantū, non tota ut buxus, cui similis esse dicitur, sed pars eius medullacea. Decorticato summa nigrities. Ebenus cæsa durefcit in lapidem, ut iam uideatur hodie quoque partim saxū, partim lignū, ceu inchoato opere, non perfectio. Duo genera eius: rax, id quæ melius, arboreū, truncō enodi: alteræ fruticosum, cyti modo, tota India dispersum. Ebenus Aethiopia nō alia quæ palmarū generis esse traditur: lignū ebeni Galenus, si quis aqua infusa terat, in succū inquit resoluitur, ut nonnulli quoque lapides. Magnus Pompeius in triumphum Mithridaticū bello duxit ebenū. Paulianus a Cyprio quodā medico accepisse tradit, ebenum radicem tantum esse terra conditam, nec folia nec fructus ullos edere, propterea nec omnibus inueniunt casilem, sed in Aethiopia quosdam esse huius operis artifices, hoc est ebeni seruandignaros.

ROSA.

CXXXVIII.

Rosam Græci ῥόδον & poetæ ῥοδάκη, sed plantā eius rhodoniam, ut nos rosarium appellant.

est.

Est & condimēti pretiosi genus rhodonia, quam & rhodontiam patellā uocant, ex cerebellis autum & porcorum in multa rosa coctis, infuso garo, oleo, uino, pipere, ouorum luteis. Differt à patella rhodonia quæ Rhodiaca olla dicitur: Figling genus hoc, permixtis, ut inquit Aristoteles, myrrha, iunci flore, croco, balsamo, cinna mōmo, amomo: coquit ad ardentiam ebrietatem, si ex calcatis ijs uinum infundatur. Origo huius ē Copto prima, ut inquit Athenæ: unde Coptica fidelia. Sed redeo ad propositum. Rosam Timachidas qui de coenis scripsit, in Arcadia euomphalon ab odoris præstantia uocari tradidit. Ergo rosam aculeatam ramos, nemo ignorat: folia interna, quæ admodum exigua sunt. Item ex maiori bus, externa minus odorata: inter amplas, odore præstāt, quibus ima pars scabra & corticea est, uisita, recisa, translata, fit melior. Syluestres ex toto asperiores, odore, colore, magnitudine superantur. Rosa ut nouissima erumpit inter uernos flores, ita prima desinit, satiuæ excepta. Rosæ uita quinquenniū, non inficæ: ne aduſtæ: illo enim modo iuuenescit. Flores senescētis deterior: capita foliorum eius partes que candidæ ungues uocantur. In flore aliud semē, aliud capillus. In capite, aliud cortex, aliud calix. Coronas erosa quæ patilibus & suilibus succederunt, rosalia dixere ueteres: nec erat ijs gratia, nisi folio solo ne xis. Recens à longinquo olet, sicca propius: serenis diebus lecta, odoratio: item siccis, ruderatis, gracilibus. Omnis rosa germinat granoso primum inclusa cortice: quo mox intumescente, & in uirides alabastro figurato, sensim adrubescit & pādatur. In medio calicis lutea stamina, sub quibus semen insidet, quæ proprie flores dicuntur. Desinit est feri semine, cum aliqui possit, quoniam sero ita nascatur. Genera ijs propē nimia: Celeberrimum Prentense, quæ nouissime deficit: Campanæ, quæ præcox est: Mile siæ, cuius color ardentissimus: Serotina, duodecim folia non excedens: proxima fecere trachiniam, minus rubetem: mox Alabandicam uiliorem, albicanibus folijs: uiliſſimam pluribus sed minutissimis, spermoniam: malo Plinium sic legi, quàm spinolam aut spinosam: ita enim fuit quod minutissimo folio, siue quod uiliſſima sit omnium, rectissime uidetur appellata. Sunt qui Sycioniam legendum putent. Nulli folia quinis pauciora. Campaniæ centifolia tribuitur. Et Philippis in Græcia à Pangeo monte uicino trāslaticia, numerosis folijs ac paruis: nec tamen talis odoratissima, nec cui latissimum maximumq; folium: ideo nec coronas intra centifolia, nisi extremos uelut ad margines. De lichny quinquefolia, quæ inter rosas quoque numerant solet, & Græca seu Græcula uocari, siue loco dicitur quinquefolia. Est & alia Græcula appellata, conuolutis foliorum paniculis, nec de his cens nisi manu coacta, semperq; nascenti similis, latissimo folio: alia funditur & caule maluaceo, folia oleacea habens, muscetōn (est ubi acetōn legitur, & moscheutōn à propagine uiui radice uel quæ Græci moscheuma dicitur) uocata. Atque inter has media magnitudine autumnalis rosa quam coronolam uocamus, in rubo natam, iocūdi odoris, sed angustis, ut in cynosbato monstrauimus. Reliquæ sine odore, hoc est, maluacea & duæ Græculæ. Semen rose in ipso cortice est sub flore, operum lanu gine. Præcox rosa emergit spīdali scrobe ad radicē facta, calidam infuderis, germinare incipere calice.

In Hispania Carthagini præcox rosa, hyeme tota uis torum genus inferitur pallidæ, spinosæ longissimis furculis quinquefoliæ, quæ Græcula altera est: nisi quis hoc quogioſo spermonia non spinosæ legerit in Plinio. Satis ambigo coroneola sit cynosbati aut cynorhodi flos: quāquam cynosbati magis putō. Cynorhoda porro syluestres rosæ sunt, spongiosis penicillis uel inter medias eius spinas nascentibus, unico aduersus expauescentes aquam à morſu canium remedio, nec ferē a Plinio comperto: unde nouatum ei nomen crediderim: quāquam Aristoteles hanc uidetur appellasse cynacāthen, hoc est, caninam senticem, cantharidū feracem, ut dicemus secundo libro in mentione cantharidi. Est & cynorhodos alia, sed liliū, ut monstrabimus. Nihil dubito cynorhodon aliud esse quàm rhododaphnem: esse aliquos flores rosas colore similes, arboribus in externo mari natis aut est Theophrastus. Columella Punicā rosam uocando, aut rubentē, aut ex Africa translata m significat. Rosam triplex comitatur fabula: non nisi candidam per initia fuisse, mox uulnērato Veneris pede, dum Adonidi, quem Mars zelozus interfecerat, opem latura præcipiti cursu per du meta rapitur, adrubescit. Alij sanguine Cupidinis, ut Aufonius, alij nectare affuso alia Cupidinis in deoz conuiuio laciuiētis, illiſa poculis.

R. HODIDES. CXXXIX.

Lycium.

CXL.

Lycium spina ipsa, tum succus ex ea dicitur 124
pyracanthos: chironias in Græcia uocatur. Frut ex unde Lycii fiat, adulteratur aphrodelaridicē. Item spina in Peliō mōte nata. Medicinæ aptissimum intelligitur, quod est spumofum. In di camellorum aut rhinocerotum (hi boues Aegyptij sunt) ut Festus inquit, utribus condunt. Lycium foris nigrum, intus rufum, cito nigrescens cū fregertis: optimi ex ladio frutice. Aliter Dioscorides. Lycii ex radicebus quoq; syluestris rhami coctis conficitur. Nomen Lycio inuenitū puto, qm̄ ē Lycia inueheret: præcipuū urbe Patara: q̄ Indiciū omnibus præferē.

ACACIA.

CXLI.

Acaciam fundente idem uideo accepisse au- 126
tores cum spina Aegyptia: testis Oribasius et Aëtius, nisi q̄ acacia etiā aliubi q̄ in Aegypto nascitur. Hæc & Syria q̄ spina dicitur. In Aegypto alba, nigra, & uiridi arbore cōspicitur. Arbor tota horret aculeis, ex cepto caudice. Præfert eos & germinibus & folijs: ligno in duodena sæpe cubita procerō. Cæditur testis & nigra, nauuū coctis, incorrupta etiā in aquis ui. Cādida facile putrescit, semē in siliquis ad coria perficienda galle usu. Flos & coronis addi blādus & medicamentis petitis. Manat & gūmi ex ea, cum sponte, tum plaga, nō ē cortice sed ē uale. Præcipua utilitas quod cæsa anno tertio resurgit: numeroſa omnino arbor: ingenti sylua eius Thebaica præfectura, ubi & olea, & quercus, & textilis Persica. Prouenit & in Galatia teneritudinis summæ, spinosior arbore: colligitur autumnō semē, quoniam collectum maturius, nimis uehēmēs. Spīſſatur succus ex folliculis aqua pluuiā maceratis, mox in pila tuis exprimitur: tum dēſatur in sole mortarijs in pastillos: Acacia uocatur arboris uidelicet suæ nomine. Fit & folijs per se minus efficax. Galaticæ acaciæ nigerrimus im probatur: item qui ualde rufus. Placet purpurea aut leuco.

leucophea, & quæ facillime diluitur. Nunc acaciam ex sylvestri pruno colligit officinarum desidia. Illud meminimus, semē Aegyptie à Dioscoride lupino simile reddi. Pontice, seu quod idem puto, galatiacæ lenriculæ. Plinius nihil distinguit, sed utrunque semen lenticulæ par exilimat, minore tantum grano & folliculo. Pemetrius asserit in Aegypto spinam quæ sit arbor, ramos coronarum specie nativa effundere, in quibus semen rotundū sit, flore subobscuro: ex hac Tindizas & abylæas coronas in Aegypto fieri docuimus in myrto. Spinam porro Aegyptiā sunt qui & Arabicā uocant, ut Dioscorides & Galenus. Non est superfluum ut spinarum hoc loco genera subijciam, quæ nominis communione Græci, legentibus dubitationē afferunt. Acanthos siue quod idem est, spina vulgaris, ut quidā coniectantur, acantha, pyxanthos, oxyacanthos, leucacanthos, acanthaleuce, tragacantha, acantha Arabica vel Aegyptia, acantha Indica, acantha Ariana, acantha Babylonica, siue regia: adduntur à Latinis spina siciens, spina pennata in Aegypto, spina appendix, spina bunia: diuersa omnia, decem & septem numero. Accedat rursus galatica siue Pōtica, siue Cappadocica, de qua proximo capite disseritur: nam sylvestris quæcunque spina Calabrix uidetur esse nominata.

ACACIA ALIA. CXLII.

Acacia hæc à Plinio Galatiæ tribuitur.

AMURCA. CXLIII.

Inter innumeras amurcæ laudes, agricolarum uisibus à Catone prædicatas, illa maxime memorabilis, quod ligna macerata liquore eo, nullius fumi tædio ardent. Græci ἀμυρρίδι uocant etiam fecē galatodogui. Itē genus herbæ purpureæ, qua uestes tinguntur amorgine à Græcis appellatur. Sed & tenuissima pars harundinæ paniculæ dicitur amorgis. autorem habeo Phorionem grammaticum.

VITEX. CXLIII.

Agnos siue ut Hippocrates appellat agne, dicitur Latine vitex: non habeo tamen planē compertū an salix Amerina idem quod agnos vitexque sit, etiāsi Dioscorides hoc affirmat, & ipse ita censet. vitex non multum à salice vulgari distat, usu uinculorum, foliorum quoque aspectu, nisi odore gratior esset. Semen potum uini quendam saporem habet. Duo genera eius, maior in arbore in salicis modo assurgit, flore candido unde cædida quoque dicitur: minor ramosa, folijs albioribus, lanuginosis, purpureo flore, nigra nuncupata. Nascuntur in palustribus campis. Semen uiticis Galenus manduci bellarijs solere scribit usu tragematis: ita enim minus officere capiti. Lygon lygean quæ Græci uocant & arborem & quoddam herbæ genus: quod ut inquit Athenus in nidos suos parituri cygni ferant. Nec tamen satis habeo compertum, hanc quā cygni præter herbam, aliud genus oportere intelligi quam uiticem. Inuenio & scopas Amerinas spartis similes describi, folio tamen minore, sed lentidita uirgularum maiore, quas sunt qui genistillam Amerinam uocitēt hoc tempore. Corolla ē lygo ufos esse ueteres, Anacreonti poetæ credimus: cuius originē Samij Caresque dederunt, diuersis causis: Nam & Lacedæmones harūidine certis sacris ut auror est solibus, coronabantur. Aristophanes quoque autor est, coronas ex harūidine facti cari solitas Athenis, quas & Dioscuris, hoc est, Castor & Pollux dicatas fuisse constat, ut frugales atque

simplices. Lygon & ægylin quandoque dici lego. Itera molyn & celyan & celyon & cefocarpon ut Pollucius Phorioni uidetur: unde gerra celyma, hoc est, quadrata quedam turgitola ex huius salicis uiminibus, quæ ligella quoque nominantur à Plauto in Aulularia: fortē à lygo, id est, uitice, aut à ligando. Adijciendum illud uidetur, quod hic à Dioscoride scriptum est, uiticem à quibusdam lecriticum uocari, putare me in eo uerbo mendum esse: nec lecriticum sed à similitudine saporis & acrimonie ligusticum legendū. Nam & piper agreste dici uiticem idem autor affirmat.

SALIX. CXLV.

Arbor breui ferē & cōorto caudice, & ut nominamus, aquatica: iteam Græci uocāt. Asia tribus generibus hanc diuidit: prima nigro cortice aut puniceo, nigra nominat: secūda cædida, cædida uocata: tertiam coactæ breuiat & sponte naturæ, pumilam, succo ut quidam putant fructu, helicem appellant Arcades. Virgas ad nexum ē nigra commodiores & pulchriores, & candida spissiores & agricolarum utensilibus apiores esse. Plinius apud nos quoque tria salicis esse nomina commemorat: uiminalem, eandemque purpuream, uitellinam à colore luteo graciliorem priore, Gallicam, quæ tenuissima. L. Columella Græcam, Gallicam Sabināque reddit: Græcam flauī coloris: gallicam obsoleti, purpurei tenuissimique uiminis. Sabinam gracilibus uirgis atque rutilis, quam plurimi uocant inquit Amerinam. Plinius Græcam rubentem, Amerinam candidiorem asserit. Porro quā dixi uitellinā, in exemplaribus nicellinam & itellinam corrupte legimus. Inuenitur & alia distinctio: proceræ, uineis iugandis, pericales uocatur, balteo corticis uincula præbentes: alia prærenes, à uiminibus appellatur uiminales: alia uirgas, quæcuius ad uinctū leuitatit ferentes: alia corbibus & supellectilibus uillicæ firmiores cædidioreque detracto cortice, leuique tractatu: mollioribus inde uasis quā ē corio & cathedrarum delicis apissima: fructum salix fert, abeuntem in araneam, antequam omnino maturitatem sentiat: ob id ante maturitatem colligitur, dicta Homero ἀσπυρ, hoc est, frugiperda: una tantū prodiit ad maturitatem proferre folia in Creta insula, ipso descensu Iouis speluncæ toruū lignetū, magnitudine ciceris. Succus salicis triplex: unum arbor ipsa, gummi modo suffusa: alter cortice trium digitorum magnitudine ablaro manat: tertius detruncatione ramorum à salce destillans. Salix fertilior & densior recisione fit, ac confusa, ex breui pugno ueriusque ramo, prouert certissimo: tertium locum inæstimatione ruris Cato ei tribuit. Salicium non hoc tantum serui grammatico significat quod oliuetum, arbutū, uinerū, sed & uirgulti quod dægenus, dictū ita, quod saliat surgatque cito, ut lupū fortasse salicariū intelligat, de quo suis locis egimus.

OLEA SYLVESTRIS. CXLVI.

Olea fer Græci ωλεῖν & appellatur. Sylvestris olea fecundior satia, quæ ferē sylvestres habet eam cura fertilitatē minuere: mās se ferē hanc tractatu, decisis circa taleis, aut omnino traslatione mitem fieri uix potest adduci Theophrastus ut credat. Sola hæc arborum cum olea teredinem sentire non dicitur. Ex oleastro mulcos breuiore & tebrebris uaginas, sicut ex buxo, ulmo, fraxino, aquifolia, factitatas produunt. Est & in Apennino frutex uocatus cocinos, ad lineamenta modo conchilij colo-

colore insignis: sed hoc ego nō oleastrum esse puto, sed oleastellum, & oleam cilibracā à Columella nominatam: cuius & ipse Dioscorides in chamelæa meminit. Phorion oleastrum quādoque dici phauliam existimat: Certe phaulia oliuæ genus est Columelle, Plinio, Græcis omnibus.

OLEA.

CXLVII.

Olea medulla tam incerta, ut nō in medio haberi, sed per totū lignū sparsa uideatur, radice parua uelut lacinia ex medio tendente: cæteris grandibus & cancorum similitudine contortis. Proprium ei malum cōgros, etiā si deriuatur in alias quoque id nomen. Sunt qui affectum eum premnon, crotonem alij cognominent. Supina foliorum huius contrā q̄ cæterarum, candicant magis q̄ prona, minusq̄ sunt leuia: quod & cum hederā commune est oleæ: in Syria & aliubi congestum quasi uix modo fructum ferit, ubertate soli. Olea m̄ utiliter & probe desloruisse dicimus, cū flores eius caduci uelut perforati reperiuntur. Nascitur modis omnibus extra q̄ furculo: ex huius nucleis quos sanfas uocamus, syluestrem oleam provenire Theophrastus scriptū reliquit. Sanfas sunt qui etiā naucum dici uelint: unde uerbum naucificare: quandoquidem & fullones ob utilitatem artis, nace dicebantur, ut nunc mētras & proxenitas sanfarios & olarios uocamus. Quidā pro nugis naucū: alij omnia ferē opera ex lana Græce nacas dici uolūt: ipsum quoque nucis, sed & omniū rerum putam: alij nucleum malunt iuglandis, alij medium illud uelut dissēpimentum. Glossatoriū scriptores fabæ grani quod hæret in sabulo, quidā ex Græco leuem hominem in eo uerbo significari putauēre. In mari Rubro uiuit olea quæ uocatur Arabica, baccis ferē nostratibus, fungos cum largi ecedunt imbres, educans, qui tacti sole in pumicem durantur, ex qua manet lachryma in hibendo tulerum sanguini expetita medicis. In sinu Heroo lapidis specie, ut thynum & laurus, cubitorū trium magnitudine. Ignem olea, quamvis optime subditum excipiat, quod spissa & pingui natura sit: ignitatis tamen inespissima est. Vna maxime omniū olea regerminat in opere. Vitam oleæ Theophrastus ducentos annos longissimam esse tradidit. Si olea consilio in cosinio quercetum habuerit, nō solum non feret, sed etiā fugiet, interseumq̄ se in fundum abiicit. Vt cradæ fico, ita thaleg tribuuntur huic arbori, utiq̄ apud nos, Græci ut inquit Pollux, thalos non oleagineos solum, sed uitigineos quoque ramos nominant interdum. Præcidunt, Varro inquit, eam de tenero ramo aquabiliter extraxq̄ parte circiter pedalem. Sunt qui sciaulas nominent. Eresionem poro Athenis siue iresionem uocabant plantam oleaginēam, uelleribus & corollis in uolutam, unde & nomen, cōtra pestilentiam foribus imponi solitum, ut est apud Aristophanē: Hanc & corythallon dicebāt, etiā si pro laureo quidam ramo capitis in eundem lustrationis usum. Credo huius quoque ritus apud Romanos uestigium fuisse, cuius ita legamus apud Festum: Planta oleaginea uirga, inquit, foliata est ex olea deplārata. Nam & februa quoque lanæ sunt & arborum rami apud nos: quibus redimiti sacerdotes explebant domos: quod deinde nomen ad omnia purgamina translātū est: auctor Ouidius. Morbus & ille proprius, præter uermiculationem, in & uocatus, hoc est, clausus, ab alijs mices atque lopus, hoc est,

fungus & patella, ceu quædam solis inustio: quam patella in ficu, morbum significat: qui nimis propter imbres radici cōtrahit in olea: & arachnion uocatur affectio, hoc est, aranea, fructus abumens uermis, sub corio proeuntum admittit in uicemq̄ adiuvat, si nascatur ad nucleū: nulla post ficum arbor ure dini magis obnoxia est. Carpæ appellant in oleis uermiculi, statibus austrinis creati, ut in & in uitibus: Est & impetigo peculiaris ei morbus, ut scabies fico, & uitibus fluor. Oleam Græci *λαον* uocant, nostrū quandoque termem, quam ita & ligni uermes dicuntur. Optima erat olea ueteribus liciuia siue lici niana: pausia secunda, oleo: efcae, orchas. Varro grandis inquit olea uocatur orchids à similitudine ut credo testium, antiquitus archemora. Minusq̄ græcæ sunt, regiae & radij uocatæ. Sunt & alia earū genera, quæ ambitiosum sit prosequi, cū & sexto uolumine Columella, & Plinius quinto decimo naturalis hīstorie, nihil ferē inditū relinquit. Hanc arborem nonnulli existimant ultra sexagesimum à mari aut non uiuere, aut non esse feracem: sed in quibusdam locis recte proeunt. Oleā Mineruæ sacram, ut Aristophanes & Iulius Pollux inquit, Græci moriā uocabāt, in academia sacram, ut in Olympia nascentem oleastrum *μυλων*: quia Olympia uictores ea coronarentur, ut ait Pausanias. Nam secos fructiferam oleam in poetis significat Phorion. Dicitur & *μυλων* quāquam nos fatiū, ut ab oleastro differat, quam uocant *αμυλων*. Celebratur & cognominata *επιδαυρι* ab intorta specie: sed ea loci nomen est circa Epidaurum, adiecta fabula euenisse ira ei circumactū manus, Hercule illuc mētre: Nam & clauam eius ex oleastro uolunt reuocari ex Hyperboreis fuisse, ignoto prius Græciæ: quæ mox sponte refluuit apud Troezenios, aut certe ad Alpheum athenē, si Pausanias credendum est, homini quidem fati docto sed superstitioso, diui Adriani & Antonini utriusq̄ temporibus. In eadem gente streptos rhachos uocant, locū oleastris frequentem uersus mare: quod eorum consuetudine, quicquid ex olea relinquit in uile, rhachos appellabatur. In Arcadia spectari solitam Pausanias affirmat arborem, & cuius radice una ilex & olea nasceretur, in quodam fano. Syracusis ut Diodorus ait cor est, in frondibus oleantum: scriptis optimatum nominibus, discessione facta irrogabatur quinquennale ciuibus exilium: de quo argumento genus id mul tæ *πυραυ* appellabatur, ut Athenis ostendimus.

OLIVÆ COLYMBADES. CXLVIII. 153

Oliuæ Colymbades ideo uocantur, quoniam oleo suo puræ, hoc est, sine accersita cōmendatione innatant, & quasi urinabundæ fluitant: halmades autem dicuntur quæ muria seruantur, etiā si quidam Græci confudere nomina. Sunt & netrides appellatæ quia natent, apud Iulium Pollucem. Idem autor & cotinidas nominat, quas & phaulias & tramelos dicit tradit. Medicinæ quæ à Dioscoride subruissis redditur, tribuat candidis à Plinio uident. Castigandi sunt in autoribus loci columbares, pro eo quod colymbades imperitia librarij scribentes. Genus alter: oliuæ cibariæ Græci thlastas & pyrenas & pityrii siue pityridas, hoc est, nucleos & fresas & fursuraceas appellant: in hunc usum striguntur ante, quā præmaturæ sint: epityria falsō dicta, cum sit epityrum, ut Varro inquit, siculum edulium, de quo dictum est aliubi plenissime.

OLEVM SYLVESTRIS

OLEAE.

CXLX.

133 **D**E oleo sylvestris olea dictum est superius,
OLEAE AETHIOPICAE

LACHRYMA.

CL.

Olea Aethiopica lachryma in pretio est. Sit haec Arabica, quæ & ipsa dotat lachryma, nõ dum constat mihi, quamquam puto eandem esse, quoniam in Arabici sinus desertis tribus insulis, ut inquit Strabo, nascitur: ut cunctis in Arabia stillat eam olea, quæ medicamentum conficitur, *ωκεανον* appellatum, singulari effectu contrahendis uulnerum cicatricibus. Sunt qui hoc esse putent gummi genus illud, quod recentiores elemi quasi enhymi appellant: ad ossa etiam fracta caluæ conglutinanda cantarissimi. Porro uerbum *ωκεανον* non huic modo rationi conuenit, sed emplastris omnibus, quæ cruentis protinus insciuntur uulneribus, ad reprimendas inflammationes, & inhibendum sanguinem: quod genus & alipenon, & caragmaricon, & collecticon uocatur: quoniam medicamentis minime pinguibus constat. Olea autem hæc in Arabia nascuntur in maritimis & fluctibus, *εὐθιγ* operitur Rubro mari, ut in olea demonstratum est: nec bacce nocetur, cum constat & in folijs saleem relinqui. Oleastrum quoque ipsum ueteres olea uocabat Aethiopica: testis est Dioscorides.

QVERCVS.

CLI.

134 **P**Linus glandiferas arbores uñe comprehendere posse negat Latino sermone, quæ admodum Græco potest *ἀμύγδα*, & antiqua uoce Saronis à qua Saroniacus sinus, & Saron in Arcadia nemus eras Ladonæ fluuium. Quibusdã, ut Theodoro Gazæ, roboris appellatione contineri posse omnia ea genera uideatur. Sanè Græci *ἀμύγδα* uocabulo etiã omne lignũ significant: unde *καρπιδιπρον* pro ueteri & ambusta quacungue arbore accipitur, quasi uetus rationale. Perlius, Ergo roboris quæterna genera: quercus, robur, æsculus, cernus: quæ Græcis illis respõdeant, hemeridi, ægilopi, haliphloæ, platyphyllo: ut sit quercus, hemeris: platyphyllos, æsculus: ægilops, cernus: sed nõquid haliphloæ robur significet: non habeo compertũ. Theophrastus certè agrĩa dryn appellat, quam nostri robur interpretantur, ut in galla dissimulimus: nec minor hic q̃ in pinu difficultas: quæ quibus Græcis Latina congruat, nos utroque loco tantum laborauimus, quantum uix ipsi qui prodidit. Quidã quatuor supra dictis duas addidit species, phagũ & ilicet, sed toto genere distat, ut cognata porius q̃ congeneres habedẽ sint. Hemeris sanè Homero nõ querũ sed uite significat, ut Photion testatũ esse uoluit, Sibari qui nunc Sibari Thorij dicuntur, quercus fuisse tradit in oppidi cõspectu, fronde perpetua, Varronia & Theophrasti testimonio: quæ nec germinare cum alijs, sed ab ortu canalicula solita sit. Rarũ est qui lata quercus deterior eueniat. Dulcissima glans hemeridi post phagum. In orbẽ hæc comat, torquetq̃ in alas, crebro ramorũ cum sinu caua. Materies ualida, Macedones, quæ glandẽ dulcem perducit, etymodryn, hoc est, quasi ueriquercũ appellant. Nasci quercus in Rubro mari glandiferas tradunt. Nasci & in nostro propiore terræ, super lapides atq̃ testas, sine radicibus, sed petallaz modo adherescẽtes, folio carnosio, crasso atq̃ oblongo, myricẽ simili, accedẽtis ad purpuram coloris. Magnitudo arboris tota paulo ampliot sesquipede. Hac tingi mulieribus lanas, Ramis carũ

adherent conchæ quadã & caulibus parte ima, ubi & bestiolæ populatũ: naufragis & urinãtibus compta hæc. In Lusitania profundo mari quercus glandifera innasci, unde thuni uel scatur, auctor est Polybius: ob id thũnos qui dicat marinos esse porcos, minime discescerit a uero, ut inquit Athenæus. Carinas nauibus quernas subijci præcipiunt, maxime tremeis. Abiecti aut pino larici uocata, solum inari quercus nõ potest: infociabili natura, q̃ hæc spissa corpore sit, illa textu raro. In septentrione haud procul Caucis circa duos præcipue lacus, litora ipsa obtinent quercus, tãta magnitudine, ut suffocare fluctibus aut flatibus propulsa, uastas cõplexu radicũ insulas afferat: itaq̃ libramẽro eo stãtes, nauigat: amonũ ingentiũ armamẽtis sæpe territa Romanorũ classe, noctũ & prælio cõtra arbores q̃q̃ inuito. De Hericiniæ syluæ miracula nihil attinet dicere, nisi q̃ magnitudine insigni robora ibi crescere concipiunt. E glãdiferis ciuicas coronas necĩ, mos erat, quæ omni bus anteferebat. Ciuica ligna primo fuit: postea placuit ex æsculo Ioui sacra: uariatũq̃ hoc cũ quercu est, ac data quæ ubiq̃ fuerat. Non puto prætereundũ Alexandri Macedonis inuentum, seruadẽ nuius in scobes ubi ea sit: coniectis & quercu ramis. Saronicus in Peloponẽso, Plinius inquit, sinus est, olim quernone more redimitus, unde ei nomen, ita Græcia antiqua appellante quercum: Paulianus ab Saronẽ quipost Althipum regnauit, sinum eum dici uoluit.

GLANS.

CLI.

Glans græce *ἀμύγδα*, ut Varroni placet. Præfert omnibus Hiberica: fago dulcissima, post hemeridi, tũ platyphyllo, deinde haliphloæ. *παραπύλας*, hoc est, latifolia, post cernũ excelsissima & rectissima: sed post haliphloæon usũ adificiorũ de terrima, nec utilis carbone. Macedones latifoliã intel ligunt amaræ glandis, quã æsculum quidã interpretantur. Aesculũ porro abeũ dictam miremur, cum diphthongum æ requirit: in qua uermiculi nascentis priuati galbæ nominantur. Ab æsculo æsculetũ ut a quercu querquetũ. Vtrumq̃ locus Romæ fuit: unde querquetulana quoq̃ porta, quæ a viminali & ca uiliana non discrepat, etiã ab auiibus querquetulis, quas M. Varro & Columella cercidas uocari Græce dicit, uideri potest appellata. Haliphloæos falsicortex à Theodoro dicta, potest & recticortex, quia nõnulli apud Græcos euryphloæon eã uocẽt. Crassissimus huic codex & plerumq̃ fungosus & cauus: pessima carboni & materię: nec putrescit alia etiam cũ uiuit quĩ & fulmine icitur sapsissime, tãctũ altitudine nõ excellat: ideo lignum eius ne ad sacrificia quidẽ uũ fas erat apud Acoles. Spagnon siue splachnon siue phascon appellant item quæ bryon, pannum quemdam mucosum, pendente m ex ea quasi uillos, ut in cerro, sed nigriorem breuioremque, ut nunc arbore Macedones ad axes & id genus utensilia. Glans eius rara & ingustabilis animalibus, præterq̃ suillo generi, ut Plinius existimat, ac ne sui quidem spualibet aliud habuerit: quod quidẽ Theophrastus aspidi, hoc est, Macedonice cerro tribuit. Est autem aspris raris & improbande sterilis, quæ caput teneri mandentium, ut ligna. Cernus *ἀμύγδα* à Græcis uocatur, glande omniũ amariissima. Rarissime nascitur in cultis: pannũ quem dicit phascon, longitudine cubitali, branchiarum similitudine, mucosum uilulosũq̃ ferens, nascitur e cortice non e sicculo, unde glans nec

nec ex gemma, sed ē sup̄ernis nodorum ā latere. Lignum rectissimum, excel̄sissimum, leuissimum, per longitudinemq; robustissimum. Acidificijs ineptum aspidis si dedoletur: ideoq; rudi duntaxat utuntur: damnatum ē carbone, quoniam exiliat, scintillasq; edat. aetriorum tantum officinis compendiū, quia statu desinente protinus emoriēs, sēp̄ numero uraf.

FAGVS ET ILEX.

CLIII.

Fagus ea, ut quidam scripserunt, quā in tenuissimas secatur laminas, glandifera nō est: ideoq; duo genera siue nomina fagi sunt glandem ferentis, materie scabra, quam Græci *φύβιν* appellant, ut fructum quoq; Hippocrates, & alterius quam Græci *οξιām*, Lydi *myson*, Olympo eorum mōte copiosam, unde Mysi populi, ut Strabo inquit & Eustathius. Nostri cississimam appellat, scilicet in laminas similemq; abietis. Syluestrem nūq; ut Macedones arbitrantur, florentem, erectam, leuem, enodem, liguo colorato, robusto, neruoso, folio crasso, bifido, longiore quā piri, extremitate aculeato, radicibus nec multis nec altis. Fructus glandis effigie leuiss. Includitur caliculo echinato quidem, sed blādo nec hispidum ut in castanea, cui tamen similis est dulcedine ac succo. Nascitur eadem candida, sed in montibus: utilis ad carpenta, lectos, subfella, mensas, nauigia: campestris nigra & ad hæc minus petita. Fructus utriq; similis in aqua durat æuis ut robur, atq; ita firmitior quoq; redditur. Humidissima hæc & fraxinus: quam ob rem ē duabus his lectuli qui fient, in curuantur cedēs ponderi. Minoris cississima nauibus commendatur ad carinas: item ad testudinem, plaustrorum quoq; uectabulorumq; uilem fabricā: specie uisenda prouenire in agro latino solita, autor est Theophrastus: tanta longitudo ut nauibus Etruscis pro carina satisfaceret. Sunt qui *οξιām* interpretantur ornum. Ilex uero *ῥῆξ* Græce dicta post occasum uergiliarum fructificat, & anno proficit, ut putant Arcades: simul enim antecedente fructum nouus occupat: proptereaq; ā nōnullis inter biferas descripta. Radix ilici multiplex, & ut syluestri altissima, folio roboris minore, aculeato, leuiore cortice. Arbor de amplissimis, ut robur, materie spissa & robusta, sed quæ frangatur ac diffiliat sponte sua: ob id Pericles Boeotios ilicibus dixit eē similes, ut est apud Aristotelem, quoniā ipsi se conficere intestinis discordijs. Glans exigua, & præter glandem puniceum granum. Sua hæc hyphear & uiscum in ramis, ut alie na sustinet: ā septentrione uiscū, ā meridie hyphear. Hæc & aquifolia uel aquifoliū uocari puto, siue paulo ab ea differentem. Theodorus aquifolia appellat quam theophrastus *aria*, siue agriam, siue *narycam* syluestre, & cuius folia nūq; decidat: ita em̄ Dores uocant, inquit, quā Arcades *φύλλινον*, sempiternæ frondis arborē, mediūq; inter robur & aculeū. Sic qui phellodryn aliud negent esse q̄ ilicem fœminam, ut ilex ubi desit, utantur hac in carpentarijs præcipue fabri cis, quod & Lacedæmone faciunt, & Elide. Lignū intus q̄ ilici candidius, sed fuluiss q̄ robori: materia q̄q; diuor, sed q̄ ilici solutior in opere: folium simile, sed iligno maius, & querno minus. Speciosior medulla q̄ ilicis: fructus minimis glādis: equalis acylon uocatur, quemadmodū & iligneus: nam *βάλανος* siue glans, robori propria tribuitur. acylon certe lydi genitale ipsum uocant, quemadmodū & balanōs pro glande colis dicitur. Plinius conetrā quā Theophras-

tus phellodryn uidetur eādē existimasse cum subere, quod & phellos dicitur: in fœmininarū calceatus utilē hyerno tēpore, ob id mulieres facit & *ογcis* arborum cortices uocari. Est autem suber arbor procera, sine multis ramis, ligno robusto, cortice præ crasso & aspero in senectute, qui ut in picea rumpatur: sed maioribus fragmentis: folio fraxini crassiore longioreq; ac perpetuo. Glās aquifolia: corticem detrahre oportet, ne deterior fiat arbor, qui tritienio post subnascit. Simulacra ē subere dijs factitata, sed successit in eius locum palma: hæc Theophrastus: at Plinius hæc: Suber inquit est arbor, glans pessima, rara: cortex tantū in fructu percrassus ac renascēs, atq; etiam in denos pedes undiq; explanatus: usus eius anchoralibus maxime nauū piscantiumq; tragulis, & cadog; obturamentis. Familiaris hæc arbor Theophrasti temporibus Pyrenicæ: nec in Italia tota nascitur aut in Gallia omnino. Sed & illinc nascitur confusio, q̄ simulacra uocari legimus quæ dicitur illex in Italia, & in prouincijs aquifolia: cum similes seſtius eandē esse cum taxo prodiderit. Recentiores sunt qui similes cum phellodrye faciunt eandē, haud ferendo errore: etiam si similes ilici describitur ā Theophrasto similis. Dictum est de aquifolia & in cratego: Vt cumq; sit, ilicis inquit Plinius, duo genera: ex ijs in Italia folio nō multum ab oleis distantes, ā quibusdam Græcis similes dicunt, in prouin cijs aquifolia: maculas ilicis negant ferre. Illici honos ad axes in plaustris simplicibus, hoc est, monostrophis: item ad iugalyra: palterionq; igniaria quoq;. Ciuiam ex ilice primā fuisse diximus, cui ex caliculo successerit dicata Ioui. Lignū ex aquifolia cōfractū ac discissum, tedæ modo utitur, & ā Græcis in hoc usi garbion uocari solent: Hoc ē quercu fit & alio nomine panos & phanos appellatur uulgo quoq;, quemadmodum ē uirigineo libro factæ lampades, lophig dicuntur, & ex harundinibus, elanæ.

CASTANEA.

CLIII.

Castanea uergiliarum obitu fructificat: Græce *ῥῆξ* & *βάλανος*, hoc est, Iouis glans, uocatur: cū tamen iuglandis appellatio nucibus tantū regijs dicata sit ā nostris. Nuces uocant & castaneas, q̄q; propiores glandiū generi: ideo apud Græcos appellantur balani Sardiani, quoniā Sardibus prouenire primum. Euboidas quoq; ā Græcis dici quæ nos castaneas uocamus, lego. Sed & castaneas primo dictas scribit Photion, q̄ ab oppido Magnesiæ q̄ Castanon dicitur, aduectæ sint, ut fortē Diodorus nubes Castanaicas inde nominari. Quid si ā castitate, cū Plini? icuinijs ferē dicatas eas innuat ex ijs Græci pogonias appellat, quæ barbulas quasdam habent: nisi quis lanatas earum intelligat: sunt enim aliquæ pilis hirsutæ. Tiberius Cęsar balanum nomen impo suit satius, cura multo excellentioribus. Plura earū genera: Tarentinæ faciles, nec operoso cibo, figura plang. Balanitides rotundiores, purgabiles maxime, ac sponte proſiliēs. Salarianæ puræ ac planæ: nam Tarentinæ minus ijs tractabiles sunt & Corellianæ laudatiores, & Meteranæ ex Corellianis factæ, rubet cortice. Triangulæ & populares nigre, quæ uocantur coctiæ, minima laude patriæ cōmendatissimæ Tarentū in Campania Neapoli. Ceteræ suum paulo nascunt, serupulosæ corticis, intra nucleos q̄q; ruminatiore. Armatū castaneis echinato calice munimentū quod inchoatum glādis, trini quibusdā

partus ex uno calice. Cortex lentus. Proxima corpori membrana & in ijs & in nudibus, saporem, ni detrahitur infestat. Torrere has in cibis gratus. Mollita etiam præstant, ieiunio foeminarum, ut ait Plinius, quandam imaginem panis, & ubicunque fruges aliæ deficiunt, ut in Bergomas agri môtans.

G A L L A E. CLV.

GALLÆ à Græcis cicides dicuntur, ad coria utiles. Hemeridis, cerri, platyphyllijs, hoc est, latifolia, nullius ferè usus: quamvis hemeridis, tantum leuijores. Genera faciunt medicing utilia, solidam, perforatam, albam, nigram, maiorem, minorem. Galenus *in universis*, hoc est, quasi afininas à rusticis uocari gallas eas scribit, quæ fungosæ, flauæ atq; magnæ sint, minus efficaces, Vis omnium similis. Optima Comagenæ. Nascitur autè galla sole de geminis exeunte, erumpens noctu super uniuersa: crescit uno die candidior: & si excepta est aestu, crescit proutinus, neq; ad iustum modum grædescit, hoc est, ut nucleò magnitudinem fabæ impleat. Nigra eadèq; resinacea, diutius uiret: inter dum mali amplitudine. Deterrima ex robore. Signu eius, q; cauerna translucent. Galla nigra sine oleo flagrat. Robur gallam fert minorem, & alteram ut dixi resinosam atq; nigram. Quæ glandem ferunt, omnes & gallam. Hemeris, id est, quercus, optimam, & cortis ut dixi perficiendis aptissimam. Fert & nigram tingendis utilijorem. De robore: quam Theophrastus agriam dryn appellat, discretam sententia: alijs semine, alijs etiam radice, quanq; sero, alijs trunco nasci contenditibus. Item alijs florere eam putat, alijs negant, sed muscum floribus loco edicunt. Fructificat post autumnum circa occidentes Vergilias. Ramos habet inconditos, crassum corticem atq; scabrum in senecta maxime. Ac reliquæ quidem arbores ut cepere, continenter germinant: solæ robur, abies atq; larix germinatione ter na parturiunt, corticemq; inter squamas spargunt, ac deinde rumpunt, ob id trislepi siue trislepi uocat, ut in pinu diximus, hoc est, intermiscari aut trisquamiz. Robori & cachrys dicta, quam nonnulli amen tum appellant, innascitur, durans hyeme: de qua in abiete monstrauimus. Tardissime robur ceditur, hyeme ineunte: ante cõputrescit. Tempestiue casum durat eius spissatū, ut cornu. Non defunt tamq; qui tempestiuum putet uere cum amentū, hoc est, cachryn suam gerit. Medullā huius inter spissa cõmemorant, melandryon uocatam. Aeterna in aquis materia, sed dulcibus. Mari putrescit: cõtraq; magna pars arboris, hoc tamen & mati utile: sed nauibus & edificijs q; cæteris, quæ terra obruant. Carbones è robore anno so & nouello dānant. Media ætas in pretio est: quamquam ut cuncque antefertur, ex aria, arbuto, picea, præsertim metallis agent.

R H V S. CLVI.

RHUS, siue ut Hippocrates rhoon, à Theodoro fluida uocat: sterilis forma est, mas fructificat. Virgas, ut inquit Theophrastus atq; Plinius, fundit rhus, breues & graciles, folio ulmi, lōgio re paulo subhiurtoq; disposito per uersus, ita ut in nouellis ramorib; cõtrarijs inter se pediculis germina respōdeant: ijs cādidas pelles consociūt. Flos in racemis albus, à quo semē collectū lēcia & terebinthi similitudine. rubescē cō uua, q; uocat rhus: medicamentū necessariū, in eo ostēdit, q; ad simplex pro summa cespitū cohgrēs, ut facile possit uniuersa flecti. Nascit

ubiq; sed argillosis potissimū, utiq; in Syria: q̄q; habeo unde mihi hoc rhus Syriacū, siue ut Columella & Palladius appellant, ros Syriacus, pagē distare uideat ab hoc nostrate, qui fructu excoxiarius, & rhus erythros à colore subruilo uocat Dioscoridi & Plinio: quē Columella rorē fuorū semel dixerit, q̄niā rhus scytodēplicos & byrfoēplicos dicat, cuius aridis folijs pelles ut malicorio periciant, crassitudine digitalli, altitudine bicubitali: q̄q; Plinius, nisi lubrior; ea sit incuria, cubitali prodidit. Duo faciūt omnino Græci genera: magiricon qd addit in opsonia, id est cū Syriaco ut opinor: Alterū qd *Byrfoēplicos*, id est, excoxiarius, quandoquidē utrūq; in castillū ex caribus ceruinis cõpositum, & in pantolmū quoq; dicit, requirunt, diuersis ponderibus contra dysentericos & crueta resicētes. Habet & syluestris herba folijs myrti, colliculis breuib; quæ cinas & renena pellic, rhus uocata: porrò specie, quā Theophrastus supra reddidit, cõteplari sum? rhum ex Vmbria perlatū.

P A L M A. CLVII.

PALME teneritas processu lig nescit: uita in ficco aque ut in humore. Sabulosis salisq; gaudet, adeo ut in Syria coele tribus dunaxat locis ubi arenæ sint, proueniat: alibi cõputrescit etiā recentēs earum palmarū suauis gustu sunt, nouellæ fructu nullo, intus ligno edunt, postea cum ligno. Parcos ferè palmarum mos habet, scabro cortice, præcipue cū senescit: medulla omnino nulla: Mari tæcum flores, foeminis statim fructus. È semine suo nascit, ut coniferæ omnes præterq; Babylone, ubi & uirga feritur: tāto ibi unius eius usu, ut extare carmina scribant, quæ utilitates ex ipsa numero diebus anni pares esse predicāt. Simulacra ex hac ferri solita ueteribus, sed prius tamē è tubere, ut diximus aliubi. Palma uictoriae symbolum est, quod ut Aristoteles & Plutarchus inquirunt, non cedit oneri q̄libet ingentem: intra flectitur pāditur uel, sed contra pondus resurgit: ideoq; in coronarijs certaminibus ferè aliud premiū q̄ palma nō dabatur, ut inquit Pausanias: et si Græcia quattuor tantū locis, oleastro, pinu, lauro & apio coronare uictores mallet. Palma fumo infestat cremata: de quo & Chereemonis poetæ uersum Theophrastus prætexuit. Parica robore sola fructum ceu in spica: quod ei scicitatis causa, & proprietate quadā naturæ cōingit. Fit & in alto palma fructicigeneris, frōde corrosa, breui caudice, uirgis rectis, parte ima non in orbem, sed in latitudinem sigillatim ambientibus, continenti serie, aliquando tamen interrupta. Color toti plantæ puniceus: furculis eius natua foliorum acanthino; qualia sonchus, & cætera foligenus: sed recti tamen sunt hi, non ut illis recurui. Palma porrò Aegyptia quam Dioscorides hic describit, myrobalanon appellatū fert, nullo intus ligno quæ & adipso & poma nominatur. Phœnicobalanus niger est, quia maturefcere permittitur: myrobalanus uiridis. Habet & myrobalanus unguetaria cognominata, sed generis alterius, suo loco indicāda. Quid autem sit chrysobalanus apud Asclepiadem ad ardore stomachi singultusq; adhibito, non cõperi. Aegyptia uero, ut Solinus inquit, sitim sedat: utiq; ante maturitatē decepta. Matura sensum, gressum, linguā, retardat & inebriat. Phœnix apellat Græce palma unde fructus dependēt spathe. Palmulas è mari pelles, è fecmina balanos apellat, ut Iohis Pollux tradit, qui sumpsit ab Herodoto. Est & phœnix herba ut post

post constabit: Itemq; musicum instrumentum, ab inuentore ita dictū, siue ut alijs placet, quia primum ex Delia cap palma, cubiti eius facti fuerint. Ipsos palmarum cum fructu termites, baia & spadices Greci præferunt Dorici appellat, à quo & color equino generi spadix, aut spadiceus & phoeniceus, hoc est, palmeus: unde uulgo quoq; baius, aliqui phoeniceus propriis est, qui uermiculus & punice⁹ uocatur ab Eusebio siue Hieronymo in Chronicis, nomen habet à Phoenice illo qui literas inuenit. Reperio & parū & baliū colores equis attributos: sed pro uario apud Euripidem est baius. Scio & Achilles equū baliū uocatū, & equos balias pro celeribus quoq; acceptos à poetis: nam murinus color à mure dictus in equino genere, is est quem Greci pāron quasi à turno appellant. Cerebrum palmæ Galenus encephalon, Dioscorides encardion, hoc est, medullam uocant, quod & esculentum est: palmarum plantam cephalonem uocari Palladius auctor est.

CARYOTAE.

CLVIII.

Palmulae caryotæ celebratior cibo: sed & succus easq; uberrimus est, ex quibus præcipua Orientali uina, capiti iniqua, unde pome nomen. Ex his & acerū & mella sūt, & farina Babylone. Nuclei pro carbone sunt: & pabulo quoq; inuentore, aqua macerati. Laudatissimæ in Iudæa: nec tota, sed sericite maxime: quanq; Archelaide in predio & Phaseli de & Lybiade, gentis cuiusdem consualibus. Dos his præcipua succo pingui laetentibus, quodamq; uini gustu in melle prædulcibus. Triā caryotidum siue caryotarum genera: Nicolai ficiiores, amplitudinis uariæ, ut quæ cubitorum quaternum longitudine compleat, ab Augusto ita primo nominata, in honorem Nicolai Peripatetici philosophi, crebro eas ad se misitantis inquit Athenæus: Alteræ genus minus speciosæ, sed sapore caryotæ proximoiores, unde nomen. Tertium genus nimio liquore madidum, rumpente se pome in parente ipsa quoq; calcato simile, ob id patet appellatum. Aristoteles in libro de stirpibus, eunuchos appellari scribit quoddam genus palmulae, quod alij enchoros uocent, quasi testiculares ac spandonas.

THEBAIDES.

CLIX.

Palmulae Thebaides in totū arentes sunt quemadmodum & Arabicae: macro corpore, exiles & torridæ, crusta obductæ uerius q; cute, Iudæis ut inquit Serabo, suauiores, etiā msi duriores: nec alio tractu Aegyptio tota nobiles. In ipsa quidē Aethiopia friatū hæc tarta est siccitas: & farinae modo spissatur in panem. Gignitur autem in frutice, ramis cubitalibus, folio latiore, pome rotundo, sed maiore q; mali amplitudine, cyas uocant. Triennio mature scunt: semperq; fructi pomū adest, subnascente alio. Hanc palmam chamæzelon uocatam à Dioscoride, quam nos pumilam interpretati sumus. Aliud ab ea genus est quam Theophrastus chamæripem appellat, hoc est, abiectam & repentem humi palmam, folio latiore atq; molli, ad utilia utilissimo, de qua in ita xō dictum est, copiosam in Creta, sed magis in Sicilia. Thebaidis fructus extemplo in cados conditur: ni ita fiat, exanimatur marcescitq; non refoctus furnis. Ebenus Aethiopica palmarū generibus ferē ascribit ut diximus. Syluestris palmæ fructus existimatur à recentioribus, quos officinae tamanrindos modo nominant: & quidā à sapore acrimonia oxyphœnicas,

algentis naturæ contra bilem flauam pollentis. Sunt qui folia eis falicis describāt similia. Non inuenio ē uerteribus qui de hoc genere quicquam prodiderit.

PALMA ELATE.

CLX.

Palma elate laudat ammonica maxime: tum Aegyptia, demū Syriaca, duntaxat in locis siccitibus odorata, pingui lachryma: que in unguenta additur. Elatem Galenus tenellum palmæ germani intelligit. Dioscorides ipsum fructus integumentum, Alibi genus est, ut in unguento latino diximus. Non ignorauit hoc Secundus nosster cum inquit: Palmam elatem conferre medicinae germina, folia, corticem. Cato palmam hanc intelligere mihi uisus est, cum dixit odoratum uinum fieri ē palma, quam habent unguentarij, Abies ergo duplex est, unguentaria & materiaria, uulgo nota: unde abiectæ trabes dicuntur, & abiectarij negotiatores atque fabri, pro eo quod est lignarij. Abies quia in cælum abeat à proceritate uidetur appellata.

MALVM GRANATVM.

CLXI.

Punica cōtoro & breui trūco, flore cōtra quam reliquis arborum puniceo, excipiunt amygdalarum quoddam genus: quæ subrubicundum florem sustineat. De acida planta uel semine, uiolenta dulcis: que in Aegyptio exit in Cilicia circa Solos ad Pinarum amnem ubi contra Darium pugnatum est, ut Theophrastus inquit. Omnes sine nucleo proueniunt. Sola hæc & uitis, & ficus, & malus caudice fisso nō emoritur. Aculeos gerit in ramis ut paliurus & rubi. Punicum malum Carthagine laudatissimum, indeq; cognomen, mali Punicum. Et Romæ locus erat in regione sexta, ut inquit Suetonius, quæ alta quoq; semita dicebatur, ut est apud Martialem poetam, ubi nunc uidelicet Diocletiani thermæ sunt. Genera summa duo: alteri nucleus adest lignosus, scleroeoccon ob id uocatur: alteri non adest, aut certe minimus, quod ex argumēto apyrenon dicitur pe nultima producta, licet correpta Martiali. Archastratus certē anguillam ut spinis & ossibus carentem, solam piscium apyrenon esse cecinit hoc uersu:

ἄπυρον ἢ πύρεν ἴσιν ἀπύρεν ὃ μὴν ὃ ῥυδόν.

Quæ autē sit Paulo Aeginetæ radix apyrani, ex qua recenti discusso rum cataplasma *ἀπυρᾶν* contra collectiones fingitur, ignoro. Natura sunt candidiore apyræ, & blandioribus acinis, qui minus amari sint distincti que membranis. Est & alia structura eorum communis, tanquam in fauo nucleos habentium quinque species, dulcia, acra, mixta, acida, uinosa. Samia & Aegyptia distinguuntur erythrocomis & leucocomis: ita nouem genera colliguntur omnium. Dulcia sæpe intelliguntur, cum apyræa dicimus. Vinolenta nucleum ferè parum habent. Yuam in ijs acne mustum quidem, sed uinum protinus aperuit natura: Apyrenis & uinosis cortex asperior. Ex acerbis fit medicamentum stomacis uocatum, sicut ex mori quoque succo panchristos cognominata. Acinos granatis totidem esse numero in singulis affirmant, etiam si magnitudo uarietate modo ex eadem arbore legatur. Satamprimum in Cypro malum Punicam à Venere testantur fabulæ grecorum. Fecitq; malum Punicam ibidem, ut est apud Callimachum, & fidem Hippocrates: Alia Græci rhoan & rhean, pomum quoque rhoas & rhoidia, & rhoedia uocare solent. Inuenio & rhoiadin uocari à Paulo in quodā cataplasmate cui nomen aphrodita

rio est, in quod & thus, & amyllum, & squama æris & cerussa quaritur: nam aloidiorum ex aloë medicina est. Side porro & Boetia terra dicitur, à qua & arbori nomen datur: quo argumēto Athenienses ab Epaminūda in Side regionis quæstione uicti memorant. Legit & Theophrasto fide fructus quiddam ut Athenes interpretatur, punice malo similis, Orchemeno lacu nascens. Theodoros Gazæ non punice, sed papaueris similitudine describit: quia rheas & punicæ & papaueris genus unum significet, quod discrimen illud, quod pro arbore primæ declinationis nomen est, & rheoa non rheas dicitur: pro papauere in tertiam refertur, rheas rheadis. Theophrastus certe non rheadi similis, sed rheas dixit: ut cunctis sit fida. Theodoros ex Theophrasto ita scribit: Sida papaueris inquit habet similitudinem, capite ad portionem maiore, ut quod magnitudine mali referat: nec nudum id est, sed membranis candidis obducitur, superque eas folia rosæ cum suis continentur caliculis quaternis herbaceis: dehinc uero grana rubra, exigua, orbiculata ostendit: nec magnopere maiora quam milium, sapore tritici diluto: crasse scit æstate paruo pediculo: flos calicibus rosæ similis, quod duplo fere grandior: hunc & folium super aquas manere, sed ubi desloruit, inclinari magis in uadum, donec attingat terram, atque ita fructum fundere. Folia pediculis, germina suillo generi, semine hominibus madi. Cogno minē huic haberi & in Nilo scribit idē Theophrastus herbam, sed radicibus caret. In tumulo Menoceti Creontis filij ad Boeotias Thebas Punica nasci traditur Pausanias, cuius poma intus sanguineum colorem præferant.

CYTINVS.

CLXIII.

Cytinus aliter ab alijs exponitur. Dioscorides & Galenus florē satiuæ punice ita uocat, balauistium syluestris. Plinius pomum ipsum immaturum, & primū partem eius florere incipientis, cytinum appellat. Flores ipsi balauistia in ipso erumpentes cytino, uesibus tingendis: quas color nomen inde accepit. Cytinū Dioscorides cognominat ipsum quod Apollinaris herbarum florē, cæteræ non proprie, sed per translationem. At cicum M. Varroni dicitur membrula prætenuis, in malo Punico discrimen: unde cicures animantes, quæ non sunt feræ, atque agrestes: à quo Veturij quoque nobiles cognominat Cicuri, etenim Silēna ferabitem pro syluestri arbutio posuit: partim ingit ferabite, partim lauro atque pinu abūdat.

MALICORVM. CLXIII.

Alicorium Græci sidion appellant, ex acerbis prælatum ad perficienda coria: nam & arbor ipsa, ut prædixi, à Boeotia sida uocabatur.

BALAVSTIVM. CLXIII.

142 Balauistium Græce quid esset, dictum est in cytino: Quidam caducum appellare modo uolunt, à Græco detorquentes: Mihi appellatio antiqua per placet, nec tantum Græcia fastidio, ut Latina deteriora probem. Aufonius balauistium, siue balauum non balauistium in carmine pronūtiat: item Columella.

MYRTVS.

CLXV.

Myrtus Græce μυρτιν dicitur, item μυρτιν & μυρτιν: item phibaleos ab Antiphane, sed & myrton ab Archilocho. Degenerat in fruticem, nisi crebro repurgetur. Vita ei ut quibusdam animalibus ambigua, hoc est, terra & aqua: præcipuus odor myrtis Aegypti, ubi cætera omnia hebescunt,

Semen apud Menandrum Synaristum manditur. Myrtū myrta dicitur à Catone masculinino & femino sexu, Græcoque (ut arbitror) imitatione: itē murta Varroni, unde muratū siue muratūli genus farcinis, quod ea large fasciaretur intestinum crassius. Vitis bacca antiquis pro libo fuit, antequam piper haberetur: generosum inde obsonium cognomine myrtatū. Commendantur myrtis & iura præsertim aprorum. Peregrina Italia arbor atque iam Europæ quondam: pacifera Romæ habita, ut cuius uerbenā, ut nūc laurus & olea, prætendi inter armatos hostes quietis indicium fuerit. Purificationibus quoque suffumens: adhuc bita, ob id & in coronis utebantur ea thesmothetæ Athenis. Præsertim Venus arbori, quippe quæ litoribus maxime proueniat. Venus autē & mari dicitur orta, hinc & arbor sacra coniugio. Græci arborē Mineræ ut olea dicunt communi fabulā, quod Myrsine Atheniensis puella fuerit, pulchritudine ac robore insignis, amica Palladi, quā iuuenis ab ea cursu & palæstrasuperatus interemerit. Catonis fastigia sunt cædidi, nigri, coniuguli. Alia distinctio est satiuæ ac syluestris, & in utraque latifolia: de syluestri agetur in oxymyrtine, satiuæ genera topiarij faciunt, Tarentina folio minuto, nostratē parulo, forensē hoc est exotica, præter nō, uersibus foliorū senis. Hæc non est in usu: Vtriusque ramola: coniugulā quæ & coniugalis uocatur, nostratē dici existant. Quætes myrtæa corona ufos quandoque tradit, ut triumphantis lauro. Celebris est Hyppolitū & Phædræ amoribus. Troezenia, cuius folia, ut inquit Pausanias, prope Veneris delubris late perforata nascēbātur: iniuriā uidelicet ferētia fauientis unguius & calamitatis formæ. Myrtæ sunt ipsæ myrti bacculæ. Ceterouersum fuit apud Græcos quod nā coronæ genus esset. Anacreoti naukratites appellata. Et pluribus uisum est, non aliud esse quod ex myrto, rosas comitantibus: Alij papyrus coronariam, quā Aegyptij biblon stephanotida cognominat, interpretantur: Alij & sampsocho fertū quod in Aegypto copiosissimum sit sampsochus. Quia porro de coronis incidit sermo, inuile non arbitror quædam huc trāsferre, quæ alio à nobis opere dicenda feruabātur. Ergo Lesbij, ut inquit Athenæus, myrti ramulos hypothyridas uocat: ipsæ se coronat implexis floribus: Alij pectorales coronas, quibus & ceruicæ quoque redimibāt, hypothyridas hypothyridas quoque dicebāt. Habet & hypoglossis ex hypoglossis herba quæ post dicitur: Item Isthmion, quā plerique Isthmicā appellant. Pyleones uero ferta sunt, quæ lunoni circūdabātur utiq; apud Spartanos. Sicyoniæ celebrat Iachacas, ex iacha flore quodā odoris commendatissimū. E myrto consistit & hælotides uocatæ, ambitus ingētis, cubito: uiuentium: ab Europa dictæ, quā Elotida Corinthij appellant, quod eius ossa in myrto condita ferantur. Quidā Elotida & Minerā dictā uolunt. E palma philiini sunt, quas Lacedæmonij Thyreaticos uocant, à loco ubi castra hostiū cepere: ē ferta Cāpanica mellilorini, quæ ex omni genere coronamenta mulieria in eo uocabulo Græci ferē intelligunt. E Ioto Aegyptia fit antiois, utiq; non omni, sed ex ea que colore rosæ nascitur. Ex ea uero que ceruleū eum habet, lotinos tantum dicitur: rosā cylistos maxime, quas & ecylystias cognominant: ē struthio struthiū, ē potho pothos. Est autem pothos duplex: alterum genus hyacinthi flore, alterum sine colore cædidi, quo sepulchra coronabant, à quo & nomen quasi deside-

ratis

ratis esset dictū. Theodorus desiderium conuertit. Floret æstate. Diuturnus est candidū: habetur & Aegidion coronę genus Eubulo, aut ex anagalide ut arbitror, quā nonnulli egglyn uocabāt: aut elýgo: nam lygos ægylis à quibūdā uocatur: elýgo autē coronas fieri solitas antiquis, in uicē documnus: aut gramine, quippe quod ab aliquibus ægion uocetur: nā fausi harundine ferula quī uinciebātur. Atilia phylliri nos synthematicos Aristophanes cū dixit, coronas uidetur promptuaras & parabiles intellexisse, non multum à triualibus & promiscuis diuersas, quæ à Græcis chydeæ quasi confusaneæ uocātur. Choronos Appion grāmaticus apud Philetam à choro dictos putauit, unde apud nos coronę sint uocatę. Sūt & acinſi corollæ genus ex acide: ita dicitur flos & satum quoddā, ut Athenæus & Plinius scribunt. Sunt & elicti ex elice, familiares Alexandriæ, nec non alijs quoq; floribus plicatiles: nam Tindiae Abydæi ab oppidis Aegypti ex spina sunt Aegyptia, nemore ibi sacro Apollinis, semper flores: multis comitatus fabulis, quas referte ut nō piget, ita certe pars interest. De ijs & in Aegyptia spina diximus ex Demetrii sententia. Coronamēti nomen uidetur & cuius mētionem fecit Cratinus, cosmolandalos uocatum, cuius inuentores Lacedæmonios fuisse Clearchus auctor est. Ariadnes coronam ē flore Theseo dicto perhibent fuisse: id satum radice describitur amara, ut Theophrasto placet, de quo Timachidas poëta Græcus ita cecinit:

θετειον δὲ δειπλον μέλας ἔνδοξον ἐνδοξόν
λαυρεῖον ἵδρον περιχλαύδον. ἐν ῥα μοιάνει

φλαός. Inuenias & apragmosin uocatum cosonariū quoddam satum apud Aristophanem poëtā, ut grāmaticus Aristophanes interpretatur, Athenis in Aca demia nasci solum. Anethinis quoq; feris usos uere res & Alcæus & Sappho testes sunt. Cotonas in Græcia facitatas à Stephano primo dicunt, ob id & nomen feris datum, ut stephani uocantur. Autorem & inuentorem coronæ sanum uicem fuisse Græci affirmant. Hybernas corollas nostri cotneas uocabant, q̃ & cornu ferebant in florū deſectu, sicut ex omni florū genere pancapias. Dictum est & in uicē de coronis alijs, item q̃ in helichyso.

MYRTIDANVM

CLXVI.

Myrtidanum: à Galeno myrtada nominatur, uirgultū & soboles myrti, qualis fortasse in sicu quoq; fruticat, exiens ab radice. Myrtidanū certe Plinius pro uino accipit, q̃ ex syluestris myrti baccis sit conditū, libta in tribus multi cōgijs deferuefacta, donec duo super sint. Hippocrates matidanū uidetur appellasse hunc fruticem, myrtidanū uero ipsum piper, ut post dicemus.

CERASVS.

CLXVII.

Cerasus in quatuor & uiginti sæpe cubita erigitur, crassa, dodrantibus quatuor ab radice. Folium mespili durum & lauis corticis leuore, colore, crassitudine: similis tilia, ob id apta cistis ut tilia: hic meatu flexo, nec gyrum complente abducitur, arbori ab infernis sursum uersus in angustias colligēdo sese, qualis in fronde ipsa quoq; descriptio est. In eundem modum & desquamatio euadit, alioqui præcinditur potius q̃ filo eodem auferri possit: per crassitudinem secto tenuitas folij detrahitur, nec arbor emoritur: q̃ si totum deglubas, qui reliquus sit, tunc humor elabitur. Tunica porō exteriore adēm-

pta nigricat: Interior pituita quædam mucosa & uiscer illius secūdo anno tenuior, altera subnascitur. Neri uiligno non contorti conuolutiq; in anfractus ut cortex: uirgis continuo q̃ nascuntur idem mos: rami dum adoleſcunt, alij subinde pereunt, ut qui ab imo sunt: alij continue cresunt, ut superni. Porſus abor deramolis non est, minus etiā aliquanto q̃ populus. Radix multijuga & summa telluris cute, nec crassa. Cōtortio eadem radices & corticis radicem tegentis, florē albo, piri uel mespili, ē racemis fauaceo. Fructū acerbior diospyri figura, magnitudine fabæ: quanq̃ acinus diospyro prædurus, ceraso mollis, ut Theophrastus inquit: apud quem diospyros hoc significat, q̃ lithospermon Dioscoridi & Plinio, ut arbitror: nec Theodorum satis probo, qui diospyron louis flammam interpretatus est, cum louis triticum interpretari debuisset: quando & uulgaris quoq; sermo granum solis appellare consueuit. Nascitur cerasus ubi amnes & tigna, omnino q̃ ubi tilia. Italica cerasum Lucullus inculcit: nunc trans Oceanum & in Britannia quoq; uicta. In Aegypto nulla cura eualuit ut prouenire posset. Genera nominantur Aproniana, quæ maxime rubeat: Actica nigerrima, rotunda Cæciliana. Iunianis gratus sapor tātū, sub arbore adeo teneris, ut gestatu marcescant, Principatus duracinis, quæ Cæpania Pliniana appellat: In Belgica Lusitanis: in ripis etiā Rheni. Tertius ijs colos ē nigro ac rubenti uiridibz, similis q̃ matureſcētibus semper. Sunt & laura cerasa in lauro primum insita, non ingratae amaritudinis: hinc amarasia dicuntur uulgo, quasi amara cerasia: etenim pomum ipsum nō cerasum, sed cerasū uocari Seruius præcipit, cui & illa quoq; uerba sunt: Cerasū inquit & anteq̃ Ceraso urbe Lucullus adueheret, erat in Italia, sed durum et cornu appellabatur, q̃ postea mixto nomine cornocerasum est uocatum. Sicut autem cornocerasa idē cū duracinis genus, an uero seruio credendum, qui cornū in Italia cerasum fuisse prodit, cum alia res sit cornus alia cerasus omnino, satis ambigimus. Cerasorum porō discrimen alterum quod Romæ uisulū appellant, frequentissimū in germania et Gallia, sed in Scythia ferē supra modū ubi et uiscina barbari cognominat, ut Pomponius Lætus, qui ea loca modo inuist, constat ter affirmat. Sunt Macedonica patuæ arboris, raro q̃ tria cubita excedentis, chamæcerasi uocatæ. Pomū hoc primā colono ferē gratiā uetētis anni refert: primo candidū, mox tubescit, deinde nigret, Septentrio ne frigidisq; gaudens: siccatur sole, conditurq; ut oliua, cadis. Mediū cerasis genus in tet acinos atq; baccas, sine osse, quemadmodum nascātur, Græci et Latini monstrauere. Fatigatur canicularum æstu cerasus. Defendit hoc incōmodum, ut inquit Palladius: herba symphonica, truncus arboris eius circūdata: nec qualis herba ea sit, ostendit: Quemadmodum neq; Greci polyprehnō appellat, cuius succo ægrotas arbores oblinere præcipientiſi quis Apuleio cedat symphoniam cam tradenti eandem esse cum hyoscyamo. Plinius symphoniam herbam describit alternis uiridibus roseisq; per caulem folijs, in posca sanguinem reſcipientibus mederi: hanc aliqui crephenam scribunt, aliqui symphoniam, alij gomphenam, aut somphenam. Quod si pro hyoscyamo sumi posset, non folijs alternis uiridibus roseisque, sed floribus legendum erit: quandoquidem Dioscorides ita dicat: πικρὸν δὲ τὸν κλωνίου ὀφθαλμοῦ

πικρὸν ὀφθαλμοῦ

πρόσθετον δὲ τὸν ὄλον. Accedit q̄ ad eruptiones sanguinis hyoclyamus quoq̄ laudatur.

SILIQVA.

CLXVIII.

145 **S**iliquā arbore sicū Aegyptiā uocari, & in Ionia Sceroniā, Theophrastus autor est, quā & ceratia dicatur. Galenus arbore ceratonā, fructū ceratia nominati scribit, à corniculi similitudine. Lucius Columella siliquā grācā, credo ut à scenogrāco distingueret, q̄ absolute siliquā rustici cognominant, recentiores Grāci xylocerata, sed alia est ficus Aegyptia omnino, ut Plinius notauit, & nos paulo post monstrabimus, quandoquidē in Aegypto nulla nascitur, sed in Syria Ioniaq̄ & circa Gnidū atq̄ Rhodū, folijs semper comantibus, flore candido, cum uehementia odoris: pomum siliquā, & ob id nomen, radice sublimi sed nō multū, platigera imis partibus. Supercie flauescens inarescens, succum auferente sobole. Pomum anteceditis anni detrahit, post canis ortum, statim concipit uterumq̄ præfert, & molē quandā uuā modo informem indifcretamq̄ primo edit: quā postq̄ adoleuit per actūz & x̄ quinoctiū florē emit, hyeme foetus enutrit, qui usq̄ ad canis ortum in parente durat ut prædiximus: tum metitur. Nō puto quenq̄ nescire siliquas prædulces esse earumq̄ mandi corticē, digitorum hominis longitudine, interim falcata pollicari latitudine. Seritur & hac apud nos semine: sed par: feliciter: quandoquidē nec fructum fert, & breui emoriunt. Galeus usum eius cibo damnauit, ut mali succi & lignosi, nec facile conficiendi. Posteritas commendat ad stomachum fulciendum utiq̄ post cōnā, & ad uentris profluvia, si quis præsumperit: Subter hāc arborem flaminis dialis capillū & ungues præfectos terra operiri mos & religio erat, ut est apud Gelliū: quanq̄ non siliqua sed silica mendose in eo legitur: nisi quis non siliquā, aut illicem aut salicem putet legendū. Ego ut ingenue ueritatis homo, quid sequendū in eo potissimū sit, non diffitebor nescire: in mediū ut pleraq̄ alia relinquo. Est & nomen herbæ Plinio ceratia, uno folio, radice nodosa & magna, coeliacis & dyentericis in cibo dāci. Idem autor coniungit huic petaricā, septē ei caules reddendo, qui uelut rosæ capita sustineāt: quanq̄ in codicibus quibusdam non peratica sed statica scriptum legas, quoniam sistat aluum.

MALVS

CLXIX.

Malus corticis leuore nitet: peculiāres habet nodos, belluata facie, ut Theophrastus scribit, sed prægrandi uno, alijs circa eum pusillis complutibus. Fructificat primis frigoribus. Vrena intelliguntur mala, quā ad uero uere maturescūt. Inter mala tuberos correpta priore syllaba dicuntur, baccis similiore q̄ malis, post Armenia, & omnino inter primas florent arbores. Inseri solent cydonio, piro, pruno, & Calabrici, & malis omnibus, ut inquit Palladius: q̄q̄ Plinius syluestre spinā Calabricē uocari dixit. Genera duo tuberū, candidū & à colore fericū uocatū. Papinius tuberos & zizipha: hæc ex Africa, illa & Syria nouissimis Augusti rēporibus inuexit, in castris lata, & aggeribus præcipue decora. Grāci quemadmodū ipsas tuberos appellant, haud possum conficere: nisi quis Syrica, siue ut in quibusdā exemplaribus habetur, ferica eas uocare putet, paruifucci poma, nec concoctioni, nec stomacho facilia, ut inquit iūst Paulus, Oribasius, Aëtius. Præferūt & ziziphis ædesina uocata, ut quidā putauere: q̄ gran-

dissima, calore ac humore temperata, medicis monstrantibus. Columella duplex ziziphi genus habet, rutilum & candidū: Inuenio apud Grācos quidā zizipha pro zinziphi appellent. Penē uero tubera peregrina sunt, in uno Italiæ agro Veronenfi nascentia, quā peculiari nomine lanata Plinius appellat dicit, obducta lanugine, ut struthis & Persicis ferē plurimis: nulla tamen alia commedatione insignia, ab inuentoribus nuncupatur. Matiana ex uico Aquileensi sub ipsas alpes, quibus similitudine respondeant Gangeris Paphlagone urbe nascentia, nūc Hispaniæ uernaculo uocabulo Matiana in commune sunt mala omnia. Sunt & à Manlio Manliana. Claudianis color rubens. Appianis odor & magnitudo cotoeoz, insito cotoeoz. Septiana rotunditate insignia. Caro adicit quiriana, & conditiua, quā dolijs condantur, & scātiana scādiānaq̄. In nomine sunt & gestiana siue Sextiana, siue ut Grāci scribunt castiana: quoniam & cestomela uocatur ab Aëtio, q̄q̄ ridiculē à cestojd est loro dicta quidā interpretes existimāt, cui similia sunt cortice. Hæc ipsa & pezoemela uulgo dicunt, & austera prædicat. Austera & dulcis sunt aphratomela: odorata hæc & pulpā habent asperā & squalentē à cōdionā. Sunt & parua quædā saporis gratissimi petisita, habent & Pelusiana, & prosiua, & ueriana, siue tiburueriana & situtia, sunt & phaulia & que Delphica Grāci uocat, & platania, & Mordiana, orbiculatis similia ex Apolloniæ agro qui Mordius cognominabatur, & Camerina, siue ut Columella uoluit, Aemina, & gracula. Itē gemella, nunq̄ in foetu singula: si cut belgemela siue melgemela, q̄ solij unū aliquando geminū erumpit latere medio. A colore ferica, ut nesciā tuberū hæc generis, an diuersi putet. A gentilitate melappia, à celeritate mitefcēdi, mustæ: de quibus in melimelis loco uo dicitur. A mamma: effigie, otthomastica: à conditione castrati feminis, spadonia: à corrugationis celeritate, pānucea: ab importuno & stolido tumore, pulmonea. Sunt quibus color sanguineus, origine ex mori insituta. Sunt & parua grati saporis, atq̄ etiā acutiora, odore syluestria, peculiari acerbitate improbitatisq̄ conuicio, de quibus proxime differemus. Itē Dacia ferme uilissimā, q̄q̄ aduentu prima, decerpitq̄ propteratā. Grāci Corinthiaca & Sidunte uico celebrat: nominatū & Lacōica & herina à uere dicta, sicut à lanugine chnodia, lanatis supradictis tuisse non planē dissimilia. Seruātur poma tabulatis loco frigido, septentrionalibus fenestris, quā sereno die lucē accipiāt parētes. Austri specularibus arcenti, Aquilonis afflatu marcescunt in rugas: Colliguntur post æquinoctiū autumni: nec ante sextādecimā lunā: neq̄ ante primā lunā. Cadua se parādā. Minimū melimela durāt, plurimum camerina, quā ut scātiana quoq̄, serotina sunt & gelu maturescunt, ad hyemē usq̄ pendencia in parente: Vini malo proprietates æq̄ ut piro: Malū à Grācis μάλον, arbor λυαία dicitur. At pomi nomen generalius est, ut cōplectatur quicquid apud Grācos ἐν ὄπω continet, in quo significatū est, cum dicitur à medicis, omne pomū refrigerādi & humificādi uim habere: parā alere, mali succi esse, autumno plus officere. Inde oporotheca ubi custodiuntur. Pomū Varro dictum autumat, quia potu siccitatis indigeat. Differunt tamen opora ab ijs quā acrodrya Grāci uocat: q̄ opora est quicquid nihil habet exterius lignosum: acrodrya uero contrā, ut malum punicum, pistacia, castanea.

castaneæ, nuces, similiaq. Vtrunq. genus salgami nomine complectuntur Latini, à quo salgamanus. Dubitatum est & in iure apud Celsiū, an nux pinea pomum esset, quia nuces essent, quicquid foris duro tegitur: malum, quicquid id quod efusus est, foris habet, pomo utrunq. contineret, quod fere probamus. Seruio nuces sunt, omnia corio duriore tecta, molliore uero pomæ. Feruntur & alia mali genera, suis mētibus prodenda. Galenus omnia inquit mala breui fugiunt atq. acescunt, utpote frigida, & excrementi succo redundantia: ideoq. nisi melle condita seruando, seruari non possunt. Excipiuntur cotonea inquit & struthæa: malos enim appellatione ueniunt & cotonea, & granata, & persica, & piri genus unū, libræ nuncupatum, ab amplitudine ac pondere.

COTONEA.

CLXX.

Cotoneis, ut primus Cato nominauit, amplitudo pinearū nucum, interim maioribus incuruatos trahunt ramos, prohibentq. parentem crescere: *νυλδωκ* Græci appellant, quoniam ex Creta primum illata fuerint. Genera eorum chrysomela, hoc est aurea mala, incisuris distincta, colore ad aurum inclinata. Nostratia cādidiora, odoris præstantissimi. Neapolitana ex eodem genere minora, odore uibrantia, prouentu ferotino, quæ struthæa nūc penē, sicut quæ celeriter mitescunt & præcoccia sunt, mustæa. Aëtius struthæa inquit dicitur, quæ magna sunt & suauiora, minusq. acerba. Cotoneo struthæis insito muliāna cognominantur: quæ sola ex ijs uel cruda uescendo sunt. Habentur & syluestria parua, & struthæis odoratissima, in sepibus nata: omniaq. iā & uirorū saluatorijs cubilibus inclusa, simulacrisq. nocturni conscripti imposita, ut Plinius querit, insignitaxatione seculi muliebris mollis. Cotoneum & codymalon siue cydomalō uocari quidam scripserunt: uerum Polemon floribus esse id existimat. Cotonei genus præter hæc inuenio phaulion uocatum, quo nomine mali quoq. genus unum dici meminimus.

MELIMELA.

CLXXI.

Melimela dicuntur à sapore melleo: eadē & à celeritate mitescēdi, mustæa, ut inquit Varro, uocabatur: minimum durat hæc, ut inter mala diximus. Mustæa sanē ueteres appellabāt id quod nos præcoccia: unde de cotonea quoq. certo genere mustæa dici solita reddidimus. Item pira quod recens est, mustum & musteum dici solet, Athenis melimela nominabatur, malo in syluestrem pirum cydonium uel insito, ut scribit Diophanes.

EPIROTICA.

CLXXII.

Epirotica ex Epiro inuēta primum, argumēto est cognomen: orbiculata nostri appellant, ex figura orbis in rotunditatem circumacti.

SYLVESTRIA MALA.

CLXXIII.

Syluestria odore acutiora, sed improba & acerba, ob id & conuiuo dicata: ijs tanta uis, ut aciem gladiatorum perstringant. Aliud genus sunt, quæ poma syluestria dicuntur, ære rustica scriptoribus, ut albæ spinæ, græcæ siliquæ, iuni perus, lotos, pampinus, cornus, arbutus, prunus & paliurus, atq. achradæ piri. Quid porro sit in Columella (sunt enim hæc Columellæ uerba) pampinus & an corrupta sit lectio, pro eo quod est carpinus, aut pinus, relinquodiscutendū peritis,

PERSICVS.

CLXXIII.

Persica ex Perside aduēta, ut ipso nomine appareat, Theophrasti temporibus in Aegypto tantum & uicinis locis ferebat: in Rhodo ad florē usq. perueniens, quod primum ab Aegypto uenienti hospitium fuit: inde Rhodacina fortasse uernaculo Græcorum sermone dicta, nisi quis inueterum nomen putet, quasi doracina: sic enim Persica ipsa nominatur à Græcis recentioribus Paulo & Aëtio, quasi duracina, de quibus post agetur. Notat auctores nūquam minus odoris pomo, plus succi, qui tamen sitim stimulet. Falsum est uenenata cum cruciatu in Persis ea nasci, & poenarum causa à regibus translata in Aegyptum, ubi coelo proprietatē mutauerint: Id enim de Persica diligētiore tradunt, quam nos in suum locum differimus. Persicorum palma duracina. Nationum habent nomen Gallica & Asiatica. Post autumnum marescunt, sicut æstate præcoccia, quæ Plinius intra xxx. annos inuenta, prodente se testatur, & primo denarijs singulis uenūdāta: Superlatia & Sabinis sunt: popularia ubiq. Pomum innocuum uel ægris. Pretium singulis triceni quondam fuisse nūmi, nullius maiore quod miremur: quia non aliud fugacius: longissima nanq. decrepto, bidui mora est, cogitq. se uenundari. Persica in prouētū malū autumno conduntur, ut uix cadis. Molliscam nucem sunt qui Persicum interpretati falsū fuerint, ut in iuglande cōmonebimus. Persica sine suis ollibus & inscripta quemadmodum nascantur, docebit Palladius: Idem tria genera enumerat, Armeniā, Duracina, Persica. Sint hæc Armeniā, quæ prunorum generis esse quidam uolunt, an diuersa, studiosi salgamarum diiudicent: mihi eadem uideri placet.

ARMENIACA:

CLXXV.

Armeniaca siue Armeniā prunorum generis sunt, peregrina & ipsa, ut ex nomine cognoscitur. Sola & prunis odore commendantur, Armeniaca uocari de sita, & præcoccia siue præcoccia tantum dici, testis est Galenus. Palladio præcoccia differunt ab Armenijs. Græci nō præcoccia, sed berioecia fere pronuntiant.

CITREA.

CLXXVI.

Malus Medica flores duobus modis procreat: alios qui uelut erectam in medio colum habent, fecundiores existimati: alios qui cæteant ea, infecundos. Sunt qui & Assyriam & Persicam malum uocent. Item citrum, citrea: Græci est Hesperida & malum eius Hespericum, autore Iuba, qui ab Hercule translatus id in Græciam, & aureum malum uocatū scripsit, ut Virgilius de ijs intellexisse uideatur, cum dixit: Aurea mala decem. Nuptiale pomum intelligi hoc uolunt, qui æditum à tellure fabulantur, nuntiatio Iouis & Iunonis contubio. Folium ei adrachines unedōisq. spinis intercurtētibz, ut in piro & oxyacantha, sed leuibz, infestis mucrone, ualidis. Non mandebatur pomum Theophrasti ætate, sed ne Plinius quoq. (ut arbitror) magnopere, tā tum odore commendato. Plutarchi certē aorum memoria gustabat nemo, ut Athenæus inquit: Nunc à Palladij fere temporibus promiscuum expetimus cœnis, qui & medullas eius acres dulcibus mutare docuit: quanquam Apuleius negauit eandem esse malum. Assyriam siue Medicam quæ citrus: quod citrus exiguum esset genus arboris, Medica uero,

uero, ut Maro scribit, ingens. Pamphilus citrū crūtū à Romanis eam dici, paræ peritus homo, scripsit: ut cūq; arbor hæc scribitur, uere partibus cultissimis, semine quarto die aut quinto rigat. Maiuscula trans fertur etiā uere, in solū molle udu mōq; nec admodū gracile. Arbor ipsa omnibus horis pomifera est: alijs ruentibus, alijs subnascentibus, alijs mature scētibus. Scribit & fistulis, dato radicibus spiramento, per cauernas ut palmæ: qualiter omnia trāsita longi- us haberi cōueniunt. Semen eius solum id qd in colo quadā medio prorumpit, focundū existimatur à Theophrasto. Sed hæc olim fuit: Nunc trāslatia & triualis ferē arbor, ut pluribus generib; citrea Ligu- riæ, Cāpaniæ, Benaco lacu, Italia ferē tota germinet foelicer, quācūq; libet imaginē reddentia. Hæc ex insitione mali quociens prouenit, citromela proprie dicuntur ab aliquibus: q̄q; uero Mala mala dicat- ur, ipsum tamen pomū Galenus malū Medicū uoca- ri negat, sed citrū duntaxat. Theophrastus etiā ma- lum Medicū & Persicū est ubi appellet, cum huius fe- re unius mali semen imperspicuū esse dixit, n. uolu- mine de stirpibus, ut Athenæus interpretatur. Diphil- us autor est, citria quādoq; pruna Persica uocari so- lita. Aristophanes grāmaticus à Lacedæmonijs oxy- mala Persica nuncupari prodidit, quibus & deos co- ronēt. Menas illas ueteribus & Plinio decātas, pre- feritq; Ciceronianā, non ex hac fuisse citro, sed ex alio citri genere conficō pluribus argumentis, sed il- lo potissimū, q̄ arbores ex quibus fierēt, cupressō foe- minæ syluestri, similes folio, odore, caudice, à Plinio prodūtur, Anchorano monte citioris Mauritaniz, fedi iam tum exhausto: itē Adāte, cuius imas radices densisaltisq; repletas syluis, incognito genere arbo- rum Suetonius Paulinus à Plinio citatus, asserit spe- ctabili proceritate, enodi nitore, frondibus cupressi, præterq; grauitate odoris, has tenui lanugine obdu- ci, quibus addita arte possint quales bōyne uestes confici. Idē autor paulō superius efficacissima, ingre, luxuriæ uis sentitur, cum ebori cedroq; syluæ exqui- rantur. Præterea quis potest negare arborē, ex qua tam celebres mēfæ consent, trogetem & thyian & thyon à Theophrasto & Strabone dictæ esse Idē Plī- nius exploratissimū nobis fecit: de thyia uero Theo- phrastus: Perpetuo inquit uiret, arbor procera, inter syluestres serotina, ut nulla ferē tardius germinet, al- gentissimis locis, & cacuminibus montiū gaudens: circa Ammonis delubri præcipua nascens, & in infe- riore Cyrenacis parte, atq; ubi ipsa tunc esset, ramis, caudice, frondibus, syluestri cupressō similis: ex ea ueterum temploq; conignationes fuisse, immortalī post cupressum in tecta materie. Nihil radice crispis- us, nec aliunde pretiosiora opera. Siccata mari duri- tie & maturitate incorrupta spissari tradit, nec ullo modo uehemētius. Homero quoq; notā fuisse, inter odores uirilitatē à Circe, Magnō errore eorū, qui odo- ramenta in eo uocabulo accipiunt: cū præsertim eo- dem uersu candrū & lareicē nominet, ut manifestū sit de arboribus tantū loquuti: nam & Calypsus & He- læ thalamos & thyia conditos, idem poëta cecinit: Quid habet citrus nostras cōmune cū cupressō: Fron- dis cupressō, iuniperi Sabinz, cedri, citro, lauri, adra- chnes, arbutū? Quid tam diuerfum, q̄ galbulus & ci- treum? omīto alias notas. Quibus perspicuo lique- re potest uolētibus, decipi grāmaticos, quicūq; mē- las citreas ex hac citro, quę nunc habetur, factitatas

arbitrātur. Dion certe historicus, Neronis uita non ci- treas sed cedrinas mēfas appellauit, siue cedropoti- us q̄ citro similes esse uiderentur attores, siue q̄ in exemplari uitii est. Erit ergo thyia, siue q̄ idē est tro- getes & citrus duos omnino generū, ut cōstat, unū cedri eius, ex qua mēfæ dolabātur, alterū citri eius, ex qua malū Medicū. Plinius alia inquit est arbor eo- dem nomine malū ferens, exeratū aliquibus odore & amaritudine, alijs expetitū: domos etiā decorans, quod & sensisse Macrobius uidetur: hodieq; Maurita- ni malū Medicā & pomū eius atrogī uocant, à troge- te uocabulo paræ deflexo, alioquin *syriāthū* non quia mādī posset, sed *syriāthū*, quia mādī non posset, appellatū censuerim: quādoquidē ut dixi, ueteribus esculentū non erat. In summa, non nego malū quoq; Medicā in Mauritania fuisse, cum plena sint poetæq; omnia uere uolumina: Sed ex qua mēfæ illę celebres existerent, malū Medicā fuisse, hoc nego & pernegor. Nec dissimulādū tamen est Phaniā Eresliū v. uolu- mine de plantis, cedrū appellatū, ac malū cedriū pro eo quod nos citrū & citrū uocamus, & Dioscoridem secuti cedromelon. Varro q̄q; Libycā citrū nominat.

PIRVS.

CLXXXVII.

Pirum græci edomitā siue urbanā Apion & Adi- pion appellāt, de quoq; prouentu Peloponnesus quoq; ipsa quādoq; dicebatur Apia: licet quidā ab Apia Phoronei filia terrā eā ita nominatā putent. Poëtæ sunt qui pīr ochnen uocēt, syluestre achrada ut mox dicemus. Apios & raphani genus est. Turbi- nata pīris omībus figurata, multis generibus: alia par- ua ocysimaq; & odoratissima nominātur superba: in his Crustumina quę gratissima, & ex parte rubēt & proxima his Falerna, ceu lango succo habundātia, hæc laetæa uocātur: in ijsq; alia colore nigro donant Syriæ: post hæc decumiana, & ex ijs tracta origine pseudocumiana. Dolebelliana longitudine peda- li. Pomponiana cognomine māmosa. Liceriana, Se- ueriana & quę ex ijs nata sunt, tyrāniana petiolū lon- gitudine distātia. Fauoniana rubra, paulo superbis maiora. Lateriana siue Laterisiana, ut Columella uo- cant & Macrobius. Anitiana & autumnalia acidulo sapore grata, & quę maxime Tiberio principi pla- cuere Tiberiana. Colorātur hæc magnis sole, gran- descuntq; alioqui eadē essent quę Liceriana. Accedunt ijs Neuiana Tutaniāq;: atq; hæc autorū suorū no- men habent, præter superba & Falerna. Partias nobi- litauer & quę sequuntur. Serissima omniū Amerina, Picentina, Numatina, Alexandina, Numidiana, Gre- cula, & Tarentina. Signina quę aliq; à colore testa- cea appellāt, sicut onychina, ut quoddā pruni gen^{us}, purpurea, ab odore myraria, nardina, laureta, orde- aria, siue ordeacea à comitatu frugis eius: à collo am- pullacea, & corolliana & Brutæ gentilitatis cucurbi- tiana. Acidula à succo: à melle mulla. Incerta nomi- nū ratio barbaricis & Venerijs quę colorata nificūpāt- ur: Item regijs, quę minimo pediculo quasi sessilia sunt, iam patriijs Voconijs quīridibus & oblongis. Dixit & Volema Virgilius à Catone sumpta. Vole- mium uocat Macrobius qui & ceritium & cerusū, & calculosum, & Lollianū, & Lavinū, & Milesium, & myrretū, & orbiculantū, & Pretianū, & Rubile, Tulia- num Ticianumq; itē mēpilaceū & Valerianū iudica- uit, Cloatiū secutus. Idē Cato & Semetina & multea quoq; nominat. Ampullacea Græca, Laureta ad hye- mem usq; in parente pendent, serotina & gelu ma- ture-

tutescencia : nam quæ Aristoteles apembloadas nominat, insitij generis intelligitur. Vini proprietates & piri. Conducitur hæc totidie quibus uua modis, non aliter q̃ in cados. Vino & aqua coquuntur in escam ægris danturq̃ pulmentarij uice, q̃ non alia preterq̃ cotonea. In conuiuijs Græcorum pira secundis mensibus inferebantur aqua merta, ut mitissima quæq̃ legi possent. Pira sunt & quæ libralia uocantur, sed sola tamen & piris mala dici consueverunt. Liqueam de piris fieri solum adieciunia fœminarum inuenio, quod castimoniale dicebatur: Pioru quæ maculissima sint, carnibus integro sale calcatis & resolutis, atq̃ sitilibus picatis cupis uale conditis.

PIRVS SYLVESTRIS. CLXXVIII.

A Chudon piri syluaticæ, hoc est, achrada, & apud quosdam ut apud nos & pirastrum feritiliore urbana prædicant: Hyme fructificat ferè, Autumno tamè genus eius unum, ut Theophrastus inquit: Materia ei apprimè dura, ideo hydiscos tabellæ futuriæ & piro sylvestri faciunt: quoniam ut in molli retunditur, ita in duro ferrum acuitur. Aculeatos hæc habet ramos ut Punica. Quid autem achyrades Heliano sint, quas in cibo primu Tyrynthos habuisse memorat, non comperi, nisi quis non achyradas sed achradas, hoc est, pira syluestria in eo legat: Nā ut idè autor inquit, ante panis usum Argiuos effuisse pira meminit, ut Athenienses ficos, glandem Arcades, Indi harundinem, Carmani palmas, milium Sarmatæ, terebinthum nasturtiumq̃ Persæ. Achyra certè paleam significat: nec uideo q̃ sit uerisimile paleis quenquam uesci potuisse, quasi ueterinum, etiam si Arcadas radicibus herbarum & arboru folijs recentibus ante glandis fagineæ usum & a Pelago traditum, uicissatè creditur.

MESPI LV S. CLXXIX.

M Espilorum tria genera, setanium in, anthobon & anthéboides quam & Gallicam intelligunt. Setanio fructus grandior, candidior, solutior, a cini molliore ligno, reliquis minor, sed præstantior odore & altringentior gustu: quod sit ut diu diu quocque durent. Lignum his flammis & spissius: Flores omnibus amygdalæ, non tamen tuberites, sed propemodum herbacei. Arbor inter amplissimas comosa in gyrum, folio scisso extremitatè quæ apio simili, sed maioribus diuisuris, promisso, rigenti, neruoso, tenuiore & longiore quàm apium, longo & gracili pediculo, radice alta numerosa quæ: ideo longæua est arbor, at terra quæ inextricabilis. Lignu densum, incorruptum, solidum, semine & auulsione feritur. Folium antequam decidat uehementer adrubescit. Infestatur & hæc uermibus in senectâ, qui prægrandes ei diuersi quàm cæteris contingunt. Nō fuit hæc arbor in Italia Catonis ætate. Hæc Theophrastus & Plinius. Verum alia hæc mespili distinctio est, q̃ a Dioscoride representata est: Et sanè quæ dubitari solet, an mespilum ueteres cum sorbi arbore confuderint, quandoquidem altissimis connumerat, quod certè sorbo quàm mespilo nunc uocatæ, magis conueniunt: nisi quia nostratem mespilum nō tam mespilum quàm chatè mespilum appellandam fortasse censet: quæ nascitur, ut inquit Dioscorides Italici uocata epimelis, de qua sequenti capite disseret. Certè Iulius Pollux, mespila inquit & sorba quoque appellantur.

EPI MELIS. CLXXX.

M Espilum Setania à Theophrasto nominatam Dioscorides epimelida uocari scribit, Hippocrates hamamelida. Galenus mespilli comuni uocabulo tricoccum, quasi triosum aut trigranu ab aliquibus appellatum meminit, quoniam tria intrugrana siue lignastru habet loco seminis, quid aliè sit epimelis Galeno, differendu putauim? in arbitrio.

LOTVS ARBOR. CLXXXI.

L otus arbor (nam & herbæ sunt hoc nōmine complures) in Latino celtis uocatur, itemq̃ faba Græca: Seruius fabam Syriacā: Nymphæ in arbore sui nominis cōuersa, quam Priapus fugientem comprimere quælisset. Anacabe uulgo apud Græcos dici auctor est Aëtius, ut fructum eius anacabon, licet quidā peruersè, aliacabon scripsere Græci, piri magnitudine aut paulo infra. Incutitur folio crebriores, alioqui illicis uidentur: spissa, nigra, enodimaterie. Differentiæ generum plures, eaq̃ maxime fructibus constant. Amplitudo fabæ pomæ, color croci, sed ante maturitatem, ut in uuis, alius atq̃ alius. Nascitur in tamis densum myrti modo inter sese aduersum, non ut in Italia cerasi. Manditur inter lotophagos in nocua dulcedine suauitatèq̃, nec uentris sentire morbum ferunt qui uescantur, secundus meliusq̃ sine interiorè nucleo, qui in alterutro genere ostenditur. uinum exprimit huius simile molle, quod ultra deijos dies negat durare Polybius: sunt qui biduo triduo uel accere id scribant. Baccas eius contusas cum nucleo & callo suo, dolis ad cibos edunt: unde uulgo Romæ puls Syriaca uocatur: arbor illa modonam Padi accolæ baccam Syriacā appellant. Tanta uero fructus & arboris copia narratur, ut exercitum Ophelli Carthaginem petentis, in comineatuum defectu pauerit. Numerosa in Phariade insula Lotophagoru: plurima & in Aphrica nos spectat. Familiaris & Italici, sed natura coeli terræq̃ mutata, & succos oblitera priores. Præcipua est circa Syrtis atq̃ Nafamones: Sunt qui breuè tradant arborem ut Polybius, qui & uidisse se testat spinis asperam, folio uirenti quale rhamnu, tantum profundius latioreq̃ fructu myrti cæcidæ per initia, processu putriceo, magnitudine oliuæ, sed totum: Eum cibo familiæ tu hodi cum nucleo, qui perexiguus ei est, seruari conditum. Eundem nucleu herilibus mensis exim: sapor è sici & phœnicolobani esse pomæ, sed præstare odore. Vinum & acetum inde fieri. Lignum ceteræ ad tibiam cantus expetitur: è radice cultellis capulos & subscudes, ac breues alios usus excogitant. Hesperidulotos ab ea quæ Lotophagis nascitur distat, ut qualigni uice utantur ad urendu. Non desunt qui fructum eius post putamè esse, nec canosum foris, sed cuticulacum proderint: nec tam cibo dulcem q̃ gustu alias iucundum, ut hinc fortasse Dioscorides maiorem pipere descripsit: ac fructus quidè Lotophagis dulcissimus, sed materia Cyrenaica præferat. Radici nigritia maior q̃ ligno, sed desitas minor quæ in loto post buxū & hebenū summa reddit: utilitas quoq̃ radici latior. Particulatim lotus fructificat nō ab utroq̃ sui germine, q̃ & in bulbi & tichy mali quodā genere notatū est. Ludicere tibi fieri coptæ sunt è loto, quas Alexandrini phoingas appellant: sicut ex asininis quoq̃ ossibus & argento. Ebur quoq̃ ceptum pertundi, unde tibie elephatinæ dicantur, reiectis propter nimiam difficultatem harundinibus: propterea Ctenomari lotum arborè hodieq̃ appellat.

d lane

lant calamū. Spectatur Patauj antiqua lotos in qua-
dam Anoniani templi xyſto. Eſt quando Hippocra-
tes luto pro loto noma. Circa Memphim ne-
mus à Theophrasto deſcribitur fuiſſe tam ualtis ar-
boribus, ut excederet trium hominum amplexum,
utiles operibus, colore deſtituta perſimiles loto:
nam faba ſiue arbor Pōica genus diuerſum eſt à fa-
ba Græca, id eſt, loto, magnitudine ſici, fructu ſabe,
ſucco uetiſſibus expreſſo, quem achy uocāt: niger au-
tem craſſiſſus eſt: aut per ſe lucentes aut mixto lecta
uiſcant. Naſcitur in Scythia.

CORNVS.

CLXXX.

Cornus crania à Theophrasto dicitur. Sexus
in ea duplex: fœminata Græci thelycrania
uocant. Fructus ſylueſtris maturiores ſuauio-
res quàm urbanæ: quod in hac & ſorbo peculiare
ſerē eſt. Cornus altera præcox, ſoliſtiti fructificans;
altera poſt Autumnum, cui & fructus inguſtabilis,
lignum infirmum, hianſis & fungoſum, quæ fœmi-
na intelligitur: contra mâculæ firmiſſimum. Fœmi-
na uiticula parua à lateribus emittit Amerinæ mo-
do ſaliciſ, in totius fructuſor eſt, mollis & medul-
lacea, uenabulis damna. Materies mâculæ robu-
ſta, ſolida, excorſis tota, hoc eſt, ſine medulla, & cor-
nu inſtar prædēſa & offea. Nodos cornus omnis ha-
bet per interualla geminos, & inuicem reſpondētes
ut in uirice. Folium amygdalæ, ſed pinguius & craſ-
ſius, cortice neruoſo ac tenui, caudice nō admodum
craſſo. Mas duodecim ſerē cubita excedit: quam alti-
tudinem ſariffæ Macedonum ampliſſimæ habēt. In
iſta mas ſterilis, fœmina fructiſera. Fructus apud Ma-
cedones ambæ ſerunt, ſed fœminæ (id diximus) qui
mandi non poſſit. Radices ut Amerina firmas & cō-
tumaces emori: humidis locis auſſione ſemine quæ
prouenit. Eſt & in India arbor ſerens fructus ſimiles
cornis, quæ merito cornu Indica nominari poſſit.

SORBUS.

CLXXXIII.

Sorbo ſyluaticæ præſtantiſſior quàm urbanæ fructus,
quod in hac & corno præcipuum. Theophrasto
notauit. Arborem Græci *ἰδῆ* & *ἰδῆ* uocant. Fructus
hæ & *ἰδῆ* uocant. Fœmina fructificat ſola. Diſcri-
men in fructu, q̃ aliz figura orbis, aliz ou ſerunt.
Item in ſucco: aliz odoratiore dulcioremq̃ utar-
biculatiferē omnes. Aliz acidum peiusq̃ olentem,
ut ouales. Vtrique folia pediculo ſingulari, prolixo,
neruaceo, cōdita in uerſus, alæ modo à laterib⁹ emi-
cantia, tanquæ ex omnibus unum ſiant: lacinijs pen-
natim ut in ſilice ad neruū uſq̃ diductis, ampliſcu-
loſq̃ diuiſis interuallo: atq̃ hæc non paulatim ut cæ-
ceris, ſed uniuerſa collabuntur. Omnibus ramulis in
extremo pediculi folium prominere, cuius acceſſione
impar numerus efficitur. Figura ſi lauri tenuiſſolig,
præterquam quod ſerrata per ambitum breuioraſq̃
ſunt: neq̃ cacuminibus mucronatis, ſed in rotundita-
tem reſuſis. Floſ racematiſſe coactus ex pluribus cā-
didis ac minutis, petiolo unico dependet. Fructus cū
large proueniunt, uix modo ſarcti congeſtiſq̃ uiſu
eunt, ex uno petiolo faui ſpeciem præbentes. Exeſt eos
uermiculus etiamnum crudos acerbifimoſq̃: ipſa
quoq̃ arbor in ſenectū uermibus obnoxia, ruſſis, hir-
ſutis, ſui generis. A trimatu fert: autumno folijs ſub-
inde amiſſis cacthryſnam fundit, eduraturam hye-
me, ut in robore. Aculeos ſorbus non habet ut melpi-
lus. Nouella cortice ſui pinguiſculo: ſauet & candi-
do, annoſa, ſcabro atroſq̃. Arbor ipſa de grādibus &

ſubrectis, coma concinna: & niſi quid impediāt, uer-
ticem nucis pinæ repræſentans: materies ſolida, co-
lorata, firma, cōpactiſſis: radicibus neq̃ multis, neq̃
in altum deſixis, ualidis tamen & craſſis auelliſq̃ diſ-
ſiciliſimis. Naſcitur ſemine, radice, auſſione, ſolo al-
ſioſo, humecto, interimq̃ montibus: conduntur ſapa
Catonis præcepto. Noſtri differentias in ſorbo qua-
tuor nouere, alijs rotunditatem mali reddunt, alijs
turbinem piri, utriq̃ ſaporem uini generoſiſſimum,
cui circa pediculos folia alijs ouata ſpecie, odore
acri, nec perinde iucūda ſuauiſſitate. Quarrum genus
torminale appellat, ualens contra tormina: hoc aſ-
ſiduum prouēre eſt, minimumq̃ pomo, arbore diſſi-
mili, folijs ſerē platani. PRVNVS. CLXXXIII.

Prunus *ῥυκινυκία* & *ῥυκινυκία* Græce dicta: po-
mum ipſum neutro genere, arborem mâculi-
no, media cōmodia pronuntiat. Folio arbuti
deſcribitur, ſi Theodoros audiatur, & inter paruas, ut
peculiare in ea Theophrasto reddiderit, fructum in
lanuginē ſolui quæ dicitur papp⁹, quod nulliſq̃ ar-
bori eueniat: ſed hoc Plinius Theophrasto ſecutus,
non pruno ſed cōgigryæ uocata tribuit. Decepit
hominem uel corrupta lectio, uel non nomini aſſinitas:
forte quia *ῥυκινυκία* non *ῥυκινυκία* ſcribendū erat:
nam & uinedo cui ſimilis eſt cōgigrya, neſic nomē
apud Theophrasto habet. Prunū ſylueſtre ſer-
gilius ſpinū uocauit eo uerſu: Spinos iam pruna fe-
rentes. Genera pruni propē inexplicabile, uerſicolo-
ria, nigra, cādidā quæ à comitatu frugis eius hordea-
ria dicatur: alia eodē colore, ſeniora maiorq̃, aſina
cognominata ob uolitatē: ſunt & onychina Colu-
mellæ, nigris laudatiora: ſunt cerina ſive cerola argy-
purpurea, necnō Armenica, de quibus dictū. Habē-
tur & inſita nucipruna, quæ in facie parētis ſuccum
ad optationis præſentem, nuciprunaſq̃ uocāt: hæc &
cerina & ſylueſtria ubiq̃nata, ut uix autūno cadis
uſq̃ ad alia naſcentia conduntur. Reliquoſq̃ uelocitas
trāſualat cito marceſcentiū: Non prunum, inquit Pli-
nius, in Betica malina appellari cœperit malis inſita
& amygdalæ: intus in ligno nucleus amygdalæ: nec
aliud pomū ingenioſius germinatū eſt. Damafce-
na & Damafco Syriæ iam pridē ante ætate Plinij in Italia
naſcebātur, grādiore quæ à carne exiliore, nec
unq̃ in rugas ſiccata, quādo ſoles ſui deſunt. Popula-
res iſs myxæ de quibus in Aegypto & uina ſiſſicamī
milares & ipſæ Italiae uel ſorbis inſite. Amariora pru-
nis myxa, ui ſimilia Paul⁹ exiſtimat. nā myxa Græci
uocāt, nos myxas, quibus ſimilis eſt perſic⁹ Aegyptia,
niſi q̃ poma Aegyptiæ rubecūt. Pruna oia poſt Ca-
tonē in Italia cœpiſſe maniſeſtū eſt. In ſylueſtribus
ſatiuſq̃ prunis limus eſt arboſq̃ quē lichena Græci
uocāt. Eſt & ſua pruna Aegypto magnitudine inſig-
ni nō diſſimilis pinæ Syriæ, pomo meſpili, ligno in-
tus grādī ac rotundo. Floret incipit mēſe ſerē ſulio,
matureſcit bruma, nec folia dimittit. Corpus ipſum
pomi natura copiatq̃ pro meſſibus eſt incolis: ſiccāt
ut purgatūſq̃ tundunt, ſeruātq̃ eius offas qui Thebis
habitat. Mirat Galenus Dioſcoridē, q̃ pruna Damafce-
na ſicca aliu ſiſtere prodiderit, compenſipico ſol
uant: q̃q̃ minus inquit q̃ Hiberica uocatur, quonā pri-
mum ex Hiſpania uenerūt, ut inquit Aëtius ſucci dul-
cioris. Cæteræ Damafceſena intelligūt, quæ Theocri-
brabyla uocauit, q̃ & madrya & badrya dicit Ache-
neo. Prun⁹ ſylueſtris, ut idē autor eſt Gale. in Aſia pru-
non dicit, & nos ſa uulgari uoce prunula uocam⁹.

ARBY.

ARBVTVS. CLXXXV.

Arbus Græce *ῥήμας* & dicta, cortice deciduo tenui, similitudine tamarici, folio inter ilicet atq; laurum: arbor ampla nō est. Flores Iulio mēse ab uno pediculo cacuminibus racematim dependētes similes bacis, longioribus myrti, neq; foliis sed concaui, ceu ouū pertuso uertice. Cum deflorescunt parte qua sunt annexi perforantur, relabendoq; in pediculus, specie uerticilli fuso iniecti præbēt. Fructus anno perficit, cibo idoneus, ut pariter floreat subnascens, & prior coquatur. Carbonibus officinae argenteae cōmendant coctione prima, ut ariā. Pomū hoc & *ῥήμας* & *μυρδύλλων* Græci ferē uocāt. Latini pomū & arborē q̄q; ipsam unedonē & arbutū appellāt. Sūt qui duos genera constituat, Theophrastū ut arbitror secuti, comaron, id est, arbutū, & mimycylon, id est, unedonē à rheophrasto neliā uocatū, defluo & hoc cortice, folijs q̄q; sed ima tantū parte deciduis, uirente perpetuo coma, Mas sic an femina sterilis nō constat. Arbor ipsa fruticosa: pomū in honore, ut cui nomē ex argumēto sit, unū dūtaxat edēdi: uel forrasse, quia foliū hoc pomosū simile fructū terræ gignitur, hoc est, fragis terrestribus ē quin folio frutice nascētibz, quæ & mora terrestria dicitur à Seruio grāmario: nec satis scio an recte: Ideoq; mōtana fraga nominantur à poetis, ut à terrestribz distinguerent. Galenus & Paulus arbutū comaron, lynedonē uero, siue ut ipse lego, unedonē à rusticis Italiē uocari scribūt, quā *ῥήμας* & *μυρδύλλων* Græci nūcupatū syluestris mali genus, copiosum in Calabria, fructu acerbō, & infecto capiti & stomacho: sed siue aliud hoc sit ab eo q̄ Dioscorides inter mespila cōnumerat & epimelida uocari meminit, siue idē, certē Palladis epimelides siue hypomelides, inquit, sunt poma sorbo similia, mediocri arbore nascentia, flore candidulo, sapore ex acri dulcis. Pampphilus epimelida pirigenus arbitrat, quod alij uocāt hamamelida, quidā homomelida, frequentem in Ionia & biferā, fructu piri feli generis: omnino, ut Athenæus inquit, prædulci sine nucleis, ac prælato piris: alij homomelidas uocāt, ut a *λεπιδες*, non pira, sed mala syluestria & mōtana, quæ Theocritus Oromelidas appellauerit, cum sicu maturescētia. Hamamelides, inquit Galenus, apud Hippocratē mespilū genus est nascētis in Italia: ex quo facile colligit hamamelidas ei eē, quæ sunt epimelides Dioscondi. Mis q̄ eius usu mulieribus lac cieri tradidit Hippocrates. Autores sunt quanguenū cubitoꝝ altitudine in Arabia esse arbutos, similis comaro est & adrachne, quā omnes ferē Græci portulacę nomine interpretantur falsō, cum illa sit herba & adrachne uocet, unius literæ diuersitate. Theodorus apud nos arborē portulacā uocauit, ut à portulaca herba distingueret, eruditius q̄ foxlicius. Cæterę adrachne est syluestris arbor, neque in planis nascens, similis unedoni, fructu & folio cātum minore & nunq̄ decedente, præter q̄ ab imo. Cortex exciduis & scaber quide, sed qui circūgelatus uideri possit, a tristis aspectu est: q̄q; in Theophrasto nō *ῥήμας* & *μυρδύλλων*, hoc est, circūgelatum, sed *ῥήμας* & *μυρδύλλων*, hoc est, rumpentē se per ambitum, legat, q̄ & Theodorus quoq; sequit. Alij quoq; Theophrastus *φλονή*, hoc est, corticis abscissus platano & adrachne cōmune inquit est, sed lectionē Plinij ueriorē puto, quia corticē excidere huic arbori propriū nō est, sed ad alia quoq; plura pertinet: libere tamen sit æstimā-

tibus hæc iudiciū. Corticem quoq; candidū Theodorus eireddidit, quia leuē ut arbitror legebat: ego lepton, id est, squamosum scabritūq; lego, Plinij secutus. In Helicone arborem hæc Pausanias enasci tradit frequentē, etiā si andrachnū uocari credit. Magnitudo arbori nō precipua. Illud cū subere habet peculia re, detractō in orbē cortice, nō emori: q̄ ueteres Latini cingere arborem uocabāt, actione instituta cōtra eos, quia de glabrescent, & baltheū exmiserunt: arborę furtim cælas, eadē causa: qua legis Aquilię germinare cū urbana Theophrastus eā scribit: nec de urbana quālis esset inuenio, nisi q̄ minime utiq; puto, herbam intellexit portulacā. Inter biferas hæc arbor priorē fructū, incipiente pubescere uua, peragit: posteriorē hyemis iniū, siue ut Theophrastus inquit, priorē cū dulcescit uua, posteriorē cū floret. Adrachnæ usus foeminis ad opus telarium. Similis huic apharca: Plinius aparachen uocat & syluestri genere arborę, æterna frondē, Olympo mōte frequē, nec nisi simōtibz nascēta. Habet & urbana: utrunq; genus simul germinat, & ut adrachne bifera: sepiis uallis quæ utile, sed urendo q̄q; prædicat. Differet connaros & comaro, ut in paluri mentione diximus. Testandū est & illud, grāmaticos Græcos esse, qui fructum arbuti & *μυρδύλλων* uocari tradant falsō, cum *μυρδύλλων* eum dici constet: acylon uero ilig na glans sit.

AMYGDALVS. CLXXXVI.

Amygdalæ flos anteq̄ folia (q̄d ferē soli proprium inter arbores tribuū) manet ē trīco, lachryma ad nihil utilis. Proximum corpori operimentū itē summiū, simile iuglandiū, sed tenuiū, nucleō dissimili, lato calloforeq;. Mori uulpes eam pastu ferūt, utiq; si nō cōtingat ē uicino aquā lābere. Nihil æque degenerat q̄ amygdalus, ideoq; aut plātam sæpius transferri, aut adultā inferi præcipiunt. In remedio est & paxillū adigere, & lachrymā defluētē extergere, reliquo cultu omni perinde adhibito. Ex amygdalo cinerē & luxuiā probant ut acerrimam: Ad fornaces artesq; aliquas non incommodo quoq; ligno. Amygdalā eandē esse cū Græca & Thasiā Cloatius putabat. Alij Græca uidetur esse iuglās, Columella ita facit genera libro sexto, Græcę, iuglādis, amygdalæ.

AMYGDALVS DVLCIS. CLXXXVII.

Amygdalus dulcis si à pecore sit erosa, dicitur amarescere. Quemadmodum amygdala nasci scripta possunt, rei rusticę libri docent, origine à Græcis orta, quod & ad alios quoque fructus scilicet conuersum est.

PISTACEA. CLXXXVIII.

Pistacea in nucum genere habentur. L. Vitellius qui censor fuit, & hæc in Italiam primus intulit ē Syria, cum legatus in ea provincia fuisset, nouissimis Tiberij Cæsaris temporibus: mox & in Hispaniam, qui cum eo militauerat Flaccus Pompeius eques Romanus. Venetis hæc Iudaico uicofa tu feminis enata uidimus, folio maiore quā lentisci. Marem in hoc genere accipiunt, cui sub cortice uel ossi longi uidentur latere testiculi. Nicander Colophonius pistacia uocauit, & alius Nicæder phistacia: sunt qui listicia ut Possidonius. Inuenio & altascia scriptum in poetis. Athenæus autor est terminthos siue terebinthos credi solitas à nonnullis, quæ nunc Syri pistacea uulgo appellant, foliorum similitudine ut arbitror fallente.

NVX IVGLANS.

CLXXXIX.

KA' *πυρ βαυρανών*, id est, regia nux uocata, fructificat Autumno. Arbor carea Græce dicitur. Notum in ea est calliculacea regumetia toridem quot flores fuere: cōtrahi pediculo, singulisq; his singulis includi nuces: duplici munimento protectas, puluinato primū calice, mox ligneo putamine: quot modis & fortis in parente, hoc est, utriculo atq; uentre: propterea Fescenina locutionis comites & religiosi nuptis, uersimilium hic, q̄ quoddā cadēdo tri pudium faciant, elidendo uirginum puellarū clamore. Germinat hæc non cacumine, ut maxima pars arborum, sed lateribus, impulso priore pululo: qua forma & caudex totus & pregrandens rami crescūt. Hoc & auellanae faciūt, & quibus germina in foliū unum procumbunt uidelicet: quia desit iuicium, unde germen erumpat. Medulla nucis quæ in ligno ipso continetur, isca dicitur Aëio, fortē ut alia quoq; multa deprauate à Latinis id acceptū, quasi esca, quoniam pro ignario & cauterio quoque sit medicis. Mutari hanc in quercum senio nonnulli produnt. Transulere iuglandem reges ē Perside, ob id regiae nuces appellantur. Caryon uero à capitis grauedine propter olacitatem uocatum, nemo dubitat: etenim arborū ipsarū foliorumq; uires in cerebrū penetrāt, hocq; in cibis nucleisq; minori momento faciunt. Tingitur cortice eaglanæ, & capillis ruffatur. Primum prodeuntibus nucleis id cōpertum, insectis tractatu manibus, pinguescunt uetustate. Sola differētia germen in putamine duro, fragili, tenui, crasso, multo loco, simplici. Solum hoc pomū natura compacti cinxit operimento. Nangunt bifida putaminū carinæ, nucleorumq; illis quadripartita distinctio, lignea intercurfante membrana. Hæc arbor an fuerit in Italia Catonis æuo, non constat: quoniam Græcas nominat, quas quidā in genere iuglandiū seruauit. Sunt & galbæ siue caluæ, item Prenestinae ab eodē Catone dictæ, quas maxime laudat, & conditas fictilibus in terra seruari uirides meminit: postea Thasiæ & Albenfis probari cœpæ: & Tarentinae duo genera fragili putamine & duro, quæ sunt amplissimæ & minime rotundæ, quas à frangendi mora moracias & moracillas sunt qui uocēt. Præterea molluscæ putamen rumpētēs. Macrobius qui Persici uulgo dictū molluscā nucē esse putat, aperte hallucinatus est: cū is nō de Persico, sed de nuce regia & iuglande, quæ sit ē Perside cōuectā primū ad nos, molluscā intelligat: nam à quibusdā nucē Persicā uocari tradit, Suetij hominis doctissimi testimonio fretus. Thasiam quoq; nucē atq; Græcā amygdalæ eē generis, Cloatius existimat. Prenestina Macrobius candē esse cū auellana, Varronis & Neuij auctoritate meminit. Iuglans à iuuādo & glandē, siue quasi Iouis glās, literis interlitis appellat, siue quasi *λυγγίης*, id est, Diosbalanos & rheophrasti uocasse Cloaci? autor est. Sed certe Diosbalanos Castaneam Dioscoridi significat. Proinde nō parcius errauerit Nonius Marcellus, qui iuglandē pro syluestri nucē interpretatus est. Biferas iuglandes Siluaciano Patavini agri uiculo prouenire, satis constat. Fomites ab hac nuce Mnestor optimos fieri cū dixit, de iuglande uidetur intellexisse.

A V E L L A N A.

CXC.

355

NVx auellana quam Græci Heracleotica appellant, nostri Prenestina & Abellinā patriæ uocabulo: in Asiā Greciāq; uenit ē Poro, propte-

rea nūc Pōtica, nūc Heracleoticæ dicūtur, quo nomine Macrobius Castaneas intelligi falsō putat, Oppiū secutus, Pōticas sunt qui & alares nuces cognominent. Inuenio & alaria uocari arborē, unde iacula & hastæ factitari soleant. Auellanae sunt ex arbore quæ corylus dicitur: has mollis quidē tegit barba, sed putamini nucleisq; solida, rotunditas cōtra q̄ iuglandibus. Umbilicus auellanis & in uētre medio. Torrens eæ cibus. Corylus neglecta cōmeat in frutice: q̄ si quis eā minus subulter, fructū meliorē & copiosiorē ferre traditur, ut quæ naturæ suę proprietate fruticosa sit: tōderi tamē refecariq; præcipiūt, ita fruticosa reddi: alioqui si arborefcere patiat̄ur aliquis, in corpulentiam & magnitudinem alimentū omne sumptant. Florere negant hanc aliqui, sed floris uite quosdam in ea uillos erūpere: Huic simul fructus decidit: uug modo callus innascit̄, magnitudine uermis grandiusculi, pinguis, singuli pediculo compactilis: iulum uocant. Dehiscit uere ac defluit, cum folia emergunt: simili omnino sorte qua cachrys in robore, abiectis ceterisq; amantiferis. Syluestris proflus natura, quoniā hyemis patiētissima, & mōribus magna parte prouenit: nec urbana fructus magnopere q̄ indomitæ præstantior. Folium urbani magis, feratūq; ambitu, utiq; alno simile, tantum latius. Coryli alie nucē m rotūdā, alie oblongam ferunt: candidiore urbanae, meliorem in aquaticis. Translatu mitescūt syluestres. Cortex fummius tenuis, pinguis, & maculis albis uariis: materies lenta: prægraciles eius uirgæ desquamant̄, crassiores derasē interpolantur. Medulla tenuis fulsa quæ dematur.

M O R V S.

CXC.

MOro succus in carne uinosus: trini colores: candidus, mox rubēs, maturo niger. In nouissimis floret. Inter prima maturefcit & transuolat. Tingunt manus succo: matura eluunt, acerba pilum corpi folia eius in uirina madefacta detrahunt. Minimum in hac arbore ingena profecerunt, nec nominibus, nec inscriptionibus, nec alio modo quā pomū magnitudine. Mora differēbat hostiē sua & Thulclana Romæ. Auctores Greci morum in serunt castaneæ, phago, terebintho, piris syluestribus, malo, ulmo, populo quæ sit alba, unde candida nascantur mora. Nascuntur & in rubis, multum differente callo, quæ maratha nominantur ab Hippocrate: quamquam corrupta fortasse lectio est: nec *μαρὰ ἀπὸ βάλου*, sed *μαρὰ τὰ ἀπὸ βάλου* scribere oportuit. E' pomo arboris mori panchrestos stomatice, eadem arteriace appellata, pluribus modis steneget aliud oris arteriæ, uoz stomachi, iucundius remedium: Hoc est uulnera ad cicatricem perducebant. Succus siccato expressus pomo, multū saporū q̄q; obsoniorū confert, ab Hippocrate rhoon quādoq; dictū. Mora germinatione priusq; in folia exeat, sinistram manu decerpi iubet. Futura pomatincinos, siue ut quidā legūt, cyrinos Græci uocāt: q̄ terrā si nō attingere, lanquinem sicut alligati, quacūq; parte fluat: ad hoc uerū repositi. Materia utilis operibus quæ flexu consistit: Ideo furculas ex ea circosq; faciūt, ut ex caprifico q̄q; uitē nauis? tornacula, ut ex fraxino, ulmo, platano: q̄q; ē platano celeriter purefcūt. Itē aurículas liburnicis, & testudines atq; firmamētā. Mora in Aegypto & Cypro sui generis habent, ut mox dicemus. E' sicu Aegyptia & Cypria, fycaminon Græci pomum ipsum uocāt, sycaminæa & fycan, & fycen quoq;

quoq; ipsam arborem Hippocrates: Nam Aegyptia & Cypria sycomoros & sycomoros dici ferè solent. Media Comedia sycaminon vocat & pomum & arborem: sed pomum neutro, arborem masculino genere, ut apud Iulium Pollucem notatur legitur. Hippocrates morum arborem est quando sycen & moreon quoq; dicat: ubi uidelicet radicem sycen primo de femininarum incommo dis uolumine requirit, ut Galenus interpretatur. Inuenio & modon scriptum in Hippocrate pro moro, nisi fallor, culpa a librariis.

FICVS AEGYPTIA. CXCLII.

Ficus Aegyptia siue morus, quam ut Celsus ait & morosyphon appellat. Fructum hanc non caudice, sed ramis ferre quidam falsò tradunt: cum ueriores sint qui utroq; nasci prodant. Magnitudo aspectusq; pomu fici, succo tamen & sapore caprifici: sed dulcedo copiosior, sine granis inferioribus, scalpendo tantum ferreis unguibus, nec aliter maturescit: quod cum factu est, quarto die decerpitur, alio subinde argalio subnascente terro, ita aut etià septeno numerosa partu per singulas ætates, multo lacte abundante. Subnasctur etiam siue non scalpatur, quater ætate, priore impellendo forum, qui fit immaturus. Arbor nostrati moro similis folio, magnitudine, conspectu, materies inter pauca utilissima. Celsi statim uret: ficatur mersa in cilibus atque stagnis. Cum fluitare cœperit, tempestiua operibus intelligitur: ablato ita pondere ac soluta: Id probe in ueterræ signum habet: Videlicet alienus humor alium eius omnem rigando fuggit. Huic similis est que uocatur Cypria ficus in Creta: nam & ipsa trüco pomu fert & ramis, cum in crassitudinem adoleuere. Distat à superiore, quod germina emittit sine ullis folijs, radiculæ familia, cuiusq; quasi cuspidis accessu prepiatur. Caudex magnus, & populo albe proximus: foliis ulmeis. Quater germinat, quater suas ficos maturat: sed grossius in ea nunq; excoquit, nisi emissio incisura lacte. Suauitas pomu fici sed interna: Similitudine caprifici habet. Magnitudo pruni uel sorbi.

FICVS CYPRIA. CXCLIII.

De ficu Cypria dictum est in Aegypto.

FICVS.

CXCLIII.

Fico circa Elephantis agrum folia non desinit. Græci pomu sycæ & palathen quandoq; uocant, arbore uero sycen & sycada, quanq; sycada nouellam ficum ferè intelligit, ut Iulius Pollux inquit: nam ischades aridæ fici sunt, aut carice interdum. Inuenias apud Græcos ischadas recetes & ueteres quoq; dici. Comedia & iscada capreu pro sicca uidet appellasse, quæ & iscada Sophocles pro anchora est ubi acceperit. Fici pomu sycæ & palathen Atheniensibus uocatur, quasi ante alias fruges inuentu, autor est Athenæus, etià quibusdā festis præferre pompæ solitu in offis. Naxij fici ipsam melichon appellant, à quo & Liberum patrè melichon cui inuentor eius uocatur, ut Lacedæmonij sycien. Quidam gigatè m nomine Syceà Ioue persequente, in sicu à tellure conuersum fabulantur: unde in Cilicia urbi nomen fit inditū Syceæ. Sunt qui sycen, hoc est, sicu, oxyli ex Hamadrya de filiâ, ut alias quædam bores fuisse memoret. Pausanias in Attica primu editas putari tradit, Cereris munere, in memoria hospitij Phytalo donatis, quod & in monumento eius testari ueribus hexametris. Ficus ois breuifere nec procerò caudice: quæ amplissimæ quædam inueniuntur, uel piris emula magnitudine, Cor-

tex ei leuis, laciniosa folia, & cruciformia, hoc est, ut Theophrastus inquit, *σταυροειδής*: nisi quis *υγρονσπερδής* magis legendu putet: nam Hippocrates uere inquit folia sunt fico pedibus cornicis similia. Ex interiore pomu huius semine, id est, minutis in eo granis, quæ Græci *κρυπταίδια* uocant, etiam caprificus nasci dicitur à Theophrasto. Germinat sub arcibus post uer: quod tempus commune omnibus est, præsertim edomitis, ac præcipue in fico, uet, Punica. Ficus in Hircania dulcioris multo fertilioresq; ut modios ccc. xx. singulæ ferat. Externæ sunt in Italia Chalcidicæ, quarum genera plura: Item Lydiæ quæ sunt purpureæ, & mamillanæ similitudinem mammarum habent. Calistruæ parum sapore præstantiores, sed Gregorij iudicio prelatæ cæteris: has & ficus & passarias uocari Capitolinæ autore est in Clodio Albino, ficosq; omniu frigidissimæ. Inuenio plyctalia uocari quod dæ eas genus ab algore, nisi quis malit ab Atticæ regiõis insula Plyctalia. Sed an calistruæ sint, quia frigidissime dicatur, mihi parum cõstat. Nonnulli sunt qui plyctalia intelligant, quæ recentes non sint quidem, nõ tamen siccata: Africanæ ab aliquibus præferuntur, cunctis celebratæ Carthaginis excidio: & alix ab Africanis Lybicæ. Habentur & Sulcæ & Topiæ quæ dicantur. Patriæ nomen obtinent etiam Alexandrinæ, post dicendæ Candicæ Serina cognomine delicatæ. Nigra est & Rhodia & Tiburtina, præcoque. Sunt & Liuianæ, siue ut aliq; uocant, Liuiæ Pompeiæ, in usus annuos arefactæ solibus, aptissimæ cum mariscis: & quas harundineis folij macula uariare dicitur: harundineas ob id uocant, à quibusdam Alfulas. Est & Herculeana, & Albicerata, & Aratia alba, pediculo minimo, latissima. Cloaciis & asinastrâ, atram, Palusticâ, Augustam, biferâ, cucurbitanâ, leptoliam, Mariscam, Numidicâ, Pullam, Pompeianam adijcit in nomine. Sunt apud Græcos Atticæ, delatoribus inde nõ cupatis, præsertim ægildes. Sunt & Laconicæ, item Phrygiæ, item Phibææ Hippocrati. Androtrion leucérineon adiungit, quas nostri albiceratas uocant albas ficos ferentem. Addit & oporobasilidas, & celuron, & phormynio, & Megariæ: & alij toxallæ sunt, & ex insula Paro Aemoniæ uocata, nihil à Lydis distantes, colore sanguineo. Sunt & amadei & coracæ & Nicolci, & basilicæ quas & basilidas uocant. Hybernas ficos cydonicas Græci appellant. Probabatur & Zacyntho, quod & Plauti confirmat autoritas in Mercatore: item Cimolizæ. Primo autem prouenit porphyritis, longissimo pediculo: Comitatur eam & minimis & uilissimis, appellata popularis: contra nouissima sub hyeme maturatur chelidonia: hæc rubes est è nigro. Que porrò nigra ficus est, barbachytra dicitur à Græcis. Iulius Pollux chelidonias dicendo, Atticas inquit intelligimus, quas Lacedæmonie chelidonias appellabant. Sunt præterea eadem serotinæ & præcoques, biferæ, alba & nigra, cum melle maturescentes atquindeia. Serotinæ à coto appellatæ duro, hoc est, ut Macrobius, duricoræ, ex Chalcidicis trifero quarundā prouentu. Tarenti tantu prædulces nascuntur, quas uocat onas. Sunt & Sagittine relianq; quibusdā prouincijs & hibernæ sicuti Mœsiæ: nõ nata sed ingenio. In ficosæ genere caricas peculiari arbore fert Syria, & minores eius generis quæ coitana appellat. Habent & Cauniz, ominales M. Crasso in Parthos moueri. Caunig porrò sunt nam ex Carie oppidulo, unde nomen Caricis apud nos, ut cõficio d. 3. aperte,

Etum est. Sunt in fico & centrina dicti culices, fucus apum ignauia maliciaq; similes: in terimendo enim utiles & ueros culices, utiq; ipi commoriuntur: caprificatio à nostris hoc uocatur, à grecis erinafmos & sycalmos. Interim non arbor ipsa seritur, sed grossi ex ea pertusi, uel surta suspenduntur ad eundem usum. Theophrastus autor est meliores quodā loco nasci sic? sine ulla caprifici ope, quas anerinafsta prædicari uidentū uoce scribat. Caprificus tauros quālibet in domitis collo eorū circumdata, cicures & im mobiles præstare dicitur. Habetur & ficus Indica, cuius germina per ambitum radicari tradunt, neq; caudicem contingere: arbor magnitudine insigni (ut sub quatuor turmas equitum conditi affirmen: caudici crassitudo sexaginta passus. Ramorū umbra bina operiūt. Folijs Amazonice pelte amplitudo formaq; ut Solinus inquit. In Hircania tā fecunda est ficus, ut medimnos i. x. singula ferat: Est autem *μυρσιν* & modij sex Italici, utiq; Atticus: nam Ptolemaicus maior est, ut qui sequipulus sit Attico) sed exiguo pomō. Caprificus in Co insula, non bifera modo, sed trifera q; habetur. In Gallia trāspina Strabo similē fico nasci tradit arborē, fructu capitulū Corinthiacę columnę referens: cuius lacte morifero sagittas suas illinant, infamia aliās temperādū uenena, celo non pridē aboleri cœpta: eius rei nora gallijs, ut hoc forte Vergilius inrederet, cum de Cimbro Tullio, qui fratrem ueneno sustulit, in fenario locutus est: de q̄ inter odora menta diximus. GROSSI. CXCVI.

Grossulos atq; grossos greci olynthos & erine os uocant, de quibus in fico & caprifico abundare egimus. Sed grossi proprie olynthi sunt, hoc est primitiue ficus. Apud Macrobiū grossos legas ficos esse quę nunq̄ maturefunt. Alij sic distinguunt, ut ficos primo sit *ἀνθρ*, deinde pheix, postea sycon, postremo ichsa. Frondes ficus greci priuatim uocant churia. Nicander & papaueris folia sic appellat. Est & duljgen? thriō, ut aliubi notauim⁹.

LIXIVIA E' FICV. CXCVII.

Cinere m lixiuium *νεγκεν* greci appellāt: de quo dictum in ficu nobis est: asperitate insignē ex eo ligno esse, asperiorē ex amygdalo.

PERSEA CXCVIII.

Persea arborē Aethiopia & Aegyptus habent solæ. Persicum Aegypti Plinius appellare quodam loco maluit, hilarem intuitu, piro similē per omnia: semper autē folia habet & poma, subnascentibus alijs. Maturitas per etias: alio tēpore crudiuscula decerpunt ac reponūt. Magnitudo longioris piriamygdalæ putamine includitur, & corio coloris herbidi nucem intus habet, ut prunum, sed minorem multo mollioremq;. Suauitas carni prædulcis & innoctia, etiam largiorem mandentibus, concoctu & deiectu facilē, radice prægrandi. Materies longitudine, crassitudine, copia, inter cōmodissimas bonitate, firmitudine: nigrida quoq; nihil differens à

loto ea quam fabam Græci uocamus. Simulacrā ex hac & lectulos, & cibilia factitauere, nō tam decoro ligno q̄ fideli, ut quod magna ex parte sit contortū: proindeq; nauale tantum esse cœpit. Hanc aliqui rubescentibus myxis fecere similem. Persea hanc non Persicum, ut diximus, ē Perside in Aegyptum translata à regibus tradunt propter supplicia: quoniam uenenata ibi esset: q̄ eruditiores tamen constanter negant: sed à Perseo Memphisatam fatentur, & ob id Alexandrum illa coronari uictoris instituisse in honorem atrauis sui. Fortasse Theophrastus hanc intelligit, cum textilem Persicam in Aegypto plurimā, nemore Thebaico fuisse scribit: in quo & Aegyptia spina & olea & quercus habeantur, ut textilem à coronæ usu dixerit. Quidam pro cucu capiunt palmę simili, cuius folijs ad nexus & textilia utantur: & Persicā textilem uocatam putant, quia Persis in magno honore fuerit. Aliam à Persea de qua Dioscorides præfenti mentione loquitur. De Persea porro hac Columella uersus illi fortasse fuerint.

Quinetiā eiusdem gentis de nomine dicta,

Exiguo propterant mtefcere Persica mcto.

Plutarchus autor grauissimæ, Perseam arborem inter omnes Ildi gratissimam, & in Aegypto maxime celebrari tradit, quia fructum ferat cordi similem, solium uero linguæ.

HIBERIS.

CXCIX.

Hiberida siue Hiberida & Hiberiden herbā, comperit Seruilius Democrites, assignato etiam inuentioni eius senario. Nascitur maxime circa uetera monumenta parietinasq; & inculta iterum: semine ramparuo, ut aspici uix possit. Radici odor nasturtij, de quo cardamina & cardamantice, & Apollonio cardame & Hiberitis appellata est. Vfus ætate melior, & recentior tantum: Tunditur difficulter. Galenus Hiberida eandē esse cum lepidio uocata, coniicit. Carmen quoq; Democratis ipse prætexuit, ex eius libro qui Clinicus inscribitur. Multa de hac Archigenes in epistola ad Aristonē: eamq; lepidion & agriocardamō, id est syluestre nasturtiū uocauit. Vidimus hanc Venetijs specie qua describitur à Dioscoride ac Plinio. Illud adiungimus: folia ei pusilla esse, qualia nasturtio: Semen quoq; in siliquis admodum pusillis, tam exiguum, ut cernere nō liceat. Flor item pusillus & lacte candoris. Differt Hesperis ab Hiberide. Nomen uero Hesperis inuenit, non ab Hiberia, sed ab re, quoniā ut Theophrastus inquit, nocte plus oleat q̄ interdiu: contra q̄ herbas plurimæ.

HALICACABVS.

CC.

De halicacabō una stychni, hoc est solani specie, quarto uolumine differitur: ibi quæ hic in Dioscoride legūtur, repetita sunt ad uerbum ferē: quamlibet libro quarto profecunda solani specie, primo pro tertia uidet accepisse: nec halicacabū ibi hanc appellat, sed quod uerius est, hyponoticon. halicacab⁹ em̄ uera est, quæ uolumine describit.

COROLLARIUM LIBRI PRIMI FINIS.

d 4 HER.

HERMOLAI BAR-

BARI PATRITII VENETI, ET AQVILEIENSIS PATRIAR-

CHÆ, in Secundum Corollarij librum, PRAEFATIO.



ACTENVS ODORES, OLEI GENERA, VNGVENTA, ARBO-
res, earum succos, lachrymas, & fructus persecuti sumus: atq; id quāq; operosum ac perdifficile
fuit, asserbat: tamen mihi uoluptas non parum, naturam uiuesq; eius, ac per singula quæque soler-
tiam astimanti: nec certe alia commentatio certior, uitæq; hominum, cui nos omnia debemus, uti-
lior. Quæ in re ueterum industriæ ac diligentiæ per sepe recordatio subeat, quibus intentatum ni-
hil, nihil inexpertum fuerit: atq; adeo ut multis prodesse, occultatum nihil uoluerit. Tanto gra-
uiore seculi præsentis infamia, qui alijs elaborata abscondere, ac penitus obtrere contendimus: quantum insultaturi
nostris, ubi alienis bonis publicam salutem inuidemus? Qui uero hoc ingenio tam prauo sunt, uti pauca quedam, quæ
uix ipsi norint, recondant, & alienis inueniens doleant, in scitiam planè suam produunt: & quam auri atem scientia
sibi uendicant, dum alios docere fastidiunt, amittunt. Pudet me sanè atq; iterum pudet, tantum ab excogitandis no-
uis, atq; ab adiuvanda uita mores nostros abesse, ut hoc uel præcipuo studio pleriq; flagrent, ueterum aut recentium
benefacta perdendi: cum maiorum nostrorum religiosissima autoritate admoneri deberent, multos etiam de medio
cribibus inueniens decorum numero adscribentium. Sed & multorum laus ac gloria, qui nostra tempestate florere, de-
terrere præpostera hæc ingenia poterant, qui uigilando, querendo, laborando omnia in medium protulere. Ceterum
hactenus, ne insectatio hæc esse uideatur: Nunc ipsam etiam naturā haud sanè hæc parte minore spectabimus. Quan-
tum enim illa mari polleat, quantum rursus terra, dum mella, lac, pinguis, fruges, olera, atq; inter hæc etiam quæ acrida
censeantur, gignit, non sine admiratione leges, & quando hactenus hanc partem Græci prope sibi uendicant, habe-
ant per me & nostri homines, quæ Latina à nobis facta non admodum fortasse negligant.

HERMOLAI BARBARI PA-

TRITII VENETI ET AQVILEIENSIS PATRIAR-

CHÆ, COROLLARIJ LIBER II.

ERINACEVS MARINVS.

CCI.

170



RINACEVS MARI-
nus, quem Græci *ἐρινάκιον* appellāt, alius piscis
est ab eo, qui *ἐρινάκιον*, hoc
est remora siue remeligo
dicitur, adhæres nauibus,
& medio mari cursus earū
impediens, palmari crassi-
tudine, pedali, semipedali
ue amplitudine, magnæ li-
maci similis, ody nolyō appellatus à quibusdā, quia
partus grauidis adalligatus, resoluat in uenteras sa-
le. Alij & muricis genus quoddam hoc nomine potē-
tia accipiūt: at echino id est erinaceo spinæ pro pe-
dibus sunt, quibus uoluitur in orbē, ne caliter ingre-
ditur: itaq; detritis sæpe aculeis inueniuntur. Ex hoc
genere appellamus echinometras, & Iulius Pollux
metras, quibus spinæ longissimæ calicesq; minimi:
negō omnibus idem color uitreus. Circa Toronē can-
didi capiūtur, spinā parua. Oua omnium amara, qui-
na numero, nec nisi per hyemē atq; plenilunijs. Ora
in medio corpore in terram uersa. Tradunt scuitiam
maris prælagire eos, quoties correptis operiuntur la-
pillis. Echinos aliqui & patangas nominant: Sed Ari-
stoteles tria eius genera dinumerat: ouarios, qui &
mandantur: patangas, & bryssos. Haberi & fluuiati-
les echinos Paulus Aegineta prodidit.

ERINACEVS TERRESTRIS CCIJ.

171

ERINACEVS TERRESTRIS id est *ἐρινάκιον*, & de-
nominatur *ἐρινάκιον*, wallatus est aculeis extra quæ ore pe-

dibusq; ac parte inferiore, quam rara tantum, & in-
no cūa lanugine operit: ubi uenantem sentire, conuol-
uuntur in pilā, ne quid apprehendi possit præter acu-
leos. In desperatione urinā reddunt tabificā, spinis, &
tergori, propter quod petuntur: ideoq; artis est uena-
ri eos exinanito prius lotio: capti aquæ calidæ asper-
su resoluuntur, & suspensi, posteriorum pedum alte-
ro, ne cantur inedia. Hac cute uestes expoliuntur. Cl-
bos sibi præparat in tēpus: etenim uolutatus supra
poma iacentia spinis affixa, unum non amplius te-
nens, portat in cauas arbores. Idem mutatiōes aqui-
lonis in austrum prænuntiat, condens se cubili. Ech-
inus Græcis uas æreum significat, in quod testimo-
nia coniecta signabātur. Sed & scēni partem, & ollæ
genus? item muliebris ornamenti non dissimile omni-
no brachialibus, & armillis. Pollux autor. Dicitur
& in castaneis echini: eos tamen Latine qui erinace-
os uocant, non inuenio.

HIPPOCAMPVS.

CCIIJ.

PVRPVRÆ.

CCIIJ.

PVRPURÆ à Græcis *πρῶπος* nuncupant: hinc ipsas
q; uestes purpureas uocamus: autor est Theo-
pompos tanti quondā pretij fuisse, ut æquali
argento penderentur. Nemo ignorat ostrea: quod-
dam genus esse purpuræ: idq; sanies eius quæ testis
detractis colligeretur, ostrū, ut Vitruuius inquit, ap-
pellata est. Ostrea porro, inquit Galenus, penultima
correpta & producta differunt: producta genus est
Aristoteli ad omnia testacea, ut per diphthongum q
scribantur, *ὀστρεα* uidelicet: correpta uero, species est
eius

172

elus una, quibus respondere apud nos quidam uolunt conchā per χ , & concam per c: sed autores ipsi sunt, nec præter ipsos alius. Athenæus ueteres per α diphthongum proferre solitos affirmat, nec aliter locutos Cratinū, & Archilochum: Platone m correpta: sed placet Galeni ex Aristotelis autoritate distinctio. Porphyrides ex auium sunt genere, à porphyriionibus diuersæ: sicut ab utroq; lathiporphyrides siue adiporphyrides, & latiporphyreæ. Illud obiter nota uelim, porphyriones à nobis uisus esse in agro Patauiino, allatos ex Hispania, quos ibi telamones uocant: siue quia statuz uiriles, quibus mutili & coronæ sustinentur ita nominantur: siue quasi thalamorum & pudicitie custodes. Etenim scribit Athenæus uoluerē hanc sensum a dulterij habere, ac significare id patrifamilias, in cuius domo alitur: non uoce quidem aut omnino aliter, q̄ suspensio: nisi quis telamones quasi nutriculas esse dictos putet: ita enim Græci altrices uocant. Porphyriion similis est tetrax appellatus, ut Athenæo placet, gallos gallinaceos uincens magnitudine: uox grauis. Caro si mādatur, strutionis sapore. Pendit ei ex auribus utring cartilagine atq; cristæ, ut in gallo gallinaceo. Epicharmus & Alexander certe Myndius, qui uersu scripsit, pusillum uolucrem hoc nomine intelligunt: Tetrax inquit auicula est à uoce dicta, quam oua pariens emittit. Plumis color macularum forde uariis perpetuisq; lineis: magnitudine spermologi eius, quam nos spicilegam siue frugilegam uocare possumus: quamquā frugilega nomen generis est, ita uictum quærentis apud Aristotelem. Rura ipsum passerulum uocāt spicilegā, dericta modo priore syllaba. Ab eodem autore scolo pax attagenis colore tradit, gallinaceo generi per similis, quā Theodorus gallinaginē, uernaculā uocem secutus (ita enim uulgo nominat) interpretatus est:

B VCCINA. CCV.

Buccina à Græcis *κίπινδ* dicuntur. Muricum nomen generalius esse uideo q̄ buccini, utpote quod & purpuram quoq; comprehendat. Illud notare libet, cerycas à nostris uerbum ex uerbo, buccina cōuersos esse, q̄ *κίπινδ* idem sit quod præco: quanq̄ & à cera, quam mucro simile attritu mutuo saluant, cognominari posse uideātur: quod Græci *κίπινδ* dicunt. Muricum generis sunt inquit Plinius, & quæ uocant Græci colycia, alij corycia, turbinate æque sed minora multo, efficaciora etiam, & oris halitum custodientia. Athenæus hæc non muricum fed chamarum generibus contribuit, easq; in Macedonia *καρυκίς* dici, Athenis *κίπινδ*, in cætera Græcia tracheas hoc est asperas uocari prodit, quod & Plinius ferē secutus alibi uidetur.

IONIA. CCVI.

Ionia sunt qui florem esse credant eum, quē purpuræ, ut Aristoteles scribit, habent, & buccina, & quā Democrito *κίπινδ* & *κίπινδ* dicat. Alia nigrum, aliaquod rarius est, rubentem, medium inter papauerulum & ceruiculam, ut Athenæus testatur. Est autem papauerulum in buccino pars eius ima esculenta: quanq̄ omnis callus pinne & conchylij interior papauer quoq; dicitur, ut idem autor scriptum reliquit. Est & in polypo qui & polyps dicitur, & anosteros suum papauer: ea pars uidelicet, quæ supra uentrem eius folliculi specie conspicitur, liquore plenus, non atro ut in sepia, fed rubente. Ego in Dioscoride non ionia, sed cionia, hoc est uerbum & uerbo

columellā lego: ita scriptum in exemplaribus aliquot inuenias. Est & uasculi generis cionion siue cion, quonimine in hodiernum usq; diem utuntur capponæ: hoc columnas à nostris ex interpretatione Græca uocitatum putes: unde apud iuris peritos columnarij: quanq̄ non columnarium, sed columbarium non fortasse pronuntiandum sit: instrumenti genus ita nominatur Vitruuo, ad aquam hauriendā per tympana, etiam si à colluue colluuiarium sunt qui legant: in q̄ illud mihi occurrit, columbarium non à columbis, sed à Græco uerbo quasi colymbarium uenisse: quādo Græci *κολυμβή* & colymbistas uocant, quod nos urinare, & urinatores dicimus. Vrinatoriū ergo uas quo uidelicet aut uinum promitur, aut aqua, columbariū à ueteribus dictū existimare possumus: alioqui & columbæ ab hoc ipso uerbi Græci significatu appellantur. Quid si columnarium apud iuris peritos pro mensa lapidea, quæ cartibum & cartibulū quoq; dicebatur, accipias de qua M. Varro: Altera inquit uenaria mensa erat lapidea, quadrata, oblonga una columella uocabatur cartibulum, in qua uasa ponerentur ænea.

MITULI

CCVII.

Mituli Græci myas & myacas appellāt. Hippocrates scaphidas. In harenosis sponte nascitur & proveniunt. Quidā prius his genus faciunt eorū, qui proprie myes dicantur: quoq; proprietates sit congregari muricū modo, & uiuere in algosis: ij muruo attritu lentore cuiusdā ceræ melicerā uocatum saluant. Gratissimi autumnio sunt, & ubi multa dulcis aqua miscetur mari: ob id in Aegypto cōmēta datissimi. Procedente hyeme amaritudinem coloremq; rubrum contrahunt. Degenerāt, ut Athenæus & Plinius testatur, in duas species, in myias id est mitulas, & mitulos. Mitulifalem uirusq; recipiunt: muricæ, siue ut in exemplaribus quibudā Plinius legi- tur, myice, differunt rotunditate, minores aliquanto atq; hirtæ, tenuioribus testis, carne diuiores. Laudatur apud Græcos Ephesi. Est & piscis musce Pontico, commendatus ab Athenæo. Plautus in Rudente nominat quidē musculos: Captamus inquit echinos, lapadas, ostreas, balanos, urticā marinam, musculos. De mitulis intelligat, an de pisce mure, iudicent legētes. In Aristotele myfocetus piscis à Theodoro musculus conuertitur.

TELLINAE.

CCVIII.

Qui tellinas interpretantur in Martiali poeta mitulos, im proprie locutos arbitror: cum aliud genus esse mitulos, aliud tellinas Dioscoridis autoritate constat. Athenæus certe mitulos à Romanis uocari eas uidetur existimasse. Sunt qui tellinas, & ctenia id est pectunculos idem esse iudicent, à celeritate crescenti nominatas, *τενέλαιες* ταινέλαιες, hoc est ocyssime perficiuntur, quod Aristoteles tam peccūculis q̄ purpuris tribuit commune: anno enim magnitudinē totā implent. Plinius certe medicinas quæ hic de tellinis redduntur, ad uetbum ferē pectunculis ascripsit. Tellinas ad Canopū in Aegypto frequentes esse narrāt, quæ tenuiores exilioresq; basilicas, hoc est regias appellant: his dulciores esse fluuiatiles & Nilo. Romæ circumferuntur pusille quædā conchule, quas qui uendūt, tellinas predicāt. Hæ uulgaribus conchis minores & leuiiores sunt, & candidæ, nec striatæ: quas Veneti piscatores à capparis similitudine, capparoculas appellant.

CHA.

CHAMAE

CCIX.

Chamæ à Græcis *χάμαι*, species sunt concharū. Aliud in mari uidet piscis esse genus chamæ, quas hiaculas quidā interpretatur, habentes uulua, sicut & qui erythini hoc est rubelliones dicuntur: nisi si quis ita distinguendum puer, quod & Aristotelis præ se ferūt codices, ut chamæ hiaculæ interpretentur: chamæ autē concharū speciem agnoscat. Chamæ duo redduntur genera, tracheæ hoc est asperæ, mali fucci: quas & ostrea cognominat, & in Macedonia corycos, & Arhenis crios, ut in murice diximus: alræ: lēues multo meliores, & crassiores, ob id & pelorides & pelorinæ à quibusdā & basilicæ uocantur, & ab Helio sparriano liostrea, etiāsi lithostrea mendose legeretur, esset hic de cōchis, siue quod idē est, ostreis & conchylis tractādū locus, sed copia deterror. Sufficiat primatum gula huic generi datū esse, adagio inde nato: Cōchylia uiduaz cupediz, ut est apud Sophronē mimographū, & Phalaræum Demetriū. Nec illud prætermisso, conchæ genus, ex qua margaritæ uniones q̄ uellantur, berberion & berberia incolis uocatum esse, pinnæ aut pectunculī effigie: nisi q̄ nec auriculas habet ut pectūculus, nec operculū exterius sculpturis ullis asperum, sed lēue: Coloris quoq; nomen in conchylū, & chliarconchylum, & concha Aegyptia, paralis cognomine, quā & pinnā uocat Democritus. Idem chrylocōchylum fieri docet, sed fictitium & metallicum, sicut & chrylocorallū, quod itē & gemmæ est nomen.

VNGVIS ODORATVS. CCX.

Onyx Græce dicitur, quod nos unguem odoratum uocamus: ostraciū nonnulli appellant siue ostracē. Galenus poma hoc est cauum, siue quod idē est, operculū, etiā in purpuris. Onycem uero Paulus testā uocari dicit conchylī duntaxat Indici, quod & cōdylion appellat. Condylos certe ostraci genus est eidē Paulo, ut alios præterea. Vngues uocatur & quos solenas græci dicūt, eos deniq; donacas & aulos, Theodorus modo ungues, modo digitos appellat, in utroq; Pliniū secutus: hinc & piscaiores ostræarum solinistæ nominabātur, ut Athenæo placuit. Er a mpulla unguenti onyx quādoq; dicitur Porphyrio grammatico.

COCHLEAE TERRESTRES. CCXI.

Cochleā & limacē Græci cochlian & cochlion appellant: nam cochlos & cochlax marinos calculos significat. Est & cochlos apud Aristotelem animal testaceum, & aliud q̄ limaces, à Theodoro dictū umbilicus: hoc & cochlian est ubi Aristoteles appellet: sicut limacē quoq; cochlon. Nobilitas precipua solitanis, à patria itē Balearicis, quas in spe luncis nascentes, cauaticas nominant. Atracnis duplex genus, nudas & testatūq; quibus magna fecunditas: sicut illyricis amplitudo: nam Sicule commendantur quadiu parue sunt: quia magnitudo duras facit, auferitq; succum. Laudant & Capreæ insulis. Præterea sunt quæ albæ siue albulæ dicuntur in Reatino agro, item q̄ aceratæ latæq; multifariā nascentes: itē minutæ. Iam aliz in usu sunt, aliz cibis dānatæ. Cochleæ uiuaria nepotibus piscis fure, sapa & farre alijsq; rebus alendo eas, tanto successū, ut singulārū calix quadrantes lxxx. caperet. In Aegypti Nilo grandissimæ feruntur, uocales, ululantū expressa similitudine. Salua cochleæ quæ punctis a cu uel stilo carnibus manat, à græcis, ut Galenus inq̄, *μύξα*

dicūt, hoc est mucosus lētor siue mucor, mucus uē. Limacē Teucer ad exemplū quæstionis ludicræ ita finit: Animal sine pedib; sine spinis, sine ossibus, crustatum, oculos nunc exerēs, nunc retrahens. Cicero terrigenā, herbigradā, domiporā, sanguine cassam, Inuenio limacis genus colaliā ab Aristotele uocari, & aliud abrotonē: quanq̄ sunt qui locustam putent: Item qui apem: alij qui piratā in eo uocabulo intelligant. Strabo cochleas prædicat Linusias, ab agro cui nomen Lino est iuxta Pityuntē, medio inter Paria nam coloniam & Priapum spatio.

CANCRL

CCXII.

Cancer Græce *καρκίνος*: mirabile cōtra mortuum canis rabidi remediū, præsertim ut Aesculion parabat, qui popularis & præceptor Galeno fuit: urens eos æstare in parella uiuos lub canis ortū, cum sol in Leonē transisset, non nisi xviii. Luna. Pelops medicus idē q̄ Galeni doctor, qui rerū omniū causas & effectū scire proficebatur, hanc cācorum uim in canis morū, qualitatē corporis ac materię, non proprietati naturæ tribuebat: Nec ferē quisquā est, qui cum sequatur.

SCORPIVS TERRESTRIS CCXIII.

Scorpionum duo summa genera ferē tradūtur, terrestres & marini: sed Pausanias uidisse prodit & uolucres pinnatosq; ut, locustæ sunt, & Phrygia in Ioniam translato.

SCORPIVS MARINVS. CCXIII.

Scorpionum alij pelagij sunt, atq; alto mari capiuntur: alij palustres, ac cœnosi potius: præsertim sapore pelagij, quos & rufos colore prædicant, cum alteri sinu subatri, Aristoteles & scorpidas nominat: nec constat pro diuerso an pro eodem genere acciperet. Scorpiana certe, ut Athenæo placet, euidenter à scorpione differt.

DRACO MARINVS.

CCXV.

Adictum est huic dracōm generi marinū, ut à terrestribus Aethiopiz distinguerent: qui ut inquit Aëtius, nō ueneno sed dēnibus, quos similes aprignis habent, opprimunt: colore enim uno, sed alij ruffo, alij cinereo, alij nigro: præterea iubarum umbra recti, prominentibus ē mēto barbulis, ore uasto, lingua præpenti.

SCOLOPENDRA MARINA. CCXVI.

Scolopendra marina dicitur, quoniā & terrestris sit, ut possit liquebri. Dioforides ophiocetenam quoq; nominat: aut scolopendrā, aut uermem scolopendræ similē accipiens, libro huius operis extremo: Emorsus inquit à scolopendra, siue ophiocetena, locus ambitu colluiscit.

TORPEDO.

CCXVII.

Torpedo à græcis dicta nartæ, nomen utraq; lingua ex argumento inuenit, quod etiā ē longinquo, aut si hasta uirga uē attingatur, quamuis præualidos lacertos torpescere, quamlibet ueloces ad cursum pedes alligari faciat. Est & turpæna piscis maritimus, à quo cerati quoddam genus ad duricias emolliēdas appellatū est à medicis, ut est apud Paulū.

VIPERA.

CCXVIII.

Vipera echis & echidine à Græcis uocata: sed prior mas, sequēs scemina est: hec colore sufflato, multis macularum capillamentis cernui magnitudine cubitali, aliquādo etiā palmorum terminū utiq; si nō sit Indica, quippe quā cubitorū nouē & dodratis à se uisam Nearchus & Strabo prædicat.

Cauda

Cauda uiperæ non paulatim gracilefcence, fed uniuerfum, & proinus afpera & fine carne oculi fubrubent, caput latifcens, ceruix anguftior. Aluus prominula, meatus ad extrema caudæ: inceffus quieti proximus: dentes canini quatuor. Contra mari anguftius caput, ceruix craffior, corpus uniuerfum tenuius & procerius: meatu fuperiore uentris parte feftinatus: dentes canini duo, rotidemq; uulnera. Horis feptem, fumptu die tertia conficiunt uiperæ. Sunt qui difpadas à uipera non diftinguant: nifi qd difpades falſa loca incolunt, unde fiat ut caro earū falſa quoq; ſentiat, alienaq; ſint medicæ, uehementiffimam ſitum afferens uentribus, & inde nomen: quales in Africa plurimæ naſcuntur: Nullæ in Italia propter cœli ſoliti molliem. Hoc ſe Galenus Romæ ab ijs qui ſerpentes uenant, Marſiſi dicuntur, accepiffe ſcribit, nec tamem omnino credere. Cubicales eſſe perhibentur, craſſitudine, in gracilitatem ſe minuente, nigris & ruſſendis interpunctis maculis, anguftiore q; uiperarum capite. Dioſcorides etiam præterea uocari eas uoluit. Solinus diſtinguit: Percuſſus inquit diſtenditur, & corporulentia enormi diſſilit. De uipera, ut conſtat, theriaci paſſilli ſunt: qui cum ad modū conficiantur, alio loco indicabimus. Viperam Italia modo aut non habet, aut non agnoſcit: quanquam ſunt qui Marſos angues, ut inquit Euſtathius, & ut uulgus ipſum modo uocat, maraſos, pro uiperis accipiat: ita paſſum uocantibus Hiſpaniſis: ex quibus qui ſunt minus atri, aſpides rubibus dicuntur. Aſpidum uero tria genera: Chelidoni ab hitundinum colore, iuxta ripas a mniū, ſed Nil præcipue uerſantur, paulo cubitalibus maiores: Secundum genus cheſſæ, hoc eſt terreſtre, ſub uindicta ſeræ aut cineris colore, cubito quinquid. Maiores iſſus ſunt pyades quibus idolor, ſed & auro q; proximus. Intra horas omnes conficiunt celeris, chelidoniæ: tardius, pyades: mas binos ictus, ſœmina quatuorſus relinquit. Pyadem fuiſſe, quam Cleopatra ſibi ad mortem, Galenus auctor. Hæc ceruicem exporrigens, meitur ex interuallo, quem feriat. Solinus Hypnalem dicit appellari, nec tamen ſomno, qua uitam ſibi Cleopatra inuidit. Aſpidas in Aegypto Nicander: ſunt qui ſerunt alias dorantes, quæ cicuiſ interimant: alias etiam paſſum iuſtum longas.

SENECTA SERPENTIS. CCXIX.

Senectus anguina, Græce *γῆρας ὄφιως*, à Catone ſpellis anguina dicitur, coriū anguis à Palladio, leberis ab Hippocrate. Inuitat me ſerpentiū natura, ut præter ſupradictas de generibus earum reliquis, quatenus ad Dioſcoridis extremum uolumen attinget, breuiſſime attingā. Hæmorrhoides & hæmorrhoids, à ſanguinis effectu nominantur, qui toto corpore percuſſis eſſe uideantur, hæc ſœmina eſt. Vtriq; colos arenaeus: magnitudo palmarum: trium, craſſitudine paulatim in tenuitate deſcendente. Inceſſu tardus & directus ſerpunt, ruſſus ut quidā ſcribit pedibus. Maculæ per totas multæ, partim atræ, partim cæcidæ, ſquamis afperæ: ob id ingreditibus ſtrepitu ſeſe produunt. Fœmina in aluum iacet ſerpendo, meatuq; uerſus caudā inferiore ſitu continet: mas autē uerſus aluum habet, ceruicemq; ſerpēdo porrigit. Fœmina perniciōſior, ut ex cuius ictu dentes, gingiue, unguesq; decidant. Colore ſabuli uiſuntur & ammodi, maxillæ uiperæ latioꝝ, cui & ſimilis eſt, uiperæ uiperæ color ſubſulvus: hps & cenchrias nominat.

Aëtius, cubitales eos deſcribens, nigris maculis, cauda ſuperiore parte ſciſſa & prædura: unde nomen inquit cenchria, ut cenchriam potius q̃ cenchriā putē legendum: nam cenchrites, ſue cenchrinus, ſue caneros, aliud ſerpentis genus eſt, quod & acontion, & acontem, & acontia aſpidem, hoc eſt iaculum uocant aliqui, ut idem uoluit Aëtius, longitudine cubitorum binum, in exilitate ſtagitiata, uiride præſertim ſub aluum, ut milio (cum recens eius ſeges eſt) uideatur perſimile, robuſtum: Præterea ſe iaculi ſpecie propiſſis infectumq; ſalut. Era ſiſtratus epat, colom, ueſica, affici eorum ſcribit quos cenchrinus peremerit. Arenæ colore, & ceraſtæ magnitudo cubiti unius, ſummumq; duorum: ſquarola cauda, binis in capite corniculis, ſue quadragenis, ut Solino placuit, ſquamis uero in uerſum quandam ſub alio conditis, eo fieri ut crepitum ſibi lo non diſſimilem ſerpendo edant. Inceſſu obliquo: nono die interficit. Dryinā à quercubus dicuntur, qd in radicibus earum, ut Galenus inquit, uiuant in Helleſponto copioſi, odore terroꝝ, qui & eos prode, ſi quis aggrediat, eos perimere: olfactu mutantur: nec alterius rei odorem præterea ſentire perhibent. Qui uero ſupergreditur imprudens, cura tumefcere, eutem pedibus abſcedere, manus quoq; ipſas curantem eodem modo periclitari: amplius de blebitalis, præpingue corpus, munim loricatumq; ſquamis duriffimis, in quibus accipientes muſcæ laticant, quæ ipſum animal conficiunt. Amphibæna ſimilis eſt ſcytale, tereti & aequali corpore, uti ne caput utra parte ſit, cognoſci poſſit. Amphibæna etiam biceps eſt, ut inquit Galenus, & utraq; parte ingreditur, unde nomen. Cæterum nec amphibæna, ut Aëtius exiſtimat, interficit, nec ſcytale, præterquam chalcidica, eandem afferens quā uiperæ perniciem. Scytale tanta uarietate fulget terroꝝ, ut notatum gratia moreretur obuioſ. Prima poſit exuuias, Hydros ſue natix primum in terra uit, & cheſy dros appellatur: deinde in aqua: ſimilis eſt aſpidi puſillæ, præterquam ceruicem latam non habet, ut aſpides. Nominatur ab Aëtio & parous, in Syria proueniens, modo aris colore, modo nigricās. Item ſpathiutos apud Chalcidem, ut aſtrudine in exilitate procumbens, lato capite: ſed neutrum genus inferre mortē. Ab eodem autore pelias & elapsa produnt, ſed quia noti ſunt, deſcriptione inquit non indigent. Elapsa & Solino dicitur: ſit & chamædraconum mentio, ſed omnium ſine dubio peſtilentiſſimum eſt animal, quod à triplici frontis apice quaſi alba micula & planæ regio inſigni, baſiliſcus appellatur, palmarum ternum longitudine, ſiſſiſſimus, exacuto capite, cuius uel ſibulum animantes nullæ perferunt, præter muſtelam, à qua uincitur: auditus conſpectusq; momento perimit. Quicquid morſu eius occiditur, ipſum etiam extinctum iacentemq; nullū attingit animal. Vultus ab eo factum, ut inquit Eraſiſtratus, aureo colore obductum. Ex iſſis quas dixi peſtibus alias eſſe ſurdas, alias haberi cæcas, quæ præterea typhlini hoc eſt cæcis uocant. Prouidentia nature factum eſſe dicerē, niſi facile reſponderi poſſet ab imperitis, melius conſulturam fuiſſe omnino, non peperiffe, quā ſi captas oculis & auribus, peperiffet. Ita eſt: leges naturæ dicimus eadem facilitate qua contemnimus: atq; utinā accuſare mala ſatis eſſe: odimus & bonā. Uſu certe cōperi haud temere alios naturæ taxatores eſſe, q̃ ſub uia iſta placet, impu-

impunitatem conqueſtione redimentibus. Sed hæc alterius curæ ſunt: illud obire ad monendi ſunt leſtores, ea quæ de ſerpentibus à neotericiſ dicuntur, præſertim quæ Arabibus, & eorum principe, (ita enim modo ſcholæ uocant, & Galeno quoque præterunt, ſi diſplicet) uſugadeo negligenter & ſordide mandata eſſe literis, ita mendacijs haberi plena, ut non dico infantiffimi, ſed planè omni reſ uſu uacui fuiſſe uideantur.

LEPVS MARINVS. CCXX.

Lepus marinus, Græcè λεπὺς βαλιδός, & animal puſillum, odore tetro, inter lolligines ſerè uerſatur, quibus & ſimilis eſſe dicitur. Venenum id eſt alijs cibo, alijs potu, alijs contuitu: Siquidem grauidæ ſi ſœminâ ex eo genere aſperxerint, cõfeſtim nauſea & redundatione ſtomachi uitii ſatentur, ac deinde abortû faciunt. Remedio eſſe marè tradunt induratum ſale, ut in brachialibus cum habeat. Eadè peſtis in altro uel tactu ſolo nocet. Veſcitur eo unum tantû animal, ut non increat, mulus piſcis, & tenere ſciunt de inſegratori uilioribus ſit. Homines quibus in paſtu fuerit, piſcem olent, moriunturq; totidem diebus, quot lepus uixerit: omnino incerti temporis ueneficium id affirmant. In India uiuentem capinegât, in uicemq; illi hominè pro ueneno eſſe, ac digito quoq; in mari tactum emori: eſſe autè à pliorè multo, quemadmodû reliqua orbis eius animalia.

LEPVS TERRESTRIS. CCXXI.

Lepus terreſtris, Græcè λεπὺς, & λεπὺς χερσίδος, & à ſtupore atq; metu λεπὺς, & ab dormiendi habitu λεπὺς, & Nicandro: lagides quoque Strabo eos uocauit: dictus, ut Varro putat, non quaſi le-nipes, ſed quæ Aeoles Bœotiq; lepore uocaret: ita. Genus lepore triplex, italicum, Gallicum ſive alpinû, qui totum candidi: niuè eſt ante algoribus, qualiqueſcente rutilè ſcunt, raroq; Româ perferuntur. Adapis nomine Hiſpanû, quos ut Polybius eſt autor, appellamus cuniculos: quoru foetus uentre exectos, aut ab uberibus ablatos, gratiſſimo cibo laurices appellât. Strabo leberidas à quibusdâ appellari tradit ipſos cuniculos, quæ effectu lepores græorychiæ hoc eſt foliores ab ipſo cognominantur. Ariſtoteles & Iulius Polux lepore etiâ daſypoden uocari tradunt. Alij diſtingunt daſypoden à lepore. Inuenio & chelidoniam cognominatû, genus quoddâ lepore à Diphilo. Sûnt qui Pliniû accuſent quæ lepore aliû à daſypode uideat habuiſſe: nec intelligunt, genus quidè unû ambobus eſſe, ſed diſcriminis tamen aliquid inter eos notari poſſe. Nam illud quæ à Plinio dictum uidetur, eſſe lepori coagulû inutile, daſypodi præcipuû, lectionem arbitror corruptâ, ut in annotatiõibus libri undecimi docuimus. Nec illud tamen inſicias eundè eſſe, confundi ſæpe nomina, ut & lepore pro daſypode, & cõtrâ pro lepore daſypode lepores appellare uideat. Dioſcorides certe lepore, nec aliter uocare ſolet opere toto. Apud nos certe lepores montani diſſerunt à campeſtribus, in Tridentinis & Vicentinis alpinis frequètes, nigritia, magnitudine, ſerocia, denſiore pilo à cæteris diſtincti. De lepore proverbium dictû eſt, λεπὺς ἄνθρωπος, hoc eſt: lepus es, & pulpamentû quæris: uſurpatum à Terentio.

PASTINACA PISCIS. CCXXII.

Pſtinaca piſcis, Græcè ψαρίδιον, turturis appellatione dicitur. Hæc quæ momorderit, ſi ſigatur in arbore, quæna maxime, liberari qui ſit percuſſus, arborem ſicceſcere a uotore ſunt, ut meminit Aë-

tius. Paſtinaca dicitur & inſectigenus, quod ab Aſtroteleſtaphlinus appellatur, uerucilli magnitudine.

SEPIAE.

CCXXIII.

Sepias Græci *sepias* uocant, & lolligines *sepias*, de quibus Matro Græcus poëta cecinit. Solos piſcium cognoscere, quid arrii, quid albi ſit. Diſſerunt lolligines à ſepijs toto genere, quanq; & amicitia & ſimilitudine conueniunt. Eſt & teuthos magnitudine inſignis, quia loca ſerè diſſert à teuthide, ut teuthos lolligo, teuthis lolliguncula dici uere poſſit. Atramentum lolligini ſuppallidum, nigrû ſæpiæ. Inuenio & libigenus teuthida hoc eſt lolliguncula à græcis uocatû. Thebani ridetur à comicis, qui ſepiam opitolicam, gallum gallinacum orthalicò, ſicus tyca, harundines cotladas nòminant.

MVLVS PISCIS. CCXXIII.

Mulum, Græci *mulum* uocant, hoc eſt barbatû, uocant dictum ita, quoniâ ter anno pariat. Prætertur ex Ionîa. Eſt ab hoc diuerſus qui trigolas appellatur, itè qui myllos, de quo inter ſalſamenta in omotaricho diſſerui. Mulum piſcè Proſerpinæ, item Dianæ ſacrum fecere Græci, ut cicaton Apollini, Mercurio bocas, Libero patri citrullû, apud Veneri, Neptuno pompiliû.

HIPPOPOTAMVS.

CCXXV.

Equum fluuiale *hippopotamus* Græci appellant. Sanguine utuntur pictores. Geminus, ut crocodilo uictus: ſuper Saiticâ præfecturâ in Aegyptio plurimus, in India quoque Onelicitrus eſt autor, amne Indo. Celebratur in uentione ſanguinis trahendi.

FIBER.

CCXXVI.

Fiber quæ Græci *fibra* uocant, ab extrema hõra, ut Varroni placet, uocatur, quoniâ dextra & ſiniſtra huminis maxime uideri ſolet: & antiqui fibrum, inquit, dicebant extremû: unde ſagis fibræ, & fibræ in auribus & iccore. Diſſert à lura fiber ſola cauda, cætero pilus utriusq; pluma mollior. Dicta uero lura eſt, quæ ſe in aquis lutet: ob id Græci eam *lura* uidentur appellare Theodoros, qui tamè lutrum non lura conuertit. Plinius enhydrinda ſerpentis nomen eſſe maluit, ut aquatilis colubri. Varro quoque non lura à luendo, ſed lytra tradit, quoniâ ſuccidat diſſoluaturq; in ripis arboris radices. Cæteræ teſtes lutre comitialibus prodeſſe docent experimenta, ut appareat cum fibro communi lura proprietatè eſſe. Plinius è genere inquit fibrorum lutris, led nuſq; mari accipimus mergi. Archigenes iuſtû uolumè de caſtroſq; utilitatibus conſcripſit. Plurimus hic in Ponto, morſumq; hominè non prius dimittit, q̃ oſſa fracta concrepent, ut Solinus inquit. Naſcuntur & in Hiſpaniæ fluminibus caſtores, ut inquit Strabo: cæteræ non in eſt uis illa medica ut in Põticis. Caſtorè porrò dictû, quæ ſe caſtrent, ea ſe corporis parte redimentes propter quæ expectantur, & Ponitum eſſe canè, Seruus Honoratus prodidit: nam qui canis marinus dicitur, piſcis eſt, & longe à canè Pontico diuerſus. Eſt autem marinus canis etiâ carmine Homeri celebris, cuius fruſta Romæ thuriani pulmenti nomine uendebantur tribus obolis in libras Rutilij Ruſſi ætate, qui reſ geſta Populi Romani ſcripſit. Hoc & à Plinio comes Thurianus, ut ego quidè primus cõperit eſſe ſuſpicor, appellatus eſt, forte à Thurij oppido Italiæ, quod primum è Sicilia ſit conuectus. Athenæus & Thurionè ſive Thurſionè dici obſoniû hoc Latine lingua ſoliti affirmat, ſuauiſſimumq; id ac laudatiſſimum fuiſſe.

Strabo

Strabo galeotem hunc & xiphiam uocari tradit, & quemadmodum capiatu offendit: Dictū & scyllā, & lamiam, & carchariam quog; arbitror à nonnullis, quē nos uulgo sturionem appellamus: aut quod uerius existimandū est, ab eo quasi delicato & cupediario piscis nomen accepisse. Notandum Aristoteli aliud quodāmodo sed affine tū genus uideri scyllā, & canem marīnū: Nam scillarus apud eū pro squilla parua sumitur. Nec illud omittendū, phocanam apud eum dici, qui Latine tursio uertatur à Theodoro Gaza siue tursio, aut torsio ut Plinius: delphino similis, paulo tristior, & rostris canalicula: similitudine malleficus. Hunc puto esse quē ab Athenæo modo thurionē, modo thursionē, modo thurianū pulmentum uocari dixim⁹, à Strabone galeotem & xiphiam, ab alijs canem marīnū, aut si nō idē omīno sunt pisces, quod & ratio nōnulla suadet, certe similes fate ri eos necesse est. Sunt qui Græce hyscam, siue hycam, hoc est porculū pro sturione capiāt. Mentionē hycæ penes eundē Athenæū legas & Callimachū, qui eū piscē sacrū uocauit. Aliud uidet⁹ genus esse ab hycæ, id quod ὕλην uocat, q̄ sit ut Athenæo placet, id eū apro siue capro: ut archestrato, diuersum, qui suē marinā psammīnē, alijs psammatica cognomināt: nam oppidū Siciliæ qd̄ Hycara uocat, ab hycæ multitudinē cognominatū putāt. Cyrenæi certe hūc nō hycæ sed erythrīnū, hoc est, quasi rubellionē appellabāt. Sunt tamen qui & pisces iuli dā uocatos, hycas nominēt, & Philetæ uersum

ὅστις ὕλην ἔχει τὸν ἄνθρωπον, & ἰσχυρῶς,

sic interpretentur, quia difficile sit eos capere: propterea & uermes quos intestina terræ dicimus, & Græci γῆν ὕλην & ἰσλός, à nostris uulgarī uoce porceliones appellantur. Numerius & hyænam piscem cōnumerat: qui an idem sit cū aliquo ex prædictis, in incerto est mihi. Est & terrestres quadrupes hyæna, quod cōstat. Inter pisces & syagris à sue dicta potest uideri: q̄q̄ inuenio quandoq; scriptū synagris. Diphi lus & caprisca dici quenda significat, qui & mys uocetur, nisi quis non mys, id est, murem, sed ὕλην, id est, suem legendum potius existimet: sunt enim & mures in piscibus, quemadmodum & inter ostrea.

MVSTELLA. CCXXVII.

164. **M**ustella uulgaris quā Græci καλὴν καὶ ἀνδρόνικον appellant. RANA. CCXXVIII.

165. **R**ana Græci fluuiatilē & marinā prædicāt etiam mū pro pisce, βατράχιν & poetica uoce βατράχιν uocat, ut Iones, quod & apud Aristophanem & Xenophanē poetas legi. Batrachion & chy mistæ suū habent, excelsis in aurī cōfectione miraculi, ex putrilagine diuini laticis nascentē, specie ranunculi uenēnū præfensissimū, quod uel solo halitu minus prudentes opprimat: hoc ab effectu chryscolia quoq; dicit. Est & morbi genus batrachos, tumētibus sub lingua uenis, cui similem fortasse Plinius uigefimifexti uoluntinis initio monstrauit, tūbentis sub lingua duritie. Inter ranas est & quæ ὀφθαλμοῖς Græce dicitur, hoc est, rubeta, quia in uenibus uiuat: q̄q̄ prius in aquis, postea sit terrestris: Pernicio la hæc ut chersydros, grauiſſima cunctas: magnitudo testudinis parua: geminis quādoq; ueluti corniculis, ut inquit Plinius, dorsum exasperat: instatq; se brata, cā procerue audeat, ut insiliat q̄q; proximi: q̄q; suspitio se frequentius quam morsu uindictas: Buffo

inde ut arbitror à Vergilio & uulgo dicta, ueneficiorum plena, præcipue ossiculis duobus: quorum in sinistro latere inuentum ἀφρονος uocatur, quia canum impetus cohibeat. Recentiores lapidem in capite huius ranæ haberi tradūt, quē ad dolores illū gestatu probēt, sed q̄ uisua ea sit exēptus, quales uulgo magna etiā copia feritur anulīs: q̄q̄ hūc elici poti⁹ q̄ eximi uiuentibus cōstat, puniceo in panno: cutis plurimū colore delectantur: ita dī ipsi feriando relaxant se, capitis onus deponūt: id mox in subiecta cistam ē medio foramine collabit: alioq; ea est alijs inuidissima natura, ut lapidē eū, nisi tollerēt, resorbere. Huic aliq̄ & cauda initio est, quā post amittit: ob id in stagnis cum adhuc pusilla sunt, mutili ruribus uocātur. Alter⁹ genus & hoc exitiale calamites dicitur, q̄ arundinetis fruticibusq; roris linctū uictians, sine uoce, oīm⁹q; minimā & uiridissima: quæ si forte à bubus hauriatur, distendit eas. Hanc & dryopetē uocari credimus à Plinio, q̄a inter frutices & arbores uiſatur. Est & genus uocalis parua, scādētis arbores. Inuenio & palustrē mutā inter uenena, hoc est helio batrachion, diuersā à phryno, qm̄ & signa & medicinæ uariant, præsertim Actio. Aristoteles ranas cōmunēs telmatæos aut lymanæos, hoc est lutarias & lacustres noīat. Varro luridā ranā dicendo, pro calamite uidetur accepisse, qm̄ psilothrum sit, ut Plinius idem⁹ Varro affirmāt: illud efficaciſsimū: q̄q; epitheton ranæ: omnīū putāt id poetæ. Miror q̄obrem Dioscorides phrynon hoc est rubetam λέγειν q̄ est lēuis, cognominari dixerit: nisi q̄s rubetæ duo gēia cōstituat, lēuis & sine cornibus ex qua delibutorii uenēnū, sicut ex palustri q̄q; muta conditur: & aspera comutata, quæ proprie sit buffo, cuius dorsum paulo ante scabrit esse diximus, ex Aëtij sententia. Habet & βατράχιν λευκὴν hoc est piscatrix rana, sed inter pisces, Aristoteli, Ciceroni, Plinio.

SILVRVS. CCXXIX.

Silurus piscis est fluuiatilis, q̄ alibi q̄ in Nilo nascitur. Aëtius siluarion ut puto uocauit hunc: cuius felle suffusos oculos inungi, cum Attico melle, præcipit bobus. Aristoteles uidet silurū intelligere Theodoro, cum glanim piscem nominat.

SMARIDE S. CCXXX.

D smaride, siue qd̄ idem est, maride, in se quērit mētionē dicit. Illud in trāscursu nō silebit, maruda genus etiā mēsurē dici apud Aristoteli, quæ, ut inquit Iulius Pollux, heminas sex capit.

MAENAE. CCXXXI.

Mænæ Græci μαινιδας appellāt, laudatissimas ē Lipara, uulgos mænulas. Aleculā quasi ex Plauto theodor⁹ interpretat. Ego aleculæ uocabulū generale cōde, idem apud nos significās, qd̄ apud Græcos anthracides, ut in halme demōstrabimus. In Pannonia pisciculū quē mænapij & Belgæ ceteri copiosissimē uenāt, & inuenerāt, arengā uocantes, ipsi alecē hodie quoq; nomināt. Similes inter se uulpe Scupissimus esse mænās, boacas & smaridas: cādidiores nēpe mænās. Sūt qui boacas siue boēas appellēt, hoc est, leucomenidas: smarides uero siue marides sunt quas nōnulli uocat cynoseuma, ut inquit Athenæus. Aristophanes Byzantius, sed solus, nō boacas, sed boopas uocādos existimabat: quia paruī eēt & magnos oculos haberēt: Miror unde Theodor⁹ ceteros interpretet quos Græci smaridas appellāt. Sunt quidē gerres Plinio Martiali quoq; inter uiles,

uiles, ut illo uerū: Fuisse gerres aut inuitiles manas.

Odor impudicus surci fatabat.

Sed diuerfos à smaridibus, ut in castigatione Pliniana diximus, trigemosecundo libro.

G O B I V S. CCXXXII.

Gobius & gobio uocatur & Græce *γυβίη*. Plinius quoque per scribit non per g, secūdo & trigesimo uolumine. Præfertur nigro candidus, deterrimus omnium est, qui utridis appellatur, etiam migrandissimus, quem Diphilus cauline dici testis est. Gobios laxatiles sunt qui cotonas dici putent. Siculi certe gobium nō aliter quā cothonem vocabant. Sunt & fluuiatiles quidam gobii.

O M O T A R I C H O S. CCXXXIII.

187

Morax & e thynno, falsa caro dicit, thunnina uulgo. Paulus tarichō siue tarichos, hoc est, salamentū. Differt autē à salamento salgama, ut ex Columella facile colligitur. Salamenta Græci duorum generū fecere, horæa & thūnia: in horæo quod à tempestiuitate uidetur appellatum, macra pinguibus: in altero macris pinguia præferri, que cybia dicitur: inter macra sunt, ut inter pinguia cordylæ. Horæa ex pelamyde, id est, lutaria minore fieri: thūnia ex maioribus, quas aliqui synodontidas appellant. Aliud genus uidetur qui synodontes uocantur & à nostris denices. Similis est pelamydibus & qui triton siue chelidonias uocatur: nam chelidon aliud genus est, polypo, ut inquit Diphilus simile. Adiciamus obiter & pro uerbiū quod fertur: Salamentum putre, cunilam bubilam de siderat. Item & illud: Salamenta simul ignem uidere, cocta esse. Crates salamentum celebrat elephantinon a se uocatum, cuius & Aristophanes meminert, sicut omotarichon Alexis. Inuenio & hemitarichon, & quod ab hoc planē differt, hemineron: Vtrūq; salamenti genus est, sed hemineron ē coracino, quē Alexandrini hemineron appellant. Dicitur & peltes & siperda coracinus, & à nonnullis Aeolias. Meotide stagno cōmen datissimus: quanquā alius piscis est Aeolias Epicharmus: nam & siperda Photion pro apua in ueterata & hardidiniibus infixa, capit. Item pro succida & larido, quod Paphlagones inquit iōdem quoq; appellāt. Laudantur in salamentis Delcani, à delcano amne dicti, quos aliqui leptinios & lebianos cognomināt. Item mylli, quos & platistacos & plastacos nominant, utiq; maiusculos: sed cū parui sunt, gnotridia, sicut media ætate myllos: sunt tñ qui platistacos & platæces eosdē esse cū coracinis putāt. Inter salamēta pretiosa est & quod spondylos uocatur. Athenæus certē id quod in capite mugilū echinata specie conspici, spondyliū dici meminit. Itē est ubi & ipsum horæi salamenti spondyli cōmēdari scribat. Sextiana siue Gaditana ex orcy no quæ clides & clidia, hoc est, ex eo iugulidicuntur, quemadmodū ex antaceis uocatis maxillæ, palatæq;. Antaceis nomē uidet amnis de disse in Meotim lacū Asiatica parte influēs. Magnitudine sunt delphinis pares, & ipso Cimmerij Bosphoro gelu fodiuntur plerūq; nullis ossibus spinisq;, ut Herodo, placet. In Borythene copiosius, carne prædulci, ut ait Plinius. Ex orcy no sunt & melandryæ: sed & pubes eius roeasalem accipit, admodumq; pinguis est. Pamphilius melandryn genus thynni grandissimum esse statuit. Diphilus pisces quosdam salamentarios uocauit costas. Aetate nostra Græci piscem hyscam, de quo supra dixi, tribus nominibus in ueterat: rhachin

partem eius dorsuam & spinalem uocātes, quam nostrum uulgo schinalem corrupte appellat: pleuram, id est, costas & latera: hypocoelion, id est, aluū eius atque pubem. Hunc piscem, ut testati sumus, Italia sturionem modo uocat.

G A R V M. CCXXXIII.

Garus & garum dicitur à garo pisce, ex quo olim cōficiabatur: postea ex scombro pisce. Laudatissimū in finibus Carthaginis Spartariæ catarijs, quod garū sciorq; appellabatur: singulis milibus nummū permutatibus congios pene binos: nec liquor ferē ullus præter unguenta maiore in pretio erat. Scombri quidem Mauritaniam Beticæq; Carthæ ex Oceano intrantes capiebantur, ad nihil aliud utiles. Græci optimū garū genus putant quod hæmation hoc est sanguiculū appellant, ex intestinis thynni cum branchijs sanie ac cruore. Garū & Clazomenem, & Pompeios, & Leptin nobilitauit. Viciū huius est alex imperfcta: nec collata fex, neutro dītaxat genere, ut Plinius atq; Flaccus & primus omnium Plautus efferunt: siquidem & Græci liquamē uocant id, quod purissimum ex eo fluxit: Id autem quod fecit instat in cophino (ita enim uocant) obmanit, alex: unde liquimarij dicantur: Quomodo etiā pro liquore accipitur promiscuū gregarij pisciū, ut iam ad ostrea, echinos, urticas, cammaros, mulos, iocionora pertinet. Cammari sunt quos Græci quoq; cammaros appellant, itemq; astacos. Est ubi alexem uero galeculam sexminio genere ueteres appellant, minutum uilemq; pisciculū, ut est apud Catonē atq; Plautum. Columella riualet nominat alexculam inter pisciculos, & incrementi parui fluuios animalia. De hac uoce quid sentiremus, in mæna & halme diximus. Cœpit uero garum & priuatim ex inutili pisciculo, minimoq; confici. Apuam nostrī, aphyen Græci uocant: quia nō alio principio ferē q̄ ex pluuia nascatur, quasi dysphyes, ob id apulus Theodorus, nūc apuas conuertit. Eundem a phritida quoq; nomināt, & gonon thalassion, quoniam ex spuma tantū marina coalescat: q̄q; aphyarum multa genera notantur, sed a phritis omnium præstantissima est, quam & a phron & aphyran quoq; uocant. Quæ uero inter has alba est, cibotis appellatur. Meretriculas Athenis fuisse quasdam legitimas aphyas cognominatas, quia graciles & candidæ, magnos habent oculos. Græci phalericas maxime probabant aphyas. Foroiulienfes ex pisce quem lupum uocant ipsi garum faciunt. Creuerunt deinde ad infinitum genera: nam & ad colorem mulsi ueteris fiebat, tam dilutæ suauitatis, ut bibi posset. Aliud uero ad castimoniarum superfectionem etiam sacris ludæis dictatum, ex piscibus squama carentibus. Garus Latinum non habet nomen, ut Aufonius poeta auctor est, qui & liquorem sociorum uocauit: Nec sentio cum quibūdam, qui Aufonium poetam uidel dicere quod non dicit, quasi sociorum garum appellauerit antiquitas, ut Græcum nomen garum Latini nominis, hoc est sociorum accessione mollesceret: ita ut quasi Græci uideri desinert. Nō hoc Aufonius intelligit, sed illud: Malle se, inquit, uocare muriam, cum scientissimi uertum & uocabula Græca fastidientes Latinum in garū appellatione non habeant. Sed quocūq; inquit, nomine liquor iste sociorum uocetur,

Iam patinas implebo meas ut parcior ille, Maiorum mensis a purarum succus inundet.

Men

Mendosus erat locus, nam & pro in gari appellatione legebatur ignari: & pro apuaz, apalaria: Vtrunq; lectio non ueræ legitimæq; restitui. Differt porro garæ à muria & alece, q; garæ ex extis scombrî, & quondâ gari piscis fiebat: muria ex thynno ferè Antipolim thuriâ, inde uero & Dalmatiam nobilitans: quanq; muria siue muries Catoni, Palladio, Columellâ, non liquamen ex piscibus, sed falsilaginem factitiam ad caleos condiendos uihâq; significat. Erat & sua uetustali muries, ut inquit apud Festum Vetrus, certis præscriptisq; rebus condita, ut quæ ritualis esset, & ad religionis quæstia ceremonias. De alece supra dictum est. Habetur & halme dicta, Latine falsugo & falsilago apud Dioscoridē & Pliniū: quanq; in mendendi usu falsugo hæc à muria nihil distat. Habetur & αλάξω, hoc est, ramentum quoddam salis acque spuma, cuius mentionem apud Latinos in Plinio tætum cõperî. Habet & oxhalmè appellata, q; ex aceto & sale fiat: nam gari genus acidi oxigazæ appellatum, ipso nomine significat. Columella oxigazæ mo reti genus facit, & oxiporæ quoq; dici posse uult: rationē eius cõdendi totius operis sine reddit. Videf id nominis habere, quia cū usus exigit, aceto garoq; diluif. Sunt & sua medicis oxypora, sicut & hydrogari, & cenogara, & elæogara: alioqui elæogaron & feruli genus erat delicat, quod Sybariticum missum in cœnis appellabant: quoniam Sybaritæ quo anno id ganee inuenissent, perijissent: autore Spartiano. Inuenio & oxilparon genus esse iuris, in quo raizæ ac cæteri eius naturæ pisces mandi soleant. Isicia quid sint, nemo igitur notat: sed è piscibus inuenisse primus traditur Heligabalus, inter ganeos potius quàm Romanos principes dicendus.

PISCES SAXATILES. CCXXXV.

Saxatiles Græci uocant petros, quos saxosum mare nutrit, ut merulæ, turdi, elepherides, melanurizæ: tria enim sunt piscij marini genera siue litoralis. Limosa regio planum piscem educat, ut solem, rhumbum, passerem. Harenofungites pelagium, ut auratam & dentem: saxosum litus, saxatilem: inter quos principatus gulæ scaro, deinde turdo, ac merulæ: post hos, iulides, phycides, & percidæ, hoc est, percæ, laudantur ab Ætoliâ. Iulidas Theodorus in Aristotele conuertit iuliam, Diphilus phycidas & phycenas, quasi genera duo, sed uicinâ tamen inter saxatiles enumerat. Porro contra rari saxatilibus uident, quos Hippocrates planetas & cymatophlegas, hoc est, erones & fluctuagos appellat.

CIMICES LECTI. CCXXXVI.

Cimices lectarios Græci cores clinicos appellat, ad differentiam syluestriū, in maluaq; nascentium, ut arbitror. Aduersantur aspidibus cimices, adeo ut gallinas, quo die hoc animal ederint, interfici ab illis negencontrâ cimicibus scolopendra, ut quæ suffitu necet eos.

ONOS.

CCXXXVII.

Onos Latine millepeda, cẽtipeda multipedæ dicitur: Græci & onifcon & ulon quoq; uocant: Galenus & cyamon à fabe similitudine, fuscum colore. Photion & iulum dici credidit: sed iulum uermis terreus est potius, quem lumbricum uocamus. Athenæus sequor. Pilosa hæc & arcuatim repens. Aliud genus multipedæ habetur, quæ non arcuatur, seps uocata, & scolopẽdra minor, quæ perniciosa quoq; est: de hac paulo post tractabitur. Illud

meminisse oportet, onon & millepedam uocari & quoddâ locustæ genus, ut dicitur. Onifcon & piscis est, quem nos asellum dicimus, duos in capite lapillos, & cor in uentre habens solus omnium, hunc Græci etiam banchon & chellaren siue gallarian appellant. Est & mugilis genus unum cognomento banchos, id uidelicet quod ab Aristotele chelones dicitur omnium minimi. Porro non desunt quintier pisces onon ab onifco dirimant: onon, & gadon uocantes, onifcon uero gallarian siue galleridam atq; maximam onias scari genus est. Sunt enim scari alij onizæ, alij æoli cognominati. Onifcos porro Hippocrati uulnerarium instrumentum est, ad luxa corporum. Aëtius onifcon marinum ad uicia iteranerorum commendat: piscem intelligat an uermem, non satis scio.

BLATTAE.

CCXXXVIII.

Blattas Græci dicunt silphas, ridendo cuiusdam errore, qui silphiophoron Cyrenis agri, hoc est, ut Catullus inquit, laserpiterifera, à blattis cognominatum ratus, blattiferum conuertit in Strabone. In his pinguiudo quædam est, capi te auulso, quæ celerime transiit in uermiculum. Plura earum genera, mollium & quod mylæcon appel lauere, quoniam circum molas ferè uisatur, foras se quam mylacidra nominat Aristophanes. Tertium genus odoris tædio inuisum, & ex acuta clune fastidiehdum.

MARINVS PVLMO.

CCXXXIX.

Marinus pulmo pneumon thalassios Græcis uocatur: pulmo etiam pleumon dicitur Attice.

PVLMONES ANIMALVM. CCXL.

Pvlmones equini, suilli, & ursini, cæterorumq; animalantiū, ex Dioscoridis instituto referendi erant. In his, quâdo nihil erat scitu admodum dignum, ad diuersicula multæ lectionis uenimus, quæ nec inutilia nec iniucunda futura sint lectoribus. Sui igitur Græci hyem uocant, & syn & hyn: aliquando thytem, quod à suillo pecore antiqui principium immolandi sumperint. Laudentem porcellum, qui & subgrumus est, Græci orthagorifcon uocat: quia matutinis uenales essent: sed communiori uoce lae thenon: agnum ammon, & ama, & amon, & rhenâ Hippocrates. Agnam amnada & amnida: hircum, tragon, & Aegyptia uoce murem: ursum arcton, arcon: ue: arietem uruecem: ue crion & ctilon, præcipue sectarium: uulpec, lampurim & alopeca: est & uolucres animal & piscis hoc nomine. Græci certè alopecis uocabulo in medicina quandoq; intelligunt carunculas masculares eas, quæ utriusq; lumbos animalis quasi uestiunt, quas Hippocrates pŷyas, Aristoteles pro lumbis ipsis pŷsoas & pŷseas: Hieronymus pŷyas pro renibus accepit: alij neurometras uocant. Earum porro cava inanitates & partium, cibos nominant & lagonas, nos illa: unde lagonoponos, qui sit dolor ilium, alius quàm qui laterum dolor appellatur, hoc est pleuritis. Vulgus eam partem Græca uoce sed luxata inuerŷa significat, non lagonem dicendo, sed galonem. Dicta uero illa existimo à tenuitate, quæ ea pars imbecilla, subleŷta, inanis, & flaccida sit, ob id & ceneones item lagonis uocatos, Athenæus autor diligentissimus affirmat: nam & lagana & ar tolagana hinc nomē habuere, quasi lagana. Porro inna & illa graciŷis est pellicula, ut Festus prodidit: unde

illa crediderim fuisse nominata, quâdoquidē tenuiora quoque intestina, quę in homine atque uel lactes proprie uocantur, ut Plinio placet, illas ueteres appellauerunt. Theodoros certe Gaza lactes interpretatur pro eo, quod Græci mesenterion appellant: nec quem sit autorem in ea re secutus, uideo. Ileos certe morbi genus est, ita Græce dictus: nec arbitrator aut illas aut illa hinc esse deriuata. Ina quidem Græcis & neruiū & uim significat. Dicitur fus à Græcis etiam χυρ, hoc est, porcus: nam porcata est quæ semel peperit, scrophæ quæ sæpius. Mulieres inquit Varro nostræ nutrices maxime, naturam quæ fœminæ sunt, appellant porcum: & Græci eadem significatione choeron, siue ut Athenæus inquit, delphaca: unde qui fratres sunt, adelphi nominantur, hoc est, uterini. Porro delphax porcus est adulus atque mafculus, ut grāmaticus Aristophanes existimat: χυρ uero dum adhuc tener est: alij contrā uolunt. Hippocrates usum carnis ē choero damnat, cum ē siue, hoc est vir, commendat. Certē delphax & pro fœmina fœ capitur quandoque à poetis, sicut & choeros quoque apud Iones. Opimas siue Græci quidam sunt qui petalidas & larinas cognominant: alterum nomen à uittulis deriuatum est, quos illi petalos appellat, ubi parula habere cornua cœpere: alterum à bubus, quos ē pastoris nomine Larinos uocabant, siue à Larina Epiri uicula: siue à Græco uerbo faginam significat. Dicitur fus & ueres, & cum excusctus est, malis: ut in gallis gallinacis capi: & in equino genere cantheri, quia feminis usu careant. Nam canthellos Græci pro seignibus accipiunt atque tardis: ab afinorum similitudine, quos canthonas appellat, à clitelis, quas carchæles uocat. VVLPIVS PVLMO. CCXLII.

IECV R.

CCXLII.

A Sinum Græci uocant ἰκνῆρ: iecur, hepar per e longam, cui ē aspirant. Fetus alinus in Phrygia & Lycaonia onagros appellatur, prout multo nascitur. Haberi & piscem ferunt qui à iecore dicatur hepar & hepatus, qui selle caret, in capite lapillos duos habet offere colore, sed rhumbi forma: hinc Eubulus: Rebaris inquit carere bili me: nec mecum aliter quàm cum hepato pisce loquebaris. Hunc phagro & rubellioni similem Speusippus facit. Atchestrato lebias uocatur. Inter saxatiles à Diocle ponitur. Color ei niger ab Aristotele tribuitur: oculi maiores quàm pro corpore. Cor triangulum atque candidum. Et hæc dixisse in transitu si nihil officit.

GENITALE CERVI. CCXLIII.

Genitale cerui & cervi ὄστρον Græci appellant. Lydi genitale ipsum acylon uocant, ut in fago diximus. Est & piscis nomen ædæon, quod & nos genitale nuncupamus marinum, à nonnullis halefurion Græce dictum: quanquam halefurion sunt qui pro callionymo pisce capiant.

VNGVES ASINI. CCXLIII.

Vngues Græci onychas & hoplas uocat. LICHNEN EQVI. CCXLV.

In equo lichen & hippomanes haberi solent. Lichenus est, dētibus caninis simillimū, in genibus & sup. ungulas animalis eius agnascēs hippomanes uero tantæ in ueneficia uires sunt, ut affusum gris mixturæ, equæ Olympiæ ad motos amores equos ad tabiem coitus infumulet. Est & herbæ genus hippo-

manes Hesiōdo, quod & Seruius testatur. Nomē hoc & Dioscorides duabus herbis tribuit, ut post constabit. Sunt & limi arbor: lichenesa appellari. Est & herbalichen uocata. Græci & impetiginem lichenas uocant. Hippon Græci equum: Celtæ, qui Brenno ducē Græciā inuaserē, marcā uocant, autore Paulania.

VNGVLAE CAPRARVM. CCXLVI.

CApra Græce uocatur αῖς: quarum syluestres atque feras in Samothrace nasci Varro scribit, platycerotas uocatas: quem locum in autore illo deprauatum omnibus exemplaribus corrigendum monemus: non enim platycerotas, sed Latine rotas legitur, ubiq; seculis conuenientibus. Capras à carpēdo dictas idem Varro scripsit. Has & chimaræ Græci uocant, & chimaron, & enorcham Theophrastus, qui sit caper: quoniam idem Varro caprum dici proprie uult, qui sit excastratus.

IECVR CAPRINVM. CCXLVII.

IECVR HIRCINVM. CCXLVIII.

IECVR APRINVM. CCXLIX.

Aprum Græci capron uocant & syagron. Siculi aschedoron, ut est apud Aeschylū. Poetæ item clunim, ut in Truculento Plauti clunim pecus legēdum censēam, chluninum: Nam & Aristoteles suem fegē chlunim uocat. Suillum præfertur omni fœci Aëtio: si quis inquit, animal id arida siccitate pauerit, quod genus Græci sycoton appellant: unde ortum putat, ut imperitum uulgus omnia iocinora uocare placita cœperit. Sanè ut meminit Aristoteles, suē præcipue alunt & opimant ficus, & cicer.

IECVR ET DENS

CANIS. CCL.

Canem Græci κύνῆρ uocant: poetæ, acamythion: rabiosum, ἀνερῶν.

CORI VM. CCLI.

Corium ē calceo Græci cattyra & cassyma uocant: nostri ueteramentū & ueteramentarios artifices appellant, quos Græci paleungos: Sicut ueteramēta quoque ipsa palimpega & palindoria. Hinc & ueteratores fortasse dicti, à consueudis fraudibus: Nam & apud Græcos cattyra sutellā dolum significat: Nam alutarij sunt qui ex aluta, hoc est, concinnato corio, pellicium opus faciunt: unde alutamentum ut ueteramentum. Pelliones quoque ab his differunt: sed hæc instituti huius non sunt. Corium certē pecudis fuscillata uir prædicant ut propterea utilissimum sit ad eos, qui uirgis cæsi fuerint. Pelles certē Chalcedonia in Hippocrate habenam mollem, Cornelio significat.

IECVR MERGI. CCLII.

Mergum æthyrium Græci uocant, & poetæ dypten: alioqui nihil aliud est dypten verbum ex uerbo, quam mergus. Poetæ Græcietiam Polgas, & bungas dicunt aues eas. Phōtion autor.

GALLINACEVS. CCLIII.

Gallos gallinaceos alectryonas & alecstoras Græci uocant, quia nos à lecto exuissent galinas uero alecstoridas & ornichas. Aristophanes alecstoras qui mares sint alectriænas quæ fœminæ: alectriænas utrumque continere ludens in comœdiā monstrauit. Inuenias & pro maribus alecstoridas accē-

acceptos, ut inquit Athenæus. Alexarchus Cassandri Macedonũ regis frater, is qui Vranopolim condidit, gallum gallinaceũ orthochoa uocabat, cõfictio nomine, in quo uel ambitiosissimus fuisse dicitur. Athenæus pullos gallinaceos à Græcis hippos, hoc est quasi equulos uocari scribit: credo, quia pulli propriè sunt equorum. Dicitur et pullastra: sed et iuba et capilli Græci alectoridas appellant. Persæ etiam coruos hoc nomine significant. Iure gallinaceorũ perũctos, pãtheræ leonesq; non attingunt, præcipue si et allium fuerit incoctum. Si gallinarum membra auro liquefcenti misceantur, cõsumunt illud in se: ita hoc uenenum auri est. Intestina gallinarum cum rebus alijs incoctis, ueteres gigleria uocabant. Gallinarum tria genera, cõtiales et uillaticas, siue quod idem est, cortalis, de quibus medicina hoc loco habetur: ite rusticula mansuetas, ac feræ non dissimiles uillaticis, au cupio quæstias. Varro Africanis similes aspectu ac facie incontaminata scripsit, à quibus per productionem uocabuli Gallinaria insula uocatur in mari Thulico Ligutico: uel cõtra Intemilium et Albingaunum. Gallinæ Africanæ sunt grãdes, uariæ, gibberæ, meleagrides appellatæ à Græcis, ut Varro putat. Columella Numidicas easdem quibusdam esse cum Africanis tradidit: Africanas uero non meleagrides, sed ijs similes, nisi quod rutilam cristam capite gerũt, quorum utrumq; sit in meleagride coruleum. Clytus Aristorelis discipulus, meleagrides gallinæ descensib; nostratis magnitudine, paruo capite, ad portionem corpõris, et glabro, crista carnea sed rotunda et prædura, quæ paxillum modò promineat, colore ligni: à ore ad mallas carunculam pro mento esse, sed rubriorem quàm gallinaceo generi: Etenim mentum uocari carnem, quàm gallinæ in rostro habent: hoc meleagrides carent. Rostrum acutius et maius quàm gallinæ, ceruix breuior et crassior atq; nigra: corpus uarium maculis in nigro candidis, frequentibus per intervalla, maioribus laticula, soleæ figura, uel orbiculis ut alæ: serata specie, digestis in quendã uertum maculis lucenibus. Crura sine calcaribus, cætero similia gallinaceis. Mares à feminis internosci aegre possunt, tam est in specie germanitas. Pullos suos uel ut per os alie negluntinam Medicæ à Media quàm Medicæ generi uillatico ascriptæ sunt: propter magnitudinem in Italiã translatae, cuiusmodi Patavinæ modo sunt, Puluerariæ cognominatæ à uico, ubi grandissimæ aspectabiles maxime nascuntur, quas Turcæ rex is, qui Cõstantinopolim ætate nostra cõcepit ui, muneris magni loco à senatu missas habuit. Ad pugillatum atq; prælia Græci è Bœotia Tanagricas, item Rhodias, ut Athenæus et Columella Martialis apud nos, nec minus Chalcedicas et Medicas probauerunt. Quidã Alexandrinas ex Aegypto, Pausanias Bœoticarum duo genera describit, alteræ præliare, alterum cossyphos quasi merulas appellans. Magnas inquit alit Lydia, sed colore coracino: ealcaris apæx anemonæ floris macula modo rubent. In rostro fumio, et in caudâ item summa candida. Ex omnibus generibus cortales feminae propriè appellantur gallinæ: mares galli: seminares, qui capiti hoc nomine uocant, cum sunt castrati. Gallinas Græci quandoq; uocant in comœdia mylacidras: quanquàm Aristophanes ita appellat bestidiam inter molas nascentem. Adrianus siue Adriaticas gallinas Chrysippius exiguas intelligit, easq; ab Atheniensibus expetitas commemorat. At-

stoteles quoq; paruos uos corpore, sed feroces, et quæ pullos plerumq; suos opprimat. Gallinas primi feruntur habuisse Persæ, ut meleagrides Actoli: et pauos siue quod idem est, paoues, Samos insula, quos Greci quoq; taos et taonas bifariam, ut nos, appellant: Et Antiphon orator aues uarias. Attici taos, circumflectentes et inspirantes ultimæ, pronuntiant, ut Athenæo placet.

O V M.

CCLIII.

O Vum Græci *ὄνυμ* uocant, cognomētis distinguitur, tenerum siue liquidum, siue ut Cornelius molle, et *παλὸν* Græci uocant, quod recentiores elixum et semicoctum interpretantur: *ὄνυμ* hoc est durum, quod ita sit coctum ut indurefcat. Sorbilia dicuntur id est *σφοδρά*, quæcunq; tantum incaluerunt: quæ uero plus coquuntur, appellant *ἰσπὰ*. Sunt et quæ *ῥέμντα*, hoc est tremula dicuntur, optime alentia, etiã si facilius transeunt sorbilia. Sed hæc alij aliter cognominant: et quantum consilio, tenera et tremula sunt eadem, sicut et sciera et hephtha. Habentur et quæ reganista à patellis et fartagine dicuntur, succi determi. Mala sunt et *ὀνιθῆρα*, hoc est tosta cinere: ideo *ῥῆς* anteponunt quæ Græci exapheta siue pnictha nominant, hoc est, quæ in aquam calidam mittuntur immergunturq; cum gero, uino et oleo, coquenda lento igni, ac modice coagulanda, ut inquit Paulus. Nam et quoddam obsonanda carnis genus pnicthi ipsi uocant, quod e quidem reor haud multum distare ab eo, quod anabraxum appellat. Sunt et quæ uulgo dici solent a taricha, id est oua salia in ueterataq; abdicandi usus. Nunc oua piscium salita in offas aut in pastillos durata, inclusaq; membranulis, *ῥα τὰ ῥῆα* dicuntur, inter lautissimos recepta cibos. Preferri uolunt omnibus ex gallina, ut Paulus inquit, ac ferè Galenus item ex phasianis, perdicibus. Pessima dicunt anserina: quanquàm proprietate illa cõmendentur, quasi promptum ingenium faciãt, si quis crebro utatur cum butyro et melle. Schista quoq; oua Plinius appellat tota lutea, quæ triuo incubata tolluntur: causa nominis ut arbitror, quia diuidant, et dicescat uitellus à candido. Firmitas putaminis tãta est ouo, ut recta nec uinec pondere ullo frangat, nec nisi paululũ inflexa rotunditate. Putamẽ in aceto maceratore molliet. Candidũ ex ijs, siue ut Columella inquit, albũ liquor, siue ut Palladius albor oui, admixtũ calci uis, glutinat uitri fragmenta. Vis uero tanta est, ut lignũ perfunctum ouo non ardeat, ac ne uestis quidẽ cõtracta adurat. Luteũ et uitellus oui dicit, quem Græci modo lecythum, modo chryon uocat, Hippocrates etiã chloron. Oua quæ nō sint recetia, ueteres appellabāt requieta. Est et uasculi genus ouũ, ab ouali specie, sicut et quod oosyphion Græci uocat. Sed et ipsum coelũ à ueteribus ouũ dicit soliti, et hominẽ quoq; ceu quandam coeli parũ imaginẽ cõpertas.

CICA DAE.

CCLV.

C Icada *κίκαδα* à Græcis dicunt, quo nomine coci quoq; et absurdi et impertiti dicebant: sicut elegantes et urbani Megones: à quo facietas et sales, et quæ scōmata Græci uocat, Mæsonia cognominant. De Mæsone Athenæus Chrysippius inquit ex i stimasse falsò à uerbo Græco deriuari nomen id, mãducũ et helluonẽ significante. Cæteræ Megarensis homo quidã Mæson fuit comœdiarũ actor, qui et seruari et cocos personas, et eam primus comperit, quæ Mæson appellat, à quo dicta, inquit, salis Mæsonia uocari

vocari consueverunt. Cicada genus quoddam acanthion & acanthia vocat, quod mutui interpretantur nonnulli, quoniam in Aethio urbe Aetolia non canat, ut prouerbij quoque loco sit, *ἀκάνθιον οὐκ ἔστιν ἐν Αἰθίοπι*.

LOCUSTAE. CCLVI.

Locustae, quas Graeci non nominant *ἀπιδίλας* una species *ἰν* appellatur & *ἔμπε* & a Paulo, quia penitus careat, quā & bruchon vocari putat, roden tem fata, & attacon in sacris literis appellata: licet in Dioscoride astracon siue astracon legamur corrupte, ut arbitror, Nicāder mastacen appellat pro bruchō, Aristoteles actelabon. Clitarchus in Ambracia locustas omnes mastacas dici voluit, ut molurin quę fru menra depopulatur. Ionica locustas a numero penna rii retrapylridas nominat. Octae cornopas, alij parnopas & pornopas, unde cognomē Herculi & Apollini quoque in Aetolia, quod locustas abigat. Ridendus uero Strabonis interpretes apud nos, qui culicē non locustam uertit in Parnore: quod & millepede genus unū est quod uocatur onos. In sacris certe literis sunt qui bus locustae mandi solitae, non animal in se cū, sed herbam hoc nomine significet: in qua sententia magnus autor Chrysostomus, & prior eo Aethanasius fuisse creduntur, quasi pro animalī acceptae, uescendo non essent: cum tamen in Africa, ut Dioscorides cōmeminit, ad Lepin cibo etiam frequenter comedantur: hodie quoque uulgo eas comedit Aegyptij, Plinius & Indorum gentē quandā, & Aethiopij quoque partē locustis tū uiuere, fumo & sale duratis, in annua alimēta prodidit post Dioscori Strabonē, ut ob id acridophagi nomen habeat. Locustā igitur siue pedē locustę, pro herba sumptā interpretatur quā uulgo repunculū siue napunculū uocamus, folio angusto, desinente in mucrone cauliculis, uertice torulos habētibus, ut in asparago & falcitiano lupo cernitur: itemq; multi lateris: ex quibus minores alij alterno semper inguine profluunt. Radicula uel diuicū lautoq; mēsis petita: rapistij quidē sapore, non tū ad ructus illiberali, ac fatuus omnino gustus, sed cū aceto & sale non inuicundus, semē ei tam exiguum, ut discerni fere aliter non possit q; grana fabuli. Alij pedē locustae pro blito aut ualde simili herba capiunt in Arabici scriptoribus. Sunt qui uocabulo acridis non herbā unā aliquā, sed summā herbarū omniū, quibus uictitarius homo sanctus in solitudine, accipiat: quod si esset, perperā uertisset Hieronymus locustas: alioqui certum est locustas Iudaeis inter animalia quae non sunt interdicta cibo, numerari. Dioscorides certē paniculas auēgē dependentes, ut in bromo diximus, locustas, Plinius lobas appellauit.

OSSIFRAGVS SIVE

PHINIS.

CCLVII.

Ossifragus uel phinis, & ut Aristoteles appellat phine, alienos foetus cū suis alit, quos aquilae nutriendi tædio eiecerit. Quidam non generare ossifragum scribere, ut Aristoteles. Plinius ex haliaeto nasci ossifragos, ex ossifragis uulures minores, & ex minoribus maiores, qui omnino non generant. Differt ossifragus ab ossifraga, etiāsi confundunt aliqui, quod ossifraga septimum est aquilae genus, quae barbara dicitur & sanqualis: ossifragus uero qualem indicaui, laudatus ad uicia, quoniam in testinum unum habeat mirabili natura, omnia deuorata conficiendi. Nescio quomobrem Ambrosius fulicam accipiat, quam Graeci phinin uocant: cum

sit apud Maronem fulica ut quibusdam placet, herodius ex Arato, quē poeta noster ea parte uidetur imitatus, ubi prognostica tempestatum carmini suo inseruit. Idem Ambrosius herodij alio loco sturpum interpretatus est: cui sturnos Graeci plaras nominēt. Hieronymus herodium Graeco nomine appellat. Seruius herodios accepit, quas nos Diomedaeas uocamus. Pausanias herodiorum genus maximum, & pulcherrimū, & augurij quoque proditum uocari tradit. Theodorus fulicā, quae ab Aristotele cepphos, siue cemphos dicit, intelligit. Ossifragus parū ualet oculis, nubecula etiamnum suffusus.

GALERITA. CCLVIII.

Galerita siue quod idem est Gallica uoce alaudam, Graeci corydon, & corydalon, & scordalon appellant, item corydalida, omnes à galea siue galea: nam & epitymbiditon Theocritus: quia ceu tymbon, hoc est, sepulchrum patris in capite gerat: cuzulam Graecum uulgos nominat. Nota est apud Aristophanem comicum poētam fabula, primam uoluerum fuisse Galeritam, priore quoque terra defunctum et patrem, cum humari non posset, nondum enata humo, conditum in uertice. Corydalis est & herba capnos appellata, quoniam & ipsa doloribus coli medeatur ut auis ipsa. Galeritam nemo fere ignorat auem pusillam, & plerumque obiter nobis obuiam: Ingenio ad cantus docili: persericulis, ut inquit Galenus, qui pyrgitae ac troglytae nominantur, in oppidorum muris ac turribus frequentes adsumilem, extra quā galero, quo illae carent: nam corydylis salamentarius piscis est, quem nos cordyllam uocamus, Graeci etiam cordylida & dorylum: at cordila tumores in capite significat, & mitellam quoque Cyprij, eam quam Persae cicarin, Athenienses corybilon appellant. Porro similis est alaudae zerraneola uocata: nisi quod apice in terrā nidificas, unde nomen. Differt ab alauda & parcus, etiam si quidā negant: est etiam parcus auicula palū bi minor aliquid, subtus candida, cetero pauoni similis, & crista quoque.

HIRVINDINES. CCLIX.

Hirundines Graece chelidones, lapillum dicuntur pullo excluso dare: Tria earum genera, urbanarum, syluestrium, quae nidorum figura deprehenduntur: riparium, quae ita uocantur, quoniam in riparum cauis nidificant. Fit hoc capite ficedularum quoque mentio: Graeci eas modo ficedalidas, modo ampelidas, modo ampelionas uocant, autor Pollux, ut ceteros praeteream.

E B V R.

CCLX.

Ebur à Graecis appellatur elephas, eodem quo animal ipsum nomine, quanquam animal elephantis quoque dicitur. Ebur uero alij cornu, alij dentem elephantis nuncupant. Est & ualis potior genus elephas.

TALVS SVIS. CCLXI.

Talus astragalos Graece dicitur in sue, cuius uicem in homine, malleolus appellatus implet.

CERVINVM. CORNY. CCLXII.

Ceruum Graeci elaphon appellant, ut praediximus, & bredon poētae. Alij caput ipsum cerui bredon uocant: inulū siue inuleum eius, nebrōn & cemada, q; cemās nondum progressū in pascua: damam uero Graeci proca dicunt. Aristoteles & idonei fere oēs, & Dionysius à ceruo non distinguit.

Phile.

Philetas primigenios ceruos procas dici uoluit: Ab hoc animali Proconctos appellata est: nam ophion quod Sardinia quodam ferebat, & interisse creditur, ceruus non erat, sed animal pilo ac dente simili, ceruominus. Genus uero ceruorum prægrande Græci Echæneas ab oppido uocant. Aristoteles achænas cognominat: inulum Varro & ex equo & asina uocari scribit, quos & bardones aliqui appellant, sicut ex asino & equa mulum: quanquam uetusti codices tum Varionis tum Columellæ innum habent, non inulum, q̄ ab equo patre nomen traxerit. Sed & Aristoteles quoque innum Græce dicit: qui ex mulo & equa nascitur, ceu paruos mulos. Proinde Nonius Marcellus hinnas inquit & hinnos, sub quo nomine accipere debeam? Varro signat: ait enim ex equis & mulis qui nascantur, hinnos uocari: ut errauerit qui distinctionis studio cōfinxit, hinnulos ceruini generis esse pullos, equini uero inulos uocari. Quin si mutare oportet, uerius sit inulos per simplex n, & sine flatu ceruinus pullos accipere: hinnos autem & hinnulos per duplex n, cum aspiratione ex asina conceptos equi coitu, sed utiq̄ si sint mares ut Plinius adiecit, quanq̄ Nonius Marcellus aliter ut præmonui. Porro inis etiam infantem & paruulum Græcis significat: at iuniper g, ab Aristotele appellatur equi pumili, nō alia ratione q̄ matris & uteri uitio: gygenios à Strabone dictos arbitror in Liguria mōtanas, ubi & mulorum genus uocat hoc nomine. Non placet quorūdam distinctionē inter dorcem, & dorcadē, quasi dorcas ceruinus pullus sit, dorx animal diuersum: cum dorcas Aristoteles non ceruum, sed capream significet. Certe Diolcorides in coaguli mentione dorcadem à dorco separauit: an ut eo distet dorcus à dorcade, q̄ ceruus ab inuleo, & in Strabone zorces pro eo quod sunt dorces, nisi uitium sit in exemplari, legas. Ipsum cornu & uocat, quod & poculi genus est: nam cornibus ueteres bibisse Pindarus, Sophocles, Homerus q̄ testantur: si modo ut ferē persuasum est, rhyton in poetā eminēssimo idem sit, quod cornu.

ER VCAE OLERVM. CCLXIII.

ERUCA pro animali accepta & Græcis campæ nominantur. Hippocrates in herba tichymalo nascentes, aculeatas esse prodit, utiles ad conceptus. Campa dicebatur & genus illud bestię, quā Liber pater in Lybia fustulisse dicitur: ad Zambirra oppidum, tumulo in monumentum eius facti condito, ut Diodorus meminit.

CANTHARIDES. CCLXII.

NOMINE cantharidum & nostris aliq̄ etiam scarabeos, maxime pilularios, accipiunt, qui & canthari dicantur, & ab Hippocrate copriones. Plinius inquit, & cantharis dictus scarabeus paruus, frutrea erodens. Porro & cantharus & nauigij & pocilli nomen est, & ornamentū quoq̄ muliebris, ut Athenæo placet. Ipsarum cantharidum uenenum in qua parte sit, non cōuenit. Alij in pedibus, & capite existimāt esse: Alij negant: Inter omnes constat, pennas earum auxiliari, in quacūq̄ parte sit uenenum. Ipse nascuntur ex uermiculis in spongia maxime cynorhodi, quæ sit in caule: sed fecundissime in fraxino: ceteræ q̄ in alba rosa, minus efficaces. Im probantur duo earum genera: minutæ, latæ, pilosæ: item macræ, unicolores.

BYPRESTIS ET PITYO.

CAMPE. CCLXV.

PITYOCAMPÆ à nostris erucæ picearum aut pinorum uocatur. Buprestis & animal & herba est. Ex his erucis uermiculi postea nascuntur, qui acceptis alis euolant, quemadmodum & in ficu & cynorhodo siue canina sentice.

SALAMANDRA. CCLXVI.

SALAMANDRA animal lacerti figura, stellatū, nunq̄ nisi magnis imbribus proueniens, & secuta seditate deficiens. Huic tantus rigor, ut ignem tactum exinguat, non alio modo q̄ glacies: quod quidam tamen negat. Aëtius per ignem inquit cadentibus flammis ambulat, eumq̄ non solū frigoris ui, sed etiā pondere corrumpit, quasi obruens. Theophrastus & frigori & humori tribuit, qui ex ipsa lentus profluit. Si diutius tamen in igni manserit, comburitur. Cassiodorus: salamandra subtile & paruū inquit est animal, lumbicis aspicuum, flauo colore uestitū. Salua eius quæ lactea ore uomitur, quacūq̄ parte corporis humani contacta, uel pede imo resperia, toti decidunt pilī, & colorem in uitiliginē mutat. Si arbori irreperit, omnia poma inficit ueneno, ita populos sepe totos necādō frigida ui, nihil aconito distat: Quinimmo si contacta ab ea ligno, uel pede, crusta panis incoquatur, idem ueneficū est, uel si in puteū cadat. Manditur tamen à suisbus innocenter. Similia ascalabotæ salamandra est Aëtio, lacerta uenatoria hoc est pharmaceutice uelocior. Ascalabotem Græci & colloton, & galeotem quādoq̄ appellant, nostri stellionem. Hæc trāsmarini plenī lentigine, stridoris acerbī, qui & uelutunt: in tantum scorpionibus aduersi, ut uisus protinus torporē afferant frigidi sudoris. Tales in Italia non sunt: uiuunt enim rōre, ut chameleōtes, præterea & araneis. Qui autem stelliones appellantur, ut Marcellinus inquit, in nouis domibus cernuntur, fortē h̄, quos Romanū uulgus tarāulas uocat, albas, innocuas, & pusillis lacertis similes. Sūt & Apulum tarāulæ in agris, phalagiorum fortasse generis, ueneni presentanei, commotō statim eius mente quem percuferint. Auxiliari cantu eius & omnino musica ratione, consuetudo regionis est. A stellione fraudulentissimo animali, stellionatus crimē, & stellatura. Spartianus in Pescennij Nigri uita: q̄ inquit constitit accepisse stellaturam: & alibi tribuit nos qui stellaturas inquit milicibus tulissent, capitalē poenā assecutos. Inuidētissimum hoc animal intelligitur, quoniam senectutis suæ membranā deuoret, gnarū propter comitales morbos impetierat: hinc stellare uerbum pro inuidere. Cubilia stellionis in locis hostiorum fenestrarumq̄ sunt, aut cameris sepulchris/ue.

ARANEVS. CCLXVII.

ARANEUM Græci arachnen uocat. Araneorum phalagiorum uel multa genera: innoxii, lupi nomine post dicendum. Noxiorum duæ species ab Aristotele traduntur: uni corpus exiguum, uarium, phalangium. Præter hæc à Plinio uocatur genus aranei, lanuginosum, grandissimo capite, q̄ dissecto inueniantur intus uermiculi duo, qui ad alligati ceruicæ pelle ante solis ortum, dicunt mulieribus præstare necōcipiāt: uimq̄ illā durare anno, unde atocion q̄ dicitur, est & rhagion uocatur, q̄ acino suæ nigro

C 4 simlis

similis est, ore minimo, sub aluum pedibus curtissimis, & tanquā in choacis. Dolor à morfu eius qualis à scorpione. Vrina textis aranei per similes. Quintū genus a scordio, uel a sterio ex manu scriptis codicibus, aut a scorgion, quasi discordiale & inamabile signifi cent: sed in picto Dioscoride ἀσκόριον id est a sterio, uir gulis albis, à proximo distinguit, cuius ictu genua labefactantur: Sextū coeruleus, utroq; perniciosior, la nugine nigra, caliginē morfu concilians, & uomitus araneosus: Septimū à crabrone penna tantum differe ns, deterius etiamnum coeruleo: propterea macie quoq; conficit à se percussus: Octauum myrmecion, quia formicæ similis, sed multo maior, ruffo capite: aluo & reliqua parte corporis nigra, guttis respersus albis interstitiis uentribus, acerbiorē q̃ uel pars dolore torquens. Vult maxime circa nos & molas. Fuliginosum describitur Aëtio, stellatū, præsertimq; dor so: Nonū tetragynathus, sed duobus fastigijs. Alterius mediū caput, linea candida, & transfersum itē altera distinguit, qui & peior, tumorēq; oris molitur. Alter cinereus, posteriori parte candicans, inertior. Aëtius tetragynathum modice lato & subalbo corpore descri bit, pedibus asperis, duabus incisuris in capite, recta una, per obliquū altera, ut quaternas buccas habere uideatur, unde nomen: in Aethiopia tam frequētes, ut regionem in ea quādam prope Sillos, Acridophago sty deferi cōgerint. Idem autor & cranocolaptes, & scolecion, & sceleroccephalon enumerat: ut primū genus lōgis cruribus, subulide, aculeo circa ceruicē infesto prodacta dictū, quia caput maxime percuiat: Secūdū squalet maculis, præsertim capite, lon gis pedibus: Tertiū caput duritia siliceum, Lineamen ta toto corpore similia bestiolis, quæ lucernas circū uolant. Hæc fortasse uel eadem sunt, uel parū diuersa Plinianis. Precipue uero cranocolaptes idem genus uidet illud esse, quod nos sexū haberi diximus, coeruleum, & caliginē morfu concilians, caputq; tentās. Habetur & cinerei genus quoddā minime noxi, telas multas in parietibus latissime pādens, qui & mu scarius uocatur, inter lupos ut arbitror locādus. Cōperio & araneū candidum, longissimis tenuissimisque pedibus. Item aliud genus crassissimū, textū conden tis in contignationibus: quosq; utroq; in dictas aut di cendas forte species recidit. Est & discrimē araneos, quos Aristoteles appellauit lupos: quosq; minimi nō texāt, maiores in terra cauernas uilia, & exigua ues tibula præpandāt. Medium genus lautiores crassio resq; telas orditur uel operosissime, ob id eruditissi mum ab eodem Aristotele uocatū, cuius duas quoq; species reddit: Maiorē subius pendere, de grauatum mole corporis: minorem in sublimē & quibuscūq; telæ suæ latebris obseruātē excubare. Graeci qui de uene natis ictibus scripere, lupū uenari muscas demon strant rocurdū, celata sculptaq; ceruicula, tribus in ore, quod ei latiusculū est, lineamentis. Aranei lacerat um catulos irretitū: utraq; labia mordicus appre hensā telas suas altius tollendo, incrementa anniū futura præfagiunt. Sereno non texūt, sed nubilo. For mina m textripa, marē uenationi operā dare arbitra tur, idip̃ sole oriente occidenteq; bestiolis tum maxime infestis. Aranei clunibus in Venere conueniunt. Vermiculos similes ouis pariunt in telas expansas, quia saliendo excludunt, phalāgijs excepto, qui spe cu in ipso cubat magno numero, triginta ferē: sed ubi emer sit, matrem consumit sapius, & patrē. Incu

bāt triduo: ceteris generibus oia pauciora. Cōsum mantur aranei quater septenis diebus. Simul porro ut editi sunt, filia sua mittūt, siue de suo quod foris ha bent, ceu uellere corticeo, ut Aristoteli uisum est, siue ut Democrito, excrementi cuiusdā modo, uelut corrupta intus alui natura, statuto tempore, siue ut dixere, quia intus sit quædam lanigeta fecunditas.

Quidiū:

Cetera sunt uentus de quo tamen illa remittit Stamen, & antiquas exercet aranea telas.

Non habet Creta insula maleficum animal præter phalangium, alioqui Italiae ignotū. Hoc cerui percussū, cancos edendo sibi medetur. Nominatur & mus araneus, de quo priuatim agēdū nobis est. Araneos telæ priuatim uelut hoc est sicca, ac tenere uocari so lent. Ipsum animal araneus uocat, Graec arachnes: Tela uero aranea, ut Graec arachne: quanq̃ interim & pro animali potēte capiunt araneū. Phalangia ue ro, & quod idē est Aristoteli, phalāgas & phalāgijs arbitror esse dictos, & phalanx internodium signifi cat, qualis pars ea digiti, quæ rigida manet nec hēcti tur, ut Aristoteli placet: omnibus enim phalāgijs in ternodia terna in cruribus: ob id & fustes nodis rigē tes, ut Plinius testatur, phalāgas uocat. Vnde bau los Vitruuius quia phalāgis utilis ē, phalāgiarios appellat. In Albania phalāgiū haberi traditur Stra boni Helianoq; a quo si q̃ feriuēt, aut ridēdo, aut flen do moriantur, desiderio suorum.

LACERTA.

CLXVIII.

Lacerta graeci saura. Huius una species chalcidice uocatur atq; seps, seorsum reddēda. Lacerta tum & lacerta idē genus esse conspicitur, ut est apud Graecos quoq; sauros atq; saurai. Est & piscis hoc nomine. Lacerta uidetur & ualis genus esse a pud iu tis peritos, sicut & apud grecos saura, cuius in palma meminit Hippocrates. Est & herbæ nomē saura, Plu toī sacra, ut Nicēder poeta docuit illo uersu:

σαῦραν τ' ἄχθονος πλάστας (σφ) & ἡνέλιον.

Fortasseq; in eo uerbo aut anagalidē intelligit: quip pe quā Dioscorides sauricin à nonnullis dici prodāt, & propheta nycterin, quasi nocturno & subterra neo dicatā nūmini: aut ipsum sinapi, quod ut Plinio placet, ab Atheniēsis saurion uocatur: aut nasturtium, quod ab Hippocrate sauridion quoq; dicitur. Lacertarum pedes Graeci blaſos uocat, hoc est quorum pars extorrorum, pars introsum spectet.

SEPS.

CCLXIX.

Seps nunc lacerti genus est, nunc ut diximus mil lepeda. Cum lacerta significari uolumus chalcidicæ cognomento iturum: sed an idem sit cū ea quam Aristoteles chalcida & zygnida nuncupat, Theodorus more suo dignymdā conuertit, lacerto paruo similiter, æstimabit legentes: sipe in diuersam partē moueor Plinij uerbis, qui quodā loco ait: pecu liariter inquit à chalcide ceratē differt. Est & cuber culi maioris ac pitentis nomen seps apud Hippo cratem, ab erodēdo imposuū. Aëtius, seps inquit set pens est cubitor binū, crassitudine in exilitate, ut alia quoq; genera serpentū descendente in gressu tar do rectoq; lato capite, ore acuto, maculis corpo re toto candidis: triduo uel quadriduo interficit. Pau sanias quoq; Aepyrti inquit Arcadiae quondā regem in uenatione occupatū, & imprudentē seps oppres sit. Vipera similis est inquit minimæ, cineris colore, maculis ex intervallo uariis, lato capite, angusta ceruice,

ceruice, alio maiori, cauda breui, obliquo incesſu
quafi cancr: quod & caſteſe inquit ſerpēti propriū
eſt. Chalcidicum Helianus ſiquis inquit habeat in tri-
tico, fore ut incorruptū ſeruetur. De ſerpente intelli-
garat de piſce chalcidico, qui & chalcis dicitur, non
conſtat. De ſepe pro mulipeda Plinius xx. uolumi-
ne: multipedem inquit ſepa Græci uocāt, oblongā,
piſoſ pedibus, pecori præcipue nocuam. Caſtigata
eſt in ea parte locus, propterea quod nō ſepa ſed
ipſa legebatur: Nam ipſa genus uermis aliud, ut in pu-
mice docebitur.

SCINCVS.

CCLXX.

Sincus à crocodilo cute distinguitur, cādiore tenuiorē, fed præcipue seta squamarum, quæ à cauda ei ad caput versa est. Maximus Indicus, post Arabicus. Afferuntur in ueterati sale. In Nilo natus ichneumon minor est, tanto inferior crocodilo. In Libya duos cubitos excedere Pausanias existimat. Venales scincos ex Aegypto licet uidere, lacerti magni similitudine. Sunt & Vincentino agro sui qui dam scinci, minores multo ueris, etiam si pro Aegyptijs officinæ subsistunt. In Bithynia Chalcedonis agro ferē, crocodilos minutos quodā fonte nasci qui Azaritia dicatur, Strabo meminit: fortasse si pro scincis accipit, quoniam paruus esse tradat. Crocodili chæpæ apud Aegyptios uocantur. Iones uero crocodilos primi uidentur appellasse, ut inquit Herodotus, sum pro nomine ab illo crocodilorum genere, qui apud ipsos in sepibus macerisq; nascuntur.

VERMES TERRENI.

CCLXXI.

Vermes terrenos quida bliniathas, alij vtrique, hoc est libricos & intellina terræ uocant. Ipsos aliqui ut Dorion. Caphage à Syracusanis uocatur, qualilimo & terra uident. De ijs non nihil & in fibro diximus. Et illos & doly pus & cantilenæ genus, quia sanctificis siue purpurari utunt. Hoc nomine uocatur hymni quoque Cereris ac Proserpinæ, sed & fruges ipsæ, propterea quod singulares manipulosarris hordeacei amalas Græci uocât: ipsâs uero metas & fasciculos, qui ex multis manipulis præligati sunt, uolos & iulos nominant, ut Athenæus inquit, melius quod Photion uolens interpretari panes holoderos, hoc est quibus nihil detraçtum sit. Nec satis scio de autopyro pane, an de holopyro Photionis enarratio intelligenda sit, de quorum utroque in tritici menio de differatibatur. Terreni uermes cum & caueris suis procedunt, tempestates, imbresque prænuçiat.

MVS ARANEVS

CCLXXII.

MYREM araneum mygalē & myogalen Græci appellant. Negat transfiri orbicā ab eo, naturā quodam tempore; & si traſſerit, moritur: Inde contra morſum eius terram ex orbita ſumendā præcipiunt. In Italia uenenatus eorum ictuſ: eoſdem uulterior Appennina regio non habet. Monendi ſumus in Theodori præfatione de animalium hiſtoria, non mygalen pro muſtella, ſed galen ſcribendum ab imprefſoribus fuiſſe. Muſe araneuſ ideo mygalē dicitur à Græciſ ut placuit Aëtio, quā muſis magnitudo ſit & muſtellina ſpecie eoſ ei oblongum, cauda graciliſ, dentes quadruplici uerſu tenues, quod & uulnūſ indicat. Ex eo puruſ ſtatim ſanguis eſſat, mox facioſuſ, tum puſtula inſurgit. Sunt quibuſ carum ſeculenta. Iplum animal maxime teſticuloſ aggreſcitur. Puſtula ſi pregnāſ percuſſerit, nec aliter rumpitur, ut Dioſcorideſ & Aëtiuſ ſcripſere. Plinuſ non puſtu

las sed ipsum murem araneum si praeagnans ferisset,
dissilire protinus existimarunt.

M Y R E S.

CCLXXVII.

M Vris nomen ut mustellæ, animalibus mul-
ris cōmune. Alpini quoque aliqui marmoras
uulgo dictos interquellunt, magnis oculis, pro-
minentibus media magnitudine: pabulum hyem
præparant anteq̃ cōstat. Alterni ut aiunt nasos for-
mina, complexo herbarū fæce, lupinos cauda mor-
dus apprehensa, iniuicem detrahunt ad specus: pro-
indeq̃ tunc temporis detricto uidentur. Paresq̃ Aeg-
gyptij similiter residūt in clauis, & in binis pedibus
graditur, prioribus manuum uice utentes. Sunt &
Pontici pelles coloris & uarij, ex hoc genere creduntur
esse pelles, quibus muniti uestes contra frigora cœ-
pere: cādidos eorum armillos, fordidum uulgus no-
minat: nam uarij parte tantum prona candicat. Ve-
netis in dorso color, a quo dosuarius pelles uocatur:
quandog̃ ferrugineus, deterior priore. Instruxit et
ex muribus luxuriam suam uita, alios magnis fero-
ribus, alios medio anni tempore a septentrionibus
petēdo. Amamus corpora: debellamus animos. Cō-
duntur mures hyeme duntaxat albi, quorum palati
in gustu gagacillimum esse referunt. Murem gracil-
iū appellat, Cretenses smynthion siue smynthea,
unde Apollini cognomen, ut Photioni uidetur post
Strabonem.

L. A. C.

CCLXXIII.

Lac græce *γάλα*, Camelinum ab hominis lacte dulcissimum, præcipue si ad unā mensurā tre aqua addatur. Bos ante partem non lactescit, asina protinus. Pullo eius ubi pingue pabulum est, biduo à partu mater nō lac pressisse mortiferum genus morbi uide colostratio, & infantes colostratidensilato lacte in casei speciem. Ex proximo semper à partu colostræ sunt: quæ nisi admisceatur aqua, durefiant in pumice. Est autem colostræ, siue ut Plinius colostrum, prima à partu p̄posita densitas lactis. Theodorus pro coitu lactis quocunq; colostrū pleriq; accipit; itemq; pro eo quod ab Aristotele trophalides appellatur. De colostro & Marcialis poeta meminit, & Lucilius, & Plautus in Pœnulo: Mea inquit colostræ, meum cor, meus molliculus caseus. In tero opera uero græce pretiosissimum ex lacte caput uocatur: quod Britannī atq; Belgæ cremore lactis hodieq; nomināt. Conficietur & quæ spuma lactis dicitur, subtribræ supra memorati cremoris æmula, quā græci aphrogala, ut inquit Ætius, appellāt. Verrindentatorum lac nō cito. Tenuissimū camelis, mox equib; crassissimū aſine, ut coaguli uicē impleat. Omne lachigne spissatur, frigore ferecit. Spissatū igni pyraheos & pyriphethon uocari à græcis, autor est Ætius. Meminit & Iulius Pollux. Sic ut spissatū coagulum pyctes, quod rustici nostri laciuncatū à iuncto & carice, aut quibus alii seges tribus inuoluūt, appellant. Athenæus uero primū lac pyriphethen & pyriphethon tradit uocari. Phœro primū lac à græcis etiā pyros & pyon dicit uoluit: alioqui pyros & languis cō cretus est, quod & pus dicitur. Pulst ex eo & lacte oogala medici cognomināt. Lacticia quā qui uocat ex lacte quoquo modo cibi, etiā quidā in sacris literis id usurpat, non probō. Lactarium opus dixerim potius, auctore Spartiano: Cœnas inquit Heliogabulum exhibu, iſſe alia die de oleribus, alia de pomis, alia de clauis, alia de opere lactario,

SErū iam multo potentissimum quidā ad tertias decoquunt & sub dio refrigerāt. Græci ἰππων uocant. Hoc quemadmodū la cte separetur, Dioscorides mox indicat. In Erythea iuxta gades insula unius stadij patente freto, lac sine sero premi tradit, ut Strabo retulit, tanta pinguitudine, ut in caelo cōficiendo, aqua diluatur.

LAC SCHISTON.

CCLXXVI.

LAc schiston uocatur quasi fissile ac dimidui, quoties uidelicet concretā eius partē quæ calescalis dici potest, ab serosa, ut Galeno placet, separamus. Improprie tamen schiston inquit lac nonnulli appellāt id, in quo aut litorales calculi, aut ferum ardens restitūctū sit.

LAC HYMANVM.

CCLXXVII.

LAc mulieris ante septimum mēsem inutile insalubre ē. In omni usu præferitur eius, quæ geminos enixa fuerit: tum eius quæ marem ferē: Inefficax eius quæ sequiorē sexū edidit: eius quæ marē peperit, lacte gestitatio, canes rabiosos fieri negāt.

CASEVS.

CCLXXVIII.

Caseus non sit ex utring; dentatis ut diximus. Bubulum caseo ferturiliū q̄ caprinū, ex eadem mensura ut Aristoteles tradit, pene altero tanto. Quæ plures quaternis māsas habent, caseo inutilia: & meliora quæ binas. Caseus infumatus laudatur a ueteribus: nec hodie contemnitur. Omnis portō caseus senectute fit saluus, sed in musteū redit saporem aceto ē thy mo maceratus. Barbaros caseo non usos tradunt, sed in iocundum tamen acorē solitos lac cogere, quod & oxygala uocātū sit, cuius rationem aliā Columella postremo sui operis libro tradidit. Casei genus sapri si quasi putrē dicas, faciūt utilem coeliaci. In Plinio legendū sit epityron, an caprarum, in mentione casei libro x1. controuersum diu fuit: ipse non epityrū sed caprarū lego: non quia epityron oliuæ farctę genus sit, ut quidā putāt, quādoquidem oliuæ genus illud pityrū & pityrida, nō epityron appellari constat: Sed illa ratione potius, q̄ nisi caprarū gregibus sua laus est, in recenti maxime eam augentē fumo gratiā, & reliqua legamus, uix stabit sensus, nisi planē quis extorqueat. Præterea cū de bubulo & ouillo caseo differuissēt auctor, maxime sequētes erat ut de caprino quognoqueretur: ne quia sit omniū ferē deterrimus, improbari omnino iudicaretur. Adde q̄ infumati nō alius magnopere caseus q̄ caprinus asolet. Nec ferē placet nisi musteus atq; recens. Athenæus Latina uoce usus, fumosos caseos appellat. Laus caseo Nemausensi Lesturæ Gabaliciq; pagis. Alpino duobus generibus. Docleari ex Dalmatia, Vatufili ex Centronia. Cebano ē Liguria & Appennino maxime lactis ouīū. Auximati ex Vmbria. Item Lunensi magnitudine conspicuo, singulis quādoq; milibus pondo. Item Vestino Crustumino q̄ acceditio campo: nam Siculū Iulius Pollux meminit & Aristoteles, qui & Phrygiū quoq; nominat: sed Siculum ex ouillo & caprino mixtū lacte: Phrygiū ex equino asininoq; fieri solitū cōmemorat. Siculū Athenæus præferri putat omnibus, utiq; post Achaicum ex oppido Tromilia, unde Tromilifcus dicitur, & a Simonide Stromilifcus ex caprino lacte. Epityrū uero caseus non est omnino, sed ut Varro inquit, edulium Siciliæ q̄ Italiæ frequētius, cuius uocis in Plauto mentionem haberi sciunt omnes: Vnum inquit epityrū

edā. Pollux uidetur hoc xerī tyron uocasse, Siculū edulium id esse affirmās. Athenæus hypotyrida placet: genus facit, fortasse idē cum epityro: nā cataryton condimenti nomen est & caseo, apud eundem autorem. Trās maria Bichynius ferē in gloria erat, Saronites ab oppido appellatus. Gallici sapora medicamenti uim obinet: nunc a Cissalpina Gallia cōmendantur Placentini maxime. Formaginē Theodorus pro caseo cur dixerit, aut quē auctorē secutus ita uerterit, q̄d Aristoteles trophalida scripsit, nisi q̄ in Columella forte legit, concretum lac in fissillas aut in calathos, uel formas trāsferri solitū, non uideo. Aliubi Theodorus idē trophalida colostrū interpretatur, ut prædiximus: neutrū satis probet. Casei tyro uocat. Eius discrimina pulcherrime Antiphanes poetā reddidit: chlōron hoc est recentē, atq; molle, qualis in fissella fertur, ob id fissellis uocatis, quia inde caseum abliguunt: Xeron hoc est aridum, atq; ut Iulius Pollux interpretatur, macilentum: copton hoc est prædurū: nā & copta rhodia, & copta sicus hinc nomen tulere. Xyfton hoc est tonsillē atq; a flicū mā & horti sic dicuntur: tmeton hoc est fissillē: pecton hoc est coagulātū colostrati mēis: nā cum qui accēscere incipiat, & lacte siculone coierit, opian uocant. In Creta caseos quibus lata forma est, sed gracilis, thelias id est quasi fœcimas appellant.

HIPPACE.

CCLXXX.

Hippace differt ab hippice, q̄ hippace caseus atq; coagulū est, hippice uero herba Scythica, equestris à Theodoro dicta. Phrygiū caseum Aristoteles ex equino & asinino lacte confici solitū scribit, ut in caelo notauius. Hippocrates inuentum scribit Scytharū hippacē ex equino lacte: In ligna, inquit, caua infundunt id, deinde obturbāt: innatātem spumā, butyrū uocat: id quod sidat, hippacem: id quod in medio subsistit, seru. Vires exiguo cibos sustentat hippace, quemadmodū & hippice.

BVTYRM.

CCLXXXI.

Butyrum spuma lactis est, concretiusq; q̄ quod seru uocatur. Hic & butyrus dicitur & butyrū, & ab Hippocrate picerion. Laudatissimus barbaris cibis, & qui diuites à plebe distinguat. Butyrū à boue nominatur, quia ē bubulo lacte fiat, ut miret Dioscoridem galenus, q̄ ex caprino, & ouillo confici lacte dixerit. Ex caprino tamen fieri solere, testis est Plinius: quod quidem cum sit, hyeme calefacto eo, æstate uero dumtaxat expresso utitur: crebro iactatu in longis uasis, angustulo foramine: additur paulū aquæ, utiaceat: quod est maxime coactū, in summo fluit: id exemptum addito sale, oxygala, hoc est acre lac appellat: reliqua decoquunt in ollis: ibi quod supemat butyrum est. Quod magis uirus respuit, hoc præstātius. Oxygala fit & alio modo, lacte acido in recēs addito. Casei genus à Galeno oxygala lactis uocari Asiæ Pergameno præsertim agro dicitur.

FVLIGO BVTYRI.

CCLXXXII.

LANA SVCCIDA.

CCLXXXIII.

Lana græci ἰππων uocat: Ad medicinā laudatissima est Galatica, Tarentina, Attica, Milesia. Lanæ quibusdā locis non tendentur, sed euelluntur: ob id cum dempta est atq; conglobata, quidam uellera, aliū uelumina appellāt. Miz quod tradunt, meri lanas pecori cibos fastidienti, si cauda q̄ actissimæ præligata indidē uellātur: statim enim uesci pecus incipere, & quod extra nodū sit, præmori. Lanā succidam

succidam Græci thyparā, tonia smypen, alijs celsypirā, hoc est fordidā, & cū celsy po suo, de quo paulo post dicitur i summus, nominā. Galenus autor, Succidā à sudore dictā Varro existimat: quia oves cum incoeperint sudare, non deātur: Nam succidia nō à sudore, sed à sue nominatur, cuius caro est. Lanarū sunt & à coloribus, quos bibunt, discrimina. Cymatiles à fluctibus: geranochroes à gruibus. Iam ab amethysto, ab serenitate, à croco, à rosa, à myrto, à glandibus, ab amygdalis, à cera, à coruo coraxicæ, à purpura colofinæ. Et hæc partim ex Plauto, partim ex Ouidio in artibus, & Strabone. Adulteros, ut Helianus tradit, in Gortyna Crete de prehensos, lana coronabāt, mollitiæ probro, atq; ita per ciuitatem ad magistratus tra ducere moris erat.

LANA VSTA.

CCLXXXIII.

OESY PVM.

CCLXXXIII.

Oesypum & celsypum, utroq; modo effertur, ab eo quod in hoc est ouis. Græci masculino fere utuntur, Latini frequentius neutro. Laudatissimum à sudore alarum & foeminum, sicut in Atticis ouibus geniū, quod & notauerit Ouidius:

Oesypa quid redolent, quis mittantur Athenis. Hippocrates caprinā è clunibus ferdē uocauit celsē: ouillā, celsypiden: quo quidē nominē lanā quoq; succidam significat quibusdā. Quidā hoc à Galeno hyfopū dici putant, errore uulgi: & quidē à Græcis orto q non celsypum quandoq; sed hyfopum scribāt: ut siue prudentes, siue imprudentes, non celsypum simpliciter hyfopon hygron, & hyfopum pharmacum sapissime cognominent, quasi ab hyfopo herba distincte uoluerint, ut Paulus in compositione quam à ruta *πυρρὸν* appellāt, utilem pleuriticis.

COAGVLVM.

CCLXXXV.

Coagulum pyctia & pytia Græce dicitur, & tamisios poetis. Plinius ex hædo laudat, Aristoteles ex inulo, præcipuum tamē dasy podis, qd & profusio alui medeatur, huius utrinq; dentatoz. A pytia pytijnam uulgo dici, cōcretum igni ferum, & quod in casum coire non potuit, existimo. Est & apud Grecos id quod appellāt aurores noui melcen, imbuto uasē à ceto, atq; ita excalfacto, mox lacte infuso, ac nocte tota quiescere citra ignē permisso: quanquā & alij pleriq; modi sunt, sed hic & compendiariorum & facilis. Sunt quibus melce uideatur esse quod oxygala uocauimus: tamen si butyrum quoq; rustici non aliter fere appellāt, q̄ melcen.

ADEPS.

CCLXXXVI.

Adipem atq; seum, item pingue, medicifere confundūt, cum ueteres tum noui: Sed differunt, q̄ ruminātia seum habent, adipem cætera uel ut Aristoteles tradit, cornigerā, non utrinq; dentatā, & quorum in pedibus tali sunt. Pinguefunt seuo bisulca, scissisq; in digitos pedibz, adipē. Adeps atq; seuus semper in fine carnis sunt: pingue uero inter carnem cutemq; succo liquidū. Adeps atq; seuū concreta sunt ægelascūt, fragilia q̄ si refrixerint, pingue non gelatur atq; hoc Plinius intellexisse mihi uidetur cum dixit: adeps concretus est, & cum refrixit fragilis: appellatione adipis: etiam seuum complexus. Lupino adipi a pud ueteres palma fuit, adeo ut nouæ nuptæ intrantes, solenne haberent postes eo inungere, ne quid mali medicamenē inferretur. Sēum Græci *ἀπ* uocant. Nam *σπ* massa est farinæ, quam & consperzionem & balthreum, atq; tractā di-

cinus: adipem uerō & pingue, pimelen appellant. Item pion atq; lipos, à quo genus carnis alipaston uocatur, hoc est sine pingui, quam Strabo comicus seruitijs apponit. Dicitur & grassos adeps ipse à grecis, & grasson: sed ouillis maxime cum sordibus & sudore illuies. Dicitur & demos à poetis ipsum pingue, ut nihil præterisse uideat. Archigenes sudorem sordēstq; corporis grassoniam uocauit. Pollux grasson & cinaurā. Quædā non pinguefunt ut lepus, atq; perdid. Steriliora pingua in utroque sexu, celerius senescunt. Omnibus animalibus est quoddam in oculis pingue. Adeps sine sensu est omnis, nec arterias habens nec uenas. Pingue animalium plerisq; sine sensu: quam ob causam lues spirantes, à muribus erosæ perhibentur. Adipes homini detrahuntur, & uiuit leuatus onere. Habent & arbores suos adipēs, quos albina Plinius appellat: quos amputare & adimere, exalburnare dicimus: à colore nomen sumptū, cum ligni pars est deterrima, & terebinde breui sentiens: unde robur exalburnatū, quod à Theophrasto melandryon est dictum, quia sit ei color nigricans: cuius similitudine falsa menti genus quoddā melandryon fortasse uidetur appellatum. Quid autem sit aruina, Suetonius in eo libro qui de uitijs corporalibus inscribitur, explicuit: durū esse dicēs pingue, quod est inter cutem atq; uiscus. Non solum autem pingui tudo, sed etiā pinguedo Larine dicitur: quicquid seruiogrammatico uisum fuerit, qui aliqui mihi parū uidetur Plinium multis partibus legisse.

ADEPS suillus, & anginitus. CCLXXXVII.

Adeps suillus unguen, ut inquit Palladius, & axungia Latine dicitur: & Græci quoq; uisunt, sed oxyngon fere appellāt, tractā origine ab axis curruū perungendis: quanq̄ est ubi Plinius aceti fecem oxyngon interpretatus esse uideatur. Et nos fortasse quibusdā locis autoritatem summi uiri nostro iudicio prætulimus: Alioq; Paulus Aegineta oxyngion pro axungia clarissime uidetur intellexisse, in emplastro cui phoenixite nomē est. Laudatissima ex apris: tātā porrō uis, ut genus etiā adalligata, redeat ad os laporem, eamq; expuere uideant: neq; occultaratio, quoniā hoc animal radicibus herbarum uescatur, ideoq; innumeri è fimo quoq; uisus. Axungia nomen ad alia quoq; pingua trāsferri, sed raro, comperi. Laridum uero salica est animalis eius caro, quasi large aridum, ut Macrobio placet. Sunt q̄ suillum pingue laridum uocatum putent.

ADEPS ceruinus, ouillus, hit-

cinus.

CCLXXXVIII.

ADEPS BVBVLVS.

CCLXXXIX.

Bquem Græci *βου*, & *βοῦν* uocant: itemq; *βοῦν* & quodog *βοῦν*, unde dicta sit Italianam steriles uaccas nostri tauras uocabāt, sicut prægnantes hordas atq; fordas: unde hordicalia Romæ festa, quo die hordæ boues immolabantur. Ephesii pincernas ipsos appellare tauros solebant. Nam portis & portax pro iuuenta dicitur à Græcis. Item Damale siue damalis, ut Dores solent *δαμάλιον*, quam nos iunicem uocamus: damales uero ipsum iuuentū significat: quē in Alexandri Cæsaris uita Lampridius damalionem uocauit. Vterq; sexus in moscho continetur. Photion damalin uocari omne animal existimat in iuuenta.

ADEPS taurinus, pantherius,

leopardus,

CCXC.

ADI-

ADIPE S Odonatiē uitulo, tauro, ceruo:

Item medulla cerui.

CCXCII.

Vitulum greci *μύρον*, unde *μύρον* in agricultu-
ræ usu dictum existimatur, qui uitulam in li-
teris sacris interpretati sunt, cum Latine dici
posset uiuiradix. Moschos & pediculi significat, quo
frondes & fructus ramis annexi pendunt, qui & pe-
ciolus & à Palladio tenax uocatur: Viuiradix & auul-
sio parum distat, sicut moscheuma & paraspades ap-
ud grecos. Dicitur & moschos, siue quod idem est,
oschos, pāpinus, & capreolus, & clauicula, quæ Græ-
ci helicas, & ligna, & clemata, & amphidas quoque ap-
pellant, ut Galenus inquit.

ADIPE S gallinaceæ & anserum.

CCXCIII.

Anseres & oca siue aucæ à Græcis *χύνες* appel-
lantur, unde *χύνες* & *χύνος* locus ubi alitur: nā
χύνος uerbum ad muscos pertinet, quasi ti-
bia rum sonum præsentans. Herba in Varrone pabulo
anserum seri solita, non herin, ut habet exemplaria,
sed serin scribendū monemus, autore Columella. Fe-
runt eā cum est aqua tacta, etiā cum est arida, quasi
renouellari uiridemque fieri. Laudatur anseres *χύνες*,
hoc est altilles ueteribus, & ex ijs iocinora.

ADIPE S SAMPVSCHINI.

CCXCIII.

ADIPE S anserini, gallinacei, uitulini.

CCXCIII.

ADIPVM MEDICINAE.

CCXCIV.

Adipem caprinū astrictiorē esse quā suillū, Gale-
nus falsū creditū à Diofcoride communuit:
nisi quia astrictior pro eo quod est acriorē
accipiendū putet: quādoquidem homo inquit aliā
peritus, sed barbarus, proprietatē Græcæ linguæ mi-
nus tenuerit.

MEDVLLAE ANIMALIVM.

CCXCV.

Medullā, quā Græci *μύλον* uocāt, uituli Galenus
post ceruinā præfert omnibus, eamque priua-
tim à medicis appellari moschion scripsit.
Medulla proprie, inquit Galenus, est quæ ossibus in-
cluditur: improprie uero etiā ē spina dorsī, *σπονδυλός*,
hoc est dorsago, ut ita dicā, nominata, quæ sit reliqua
medulla durior ac siccior: nā ea quæ spondylis hoc
est articulis uertebriisque continetur, spondylionis ha-
bet nomen, ut inquit Pollux.

FEL ANIMALIVM.

CCXCVII.

Fel siue bilis *χολή* à Græcis dicitur: Minor anima-
lium subtilius. Equinū tantum damnatur inter
uenena: ideo flammī sacrorū, equū tāgere non
licebat Romanis, cum tamen publicis quoque sacris im-
molaretur equus. Taurino felle aureus color ducit,
seramentis atque pellibus, qualia Græci cholobaphina
cognomināt. Bilis duplex, atra & flaua: sed cum sim-
pliciter pronuntiar, flaua, inquit Galenus, intelligit-
tur. Flauæ duo ferē genera: luteæ quā Græci *οχράν*
uocāt, & ruffæ siue fuluæ, quā xanthē dicunt, uehe-
mentiorē & calidiorē priore. Sūt & alia colorū disci-
mina: uirentis, quā *ισχυρή*: coerulescē, quā *μυρτιν*, & sub-
nigræ, quā *καυρή*, istādis modo fuskā. Callionymū pi-
scem, cuius mentionē habet hoc loco Diofcorides,
sunt qui callichethyn & anthiā quoque appellant: item
hellepō hoc est acipenserē, & castū siue crumpe piscē:
Aliqui etiā lycon: sed differre tamen eos inter se cum
ex Aristotele; cum ex alijs auctoribus aperte constat.
Sacer certe piscis est proprie quē pompilon uoca-
mus. Dixi hellepō eundem qui acipenser dicitur: cæ-
terum Archestratus eū, qui uocetur inquit à Roma-
nīs acipenser, galeon à Græcis appellari existimauit:

perpicio errore, ut aliubi monstrabitur. Fit & de Per-
dice sermo hac parte, in quo sciendū, perdicēs & ca-
cabidas & cababos etiā uocari, à sono quē edunt ca-
nentes, Theophrastus uocari est, non omnes eum so-
num reddere, sed *Ανθρῶπις*, & aliquas. Perdicum pondū
multa genera, sed præstāissimum cui rostrū purpu-
reum: nā Italicæ, inquit Aethenæus, præparauit sunt,
nec rostrū rubens habent. Idem autor phasianū siue
phasianicum aliquādo tatyryn, aliquādo tetaron &
tettaron uocatum scribit. His adiecto attagas, non at-
tagenas dicendo, etiam si Varro, & Gellius ita nomi-
nent. Atagenus certe piscis ē numero est.

SANGVIS.

CCXCVIII.

Sanguis Græce uocatur *αἷμα*. Distat à sanguicu-
lo: quod is proprie sanguis quod est in cibum igni co-
ctus, nigrius, ut sūt Pollux arbitrat, uoca-
tus: hoc à Græcis hypotrīmna & hæmalea & hæma-
tion, & specialius hypophagma dici putat: Sed ex
omni tamen quadrupede, adiecto melle aut sapa, sa-
le, aceto, lacte, caseo, cumino, laferpitio: inuentū La-
cedæmonē putat: uulgo id nosius dulce nominat.
De alio sanguiculi significatu diximus in gargo. Non
dissimile uidetur quod Græci creocacabō appellāt,
hoc est carnē minutatim cōcisam cum sanguine, &
adipe, iussulentoque ac dulciori liquore: nā quod my-
na uocat, mihi quædā uidetur miscella creocacabō
& hypophagmatis fuisse: nisi quod paulo plura sunt,
quæ in myma requiruntur à quibusdā, autor Athe-
næo, turis & illa sunt genera quorū in Pseudulo festi-
uus poeta meminit: cicilendū, hypolindū, cicimā-
dum, paropsis, captis, mæcis, siue magis ut cōficio.
Eque uirginis sanguini uim inesse negat, quæ mari-
bus foeminis ignō uirginibus. Taurinum ubique inter
uenena collocat, excepta egypta, ubi descēfura in spe-
cum sacerdos uaticinū causa, tauri sanguinē præsum-
mit. Caprinum bibentibus pallor accidit. Hircorum
sanguine ferramenta acuantur, indurata subtilitate
& scabritia expolita, uehementius etiam nūquā scobi-
na fabri. Adamantis natura inuictissima & duarū re-
rum uiolētissimā: contemptrix, ignis & ferri, non alia
rumpitur uis quā hircino sanguine macerata, recenti &
calido: etiā si hoc gemmatū nostrū falsum & ridiculū
existimāt. Anate de qua mentio hic habetur, Græci
neffas & nefta uocant: quanquā nefta magis est ut se-
pta anataria significet quā anates ipsas. Anate ueteres
& anilem morbum uocabāt. Similes anatibus sunt
sed maiores, quas glaucia Græci uocāt, ab oculorum
colore. Sunt & boscadēs, & quas ab urinādi uolupta-
te colymbos & colymbades nominant. Inter omnes
eas minimæ, atri ac sordidi coloris, acuto rostro: soli
earum spectatur oculi, cætero merguntur. Habentur
& chenalopeces appellatæ, sed anseri contribuitur.
Inuenitur & boscadis unguis minus maius anate, sed mi-
nus chenalopecē: huc & phascades pertinent, paulo
grādiore quā colymbi, cætero similes anatibus. Est &
uria dicta non multo minor anate: rostro longiore
ac tenui, colore sordido figlinæ. Angustū et Phalaris
uocata rostrum obtinet, caput rotundius, uentrem
subcineritio colore, tergus nigricans. Nominant hic
et colymbæ, Græci eas modo peristeras et mascolino
genere peristeros, ut Attici, et neutro peristeria: mo-
do pelias et peliadas uocāt, ut Dorici, quanquā Ari-
stoteles distinctum genus facit, quia et alia dinume-
rat: quod fit ut in pocillo Nestoris plerigon non colum-
bas, sed pleiadas cœlestē fidus intelligēdas arbitrentur
in Ho.

in Homero. Colūba porro Siculæ præferūtur omni-
bus: laudatur & Cypriæ luteo colore, In India colū-
bas esse Græci affirmāt. Cæteræ columbas quas di-
ximus peristeras à Græcis dictas, duo genera cō-
stituunt, ut Galenus est autor: *ῥαβδινόδον*, hoc est, do-
mesticum, & *ῥαβδινόδον*, hoc est, pascuū & sylvestre.

FIMVM.

CCXCIX.

Fimū Græci multis nominibus, *ἀρνιότις*, &
ἀρνιότις, & *βλάβη*, & *παραμυρβλάβη*, & *σινίς*, &
ἀρνιότις, & *ἀρνιότις*, & *ἐνμαρβλάβη* Ionice appellāt
& *σινίς*: quanq̃ hominis hoc proprie, ut a sinī, onida
& onthon: equi, copron: pecudis, cespōten uel oipō-
ten Aristophani & sinypen: lones suis, hypleuton:
murum, myocopron & miscerēdam: nos muscer-
dam, ut suillum fucerdā. Liquidius quod est, nostri
fortia cognominant, unde forioli, quibus soluti scula
est alius, & cōforie uerbum, pro eo quod est inqui-
rent fimo, quod Plautus concicare dixit: & forica lo-
cus in publico, ut latrinæ in privato. Fimos porro
etiam luforias tabellas, hoc est, alueolos dixit Hora-
tius. Asinini certē pulli simum quod primum edidit,
posion uocari tradit Aristoteles. Fimos polean pri-
uatim, & caprinum *spyrachos*, & *spyradas*, & *spyr-*
dana, quas Palladius caprinas baccas uocauit.

CROCODILEA.

CCC.

Crocodileam cerussæ modo elui præcipiūt. Est
& crocodilea, siue crocodilina & crocodilitis
uocata, questio sophistarum ludicia, ut prius
& ceratina, sed alienæ omnes ab hoc opere. Croco-
dilea Plinius etiā insectina ipsa terrestris crocodili ap-
pellat: ob id diligenter exquisita, quoniam iocundis-
simo nidore fragrant: uiuic enim odoratissimis ani-
malis floribus, simile crocodilo ei, cui uita in terra,
aquatq̃ cōmunis, sed multum infra magnitudinem
eius, & in terra tantum.

VRINA.

CCCI.

Vrina siue lortion, Græce *ὑρῖον* uocatur. Vrina
struthionis atramentilituras abluic. Fullones
pedum uitijis carere affirmant urinæ benefi-
cio. Magi præcipiunt ne quis contra solem lunam uel
nudetur, urinæ causæ: ne uel umbram alicuius resper-
gat. Hesiodus contra obstantia reddendam, ne deo-
rum aliquem nudatio ea offendant. Non desunt qui
amuletum esse dicant, suam cuique matutinis omni-
bus instillant in pedem.

LYNCVRIVM.

CCCII.

Delyncurio non constat autoribus, an sit, aut
unde sit. Qui electrum id esse negant, gem-
mam tamen fatentur, ex urina lyncis omni-
no, sed quam animal id statim redditam aggesta pe-
dibus terra obruat inuidia, ceu gnarum peti eam ab
homine, celerius ita concrefcere in gemmas similes
carbūculis, igneo colore fulgentes atq̃ frigidas, quæ
& scalpantur: quāquam distinguunt & maribus, præ-
cipueq̃ feris & fuluas & igneas: & feminis, præsertim
cicuribus, candidas atq̃ languidas existere: nec fron-
des & acus modo rapere, sed æris quoq̃ ferrig. bra-
ctæolas, ut Diocles & Theophrastus referunt. Alij di-
xere languas, & esse in Italia circa Padum langu-
rias, quæ ab aliquibus languæ nominentur. Falsa hæc
omnia Plinius existimat, nec usam æuo suo gemmā
appellatione taliscribit. De lyncurio lapide non hoc,
sed alio inter fungos, mirum quidē sed uerum dictu-
risumus. Succinum dioforides hoc loco *ῥητινὸν*
cognominat, quod stramenta, floccos atq̃ simbras

in se trahat: alibi chrysophoron, ut Plinius chrysele-
ctron. Lynces clarissime omnium quadrupedum
cernunt.

MEL.

CCCIII.

Mel à Græcis *μέλι*. Natū in Carina Crætae mon-
te mel, melle non attingū, propterea me-
dicamentis eligitur. Varro siculum præfert
omnibus, q̃ ibi thymum bonum frequensq̃ sit, quod
ad mellificum nihil est præstantius. Strabo & Cyclā-
dibus, & inter Cycladas Calyminū anteponit omni-
bus. Natura mellis ea est, ut uicia cōcedat, ne serpere
ultra patiar: quam ob causam uel exanimum cor-
pus hominis per annos plurimos innoxium conser-
uat. Est & suus in melle ac multo flosculus, si recta
est apud Columellam in oliuæ conductra lectio: sicut
enim qui uasculū mellis, non flosculū ibi legant. Sed
certē in omni te purissima & tenuissima quæq̃ pars,
floris appellatione demonstratur. Est & in pomis
flosculus qui & umbilicus dicitur: nam & in fico pomus
fundus Græce omphalos dicitur, hoc est, extremas
altera q̃ quæ petiolo annectitur. De celesti melle di-
ctum est superius in elaeomelle. Hircanum melle
ipsis quoq̃ fluit arboribus, sine cura mortalium, exa-
minibus inibi se cogentibus atq̃ mellificatis, ut in-
quit Strabo: & petris quoq̃ ut Diodorus: sed minores
apibus sunt ætheris quodæ appellatæ. Meminit bestio
leg huius & Aristoteles inter crabrones uiuentis, etiā si
corrupte legitur in ipso tenthredon pro anthredon:
nā crabrones anthrenæ à Græcis dicunt. Hoc ipsū
ferē in Media & Armenia quibusdā locis uisitur. Dio-
dorus & Quintus Curtius arbores in Hircania, quæ
folia multo melle tingantur, faciem quercus habere
tradunt: ac nisi solis ortū incolat præuortent, fore ut
uel modico tempore is succus extinguat. Mellis in-
uentiohem Plinius & Diodorus Aricæ Atheniensis,
uel Arcadiæ regi ut Trogus, sicut medicinā ex eo Gel-
lius Oceani filio Soli assignat. Trogus colligendi mel-
lis usum mōstrasse Gargorin scribit, ut cūstissimū re-
gem in Hispania Cureti, qui saltus Thartefios: inco-
luēse, in quibus Titanes bellū cū dijs gelasse perhibē-
tur.

MEL SARDOVUM.

CCCIII.

Cvm mel in Sardinia progenitū uirus habeat,
mirum est quod nullum tamen animal homini
pestiferū in insula ea nasci perhibeat, extra q̃
solpugam, ut Solinus meminit: de qua in castigatio-
ne Pliniana dictum est abunde. Non solum uero mel
Sardouum, sed & Colchicum infame traditur amaritu-
dine. Sunt & alia mellis fastigia, quæ mox subiū-
get dissertatio.

MEL PONTICVM.

CCCIV.

Mel Heracleoticū siue Ponticū, ex herba fieri
candida commemorant, quæ ægolethros
uocetur: quia uexatio iumentorū sit, præci-
pue caprarū. Non sentitur aut omnibus annis hoc
malum, nec nisi cum flos ille marcescit a quo uere,
Signa uenena sunt, nunq̃ denari, color magis ruti-
lus, & quod ponderosus est q̃ probū: qui gustauere,
adiiciunt se humi, refrigeratione quergentes. Exitium
hoc per extremitate ad canes quoq̃ peruenit, simil-
terq̃ corquet eos. Mulsū tamen ex hoc melle inue-
reratū definit esse perniciosum. Aliud genus mellis
in eodem Ponti flos manicon, siue *μανικόν* ap-
pellant ab insania quam facit, existimatum rhododen-
dri flore contrahi, quo scaturit syluæ: optima camerū
ex hoc uno cera fit: In Perſide autē & in Mauritania
f. Cæli.

Casariensi Getulicis Massylis contermina, uenenati fauigignuntur: quidam non toti, sed parte, quod nihil fallacius: nechili luore deprehenduntur. In themiscyria Ponti regione mons est Scydisse, cuius incolunt Byzeres & Hepacomitæ dicti, iugahi tris cohortes Pompeiæ comedantes interfecerunt, dispositis quatraneis dum erat mellis infanti uasis, quod ibi ex arborum quaradum, ut inquit Strabo, ramis funditur: conuenientem enim potu eo militem aggressi facile confecerunt.

SACCHARVM. CCCVI.

Saccharum laudatius ferebat India, nunc popularis ortus eius est in Aegypto, Cypro, Rhodó, Creta: Italia quoque nascitur. Nullum epulū magnificum iam, ne quotidianus quidē pictus placet sine saccharo. Digeritur in pastillos: effingitur in placentas: à maza & pane ut putō mazapanes uocatas: quāq; & marcipanes ab autore dictos coniectari licet, quandoquidem & marciani unguetum & marcipastillos in medicina legimus, ut est apud Aëtium, & priorem eo Paulum. Omnino componitur in omnē figuram sacchari, nō aliter q̃ farina, trahitur etiam in picturas, opere historiali, uenatus, classes, oppida, & quascunq; res affert libet imagines præsentās: à coronatis ministris cū tubicine introferri solitū conuiuijs, & ad principia eorū, & in secundā quoque mensam: unde natū sit prouerbiū, nullū ferculū corruptū saccharo. Amplissimū nucis auellanae magnitudinis, Plinij temporibus & medicinae duntaxat usū: nunc tā promiscuū, ut desinat prodesse, multis obicit. Pueris certe lumbricos & tineas contrahit. varronis uersus fuit:

Iadica non magna nimis arbore cretiscit harūdo,

Illius & lentis premitur radicibus humor,

Dulcia cui nequeant succo contendere mella.

Strabo q̃q; non ex ipsis tantū harūdinibus, sed & radicibus quoque mel exprimi cōmemorat in India. Nūc ex Alexandria Aegypti, & Cypro commendatissimū. Melius quo uertutibus, q̃q; calidius & capiti ferē nocens. Dilutū aqua refrigerandi uim concipit, præsertim ter coctum. Primo excoquunt harundinē, deinde flaua pars fecernitur: hanc sacchari existerē. Hoc iterum coqui potest, atq; ita sit candidius & concretius. Quod si tertio coquatur, maxima in eo fit & candoris & delictatis accessio. Quartum & quintū quoque solet excoqui, & donec specie aluminis scissilis ferē transluceat: quod genus alijs candidū, alijs cantium cognominant. Sacchari Græci sacchar uocant. Rarum nec planē cognitum galeni quoque seculo, tantū abest ut instrumentum nitidioris uitæ fuerit: quanquā nō magnopere pridem inuentum putō, ut nucleos pineos, amygdalas, auellanas, pistacea, citreum, cinnamomum, coriandri, anisum, feniciculum dū cūtilunicarum facilitate conuegit, circūdatum modo coricis crassitudine, modo cutis tenuitate uestiens. Dulciaria quidem ex nucleis pineis & amygdalis cōdebant antiquitus: sed cum melle, ut est apud Paulū. Veniale porro saccharum, in dupondianos ferē panes, metæ effigie diuiditur. Pretiū optimi in libras auri numerū ferē sexcunx. Cyprum non coibat ante: nūc densatur, tanto inuentoris quæstu, ut inde locupletissimū euaserit: negatio tamen communicata est, sed arcanam habent, ut ad heredes laudandi cuiusdam aut monopolij uice transeat. Illud monendi sumus, in Papinij sylua quadam illo uersū,

Et quas præcoquit Aebulstra cantias.

Hypasitam non Aebulstram legendum: ita enim populi uocantur Indigē flumini Hypasi, ut est apud Strabonem Pliniumq; nec audiendi sunt, qui nullo autore, nullo esse in Syria locum eum tradant inter Libanum & Antilibanum: cōuale mediana ibi harundinū quidem prouenit, sed odorata, non saccharca, ut alibi quoque diximus.

CERA.

CCCVII.

Cera Græce uocatur *νύμφη* expressis fauis, sed ante purificatis aqua, & triduo in tenebris siccat, quarto die liquatis igni nouo fictili, aqua fauos regente, tum sporta collatis: Rursus in eadem olla coquitur cera cum eadē aqua, ex cipiturq; alia frigida, uasis melle circumlitis. Optima quoque Punica uocatur. Plurimum habet ex propoli Cretica, ideoq; locū secundū in nationibus obtinuit: tertium Corsica, quoniam ab buxo confert, & medicaminis uim referat. Fieri candidā cerā, nihil aliud esse uideo, q̃ Punicā fieri. Hæc medicinis utilissima, uarios in colores pigmentis cera trahitur: ob id & tracta dicitur, ut putō etiam à Græcis. Nigrescit addito chartarum cinere. Anchusa mixta, rubet, ad reddendā similitudinem & innumerōs uitæ usus: ut taceantur pillularium parietumq; & armorū tutela. Superat niuem candore cera, quam pharmacopoeia nostri præparant, nuperrimē urī cocepta publicis priuatisq; sacris, solennibus & prophanis usibus. Officina tantū una concinnabatur hæc patris memoria, nunc urbe tota uenditur, nec aliā crematur cera duntaxat apud nos q̃ candida. Primum omnium Cornelius ē senatu domum rediēs, funali cādido usus dicitur, tanta uerecundia, ut nō prius accendi pateretur, q̃ tota curia & foro decessisset: quia ceteri aut laterna, aut trivialis cera deducere. Exempli eius deinde sequuti omnes, maiestatisq; hoci illius ordinis amplissimi, nō luxuriantur: itaq; senatu missio, post occasum solis, tam lōgus est ordo luminū, ut planē diē reddat. In cera qui nascitur uermiculio, ab Aristotele uocatur acar.

PROPOLIS.

CCCVIII.

E Propoli apes faciūt foramē introitus protectū æstate maxime, ut ingit Varro. Alia hæc ab rhitace uocata, quā fauos extremos simul conglutinant: interdum extra fores aluei obturant omnia, quā uenit inter fauos spiritus. Interpretatur hanc Gaza noſter & cerum quandoque. De hac & in lilijs mentione differemus.

TRITICVM.

CCCIX.

Triticū & fatiū & syluestre, cultu annoꝝ triū mitescit: in Leontino Siciliæ agro plurimū. De genere aut triticū in hordēi, ex eodēq; nasci pedit utrūq; fabulosum existimatur à Theophrasto. Frumentū omne radicibus multis ac prætenubus exit, folio uno, germinibus omnino multis, sed quæ in ramos brachia nō possunt: cuius contrariū in omni legumine conspicitur, excepta faba. Frumentum Græce dictum, quicquid ex se aristas mittit: in herba quam Græci loion uocant, per hyemē est remollitū autē celo cauliculus de medio aſurgit, cuius tertio aut quarto genu spica geritur, nō prius euidēs, q̃ folliculo inclusa, qui gluma dicitur: cōsummato eo floerumpit, quarto aut quinto post die, ac totidem ferē diebus, plurimumq; septem durat. Varro quindecim diebus frumentū in uaginis esse dicere, quindecim inquit, quindecim areſcere. Post florē crafceſcit, inquit

Theo.

Theophrastus, maturaturq; intra quadragesimum diem, cum tardissime octauo à satù mense plurima parte mētur. Aegyptus, ut scribunt septimo. Folium harundineum, angustius tamen tritico quàm hordeo, caulis quoque leuior, & lentior, nec perinde fragilis. Triticum multis integrit tunicis, hordeum nullis. Culmus tritico altior q̃ hordeo, spica quoque remotior à folio, palea suauior, mollior, succosior. Incondita tritico spica, explanataq; ip̃s hordeo disposita in versus. Vtrique culmus plicum sustinet, quæ & spicus & spicum à Cicerone dicitur in Arato. Spica granum & aristam, quæ uti acus eminet & folliculo siue gluma. Sunt autem aristæ partes in spica prime, quæ à Græcis antherices dicuntur & atheres. Est autem aristæ proprie in hordeo ut Galenus interpretatur, cuspis ipsa spica: nam & menti pars extrema hoc nomen inquit habet, cum aristam non habet. Muticæ spica dicitur quasi mutia. Vaginam uocant sub qua latet herba. Stipula: sunt folia culmum ambiens: est autē culmus, idem quod & calamus, cum spica penitus oriuntur in summo spica iam matura. Quod minus est, quàm granum, uocatur frit: quod uero ad culmi cacumina in firma spica geritur, minus item quàm granum, uruncus appellatur. In tritico marcescente gurguliones, hoc est, bias (sed legocias, ut in pumice notauimus) à Græcis uocatos, innasci ferunt, ut in faba midæ. Gigni & cantharidem in tritico (scarabeus is parvus est) ut phalagion in eruo conficit. Tritici multa discrimina: sitanias uocatur: genus id siliginis trimestre, ut Columella uoluit, frum mentago dicta Theodoro, differens crassitudine surculorum, quemadmodum inter hordea crithanias hordeo nominata. In nomine sunt Assyriū, Aegyptium, Ponticū, Thracium, Siculū, Africum, quod facile absolutum folliculo: nam Thraciū multas habet tunicas. Habetur & chachrydias siue chanchrys, culmo crasso, quod etiam Africo tribuitur. Ponticum leuissimum, Siculū ponderosum, ponderosius Bœocium: deprehenderit hoc athletæ. Ponticum & Aegyptiū sine lolio nascuntur, item Siculū, præcipue Agrigentinum: q̃ cū Siculo melampyron nasci perhibent, sed innocuū, neq; lolij modo graue, caput uerentis. Nominatur & Alexandrinū, oblongo semine, quod fortasse idem sit cū Aegypto, & Calymno, ex Calydnis insulis à Ptolomæo Philadelpho in Aegyptum conuecto. Dracontias & Selenusū & stengias crasso cuncta calamo, tã aliud trimestre, aliud bimestre. Sitanium uideo idē esse cū trimestri, satium Dorice uocatum, & Attrice ticinū, quasi pus, ut Photioni placet, de q̃ & paulo supra dixi. Galenus sitanij inquit est triticū in istis anni, id quod uere feritur. In Triculen to Plauti etiano pro setario legitur mēdose: castigauimus: Non possunt, inquit, militares pueri setario exdudicere. Euboicū certē intra diē quadragesimū à satum leuit, firmat ac pōdere præcipuū, nō ut trimestri metitis, ob id cibario panis utile: nam & fursuris pars habet, inuentu raris. Bimestria in Achaia & Sicilia primu enēre, pars fecunda, sed cibo facilia & iucunda. Olynthi & in Eubœa apud Cernithi genus effoditur terræ, qua tritici obliuētēs, diu id feruāt. Trimestria ubiq; sunt, uerū inuitia, & infirma singulari calamo. In Asia quodā loco trās Bactra frumentū nucleis oliuæ par nasci referunt. In Pistoris tam firmū, ut multos Macedonum largiore usus eo saties premerit. Omni frumēto nocent imbres in flore. Item iam pla-

nē crassata, triticū plusq; hordeū uliginē cōmear in lolium. Camatias in Thessalia tritici genus est, quod admissio pecore degenerat Babylonē: propterea nihil patitur, etiā bis derosum. Preter lupinū nihil æque in spica durat q̃ triticū. Durat bonitas cibo in Petra Cappadocia in septuagesimū usq; annū, unde Cappadocio panis summa gratia, qui & ἀπαλὸς à teneritudine uocat, & Syronæ lingua lagman. Addebatur in massam lac & oleum, & salis quantum satis esset. Laudabatur & Parthicus, quē alij aquaticū uocabat: quo niam aqua traheret à tenui & spongiosa inanitate. Triticū ex aslo troadis in panē sibi reges Persarū querebant. Varro conditū diligenter triticum, quo uentus non perueniat, mansurum ad annos promittit: Vis tritico tanta, ut cados plenos siccet. Panificij multa & nomina & genera: Ex his nauticū intelligo qui uetus atq; siccus à Dioscoride in medicinis dicitur, fortasseq; biscoctus: quem Græci ἀλφίτων appellant: Syncomitis uero is est quem alio nomine autopyron uocari Galenus ait: quoniā ex omnibus farinæ siue partibus detractio nulla cōstet, inter ptyriam, & semidalitron, hoc est, fursuracū similaginetūq; medius: Etenim autopyros, siue qd idem est autopyrites, & xeropyrites, & pyrnos Athenæo, siue pyrnos Hippocrati, à tritico nō ab igne flectit: propterea qd nō ex tritici parte sit, sed ex ipso planē toto. Dicitur autem anectēs ab Hippocrate: item syncomitis quasi confusaneus, quoniā castratus nō sit, sed omnia simul tulerit, fursures, utriculos, & similia: idem ferē qui sordidus, cuiusmodi Neronem usum legimus: quāquam Paulus sordidum à syncomitis separat. Utriculos in autoribus intelligo, id quod fursure melius est, & similia deterius, hodieq; Ferunus farinæ uentres uocant. In Cisalpina Gallia redundago appellatur: medianum in Venetia provincia. Autopyri panes dicuntur, & qui fursure tantum leuiter succreto sunt, qualis ferē cibarius & secundanus est, & qui rubidus fortasse à Plauto pōeta dicit. Hoc autē fieri solet, ut Galenus ait, quoties triticum generosum non est: Generosum inquit uocatur, quod similaginis plus habet quàm fursuris: Nam similago & simila prorsus idem sunt, semidalis Græce dicta. Nimis fortasse multa de hoc pane sed consulto, quia parum constabat inter eruditos qualis esset, præteritum cum in Plinio illa uerba legerentur: Ad omnia, inquit, hæc fermentatus qui uocatur autopyrus, utilior: Nullo non accipiente fermentatum panem cum dem esse cum autopyro: Non hoc significari uoluit Plinius, nec tantum hallucinatū fuisse homo seculorum omnium post Varronē ferē doctissimus: sed quod fermentatus panis non quicunq; sed qui sit autopyrus, ad omnia ea quæ dixisset, utilior esse uideatur: quod & duobus locis seorsum Galenus præcipit: in altero panem autopyrum, ut secundo ad Glaucodem uolumine in altero fermentatum ad omnia illa præferens. De simplicibus facultatibus, libro nono. Sunt qui fermentatum panem apopyrian uocant, ut Cratinus: non à tritico, sed à pruna, quoniam torretur, ut ipsum nomen indicat. Farinā Græcia leuiron & alphon & haliparton & aliaon & aliton uocant: quamquam alphia polentam ferē significant, & alia farinam coctam, & haliparton agrum cōstitutum pōetis. Fermentum zymen. Cyribia, quenos excreta tritici, aut hordei, ut Columella, siue ut Paladius creturam uocamus, autore Iulio Polluce. Pho-

tion & Galenus etiā ipsos futures quos Græci aphærema & ptyra, nos etiā canicas & apuldas uocamus: unde canicæus panis, id est, futurus Pacuio. At ceribia in Cratino idem Photion pro fabalibus interpretatur: pepalem uero Pollux ipsum faring pollinē. bioscorides & Plinius pepalē alphon pro polēta capiunt ferē. Triticū Syracusani spyron, nō ut ceteri græci pyron uocabant: panē *ἀπὸ πυρί* quē Phryges beccū, ut testis est Herodotus, a pfectione, quā rortūda eius forma sit, ut Athenæo placuit. Triticū summa tria genera obseruāt, qui minus operose persequitur ista: Primū robus pōdere & nitore præstat: alterū siligo, cuius cādor & species in pane præcipua, sed pondere deficitur: Tertiū trimestre, de quo supra diximus stianum uocari, cuius usus agricolis gratissimus inopie subfidio: hoc & candidū esse dicitur. Nunc locusest, ut panis genera dicatur *ἡ breuissimē Zymites*, hoc est, fermentatus, qui & naktos dicitur: *ἡ γὰρ naktos* quibusdā placenter genus est. Contrarius huic azymos, qui & daratos: nam acidus & squarolus græce oxypleps uocatur ab Actio, febricitantibus eum dante, quibus uenter fluat. Hunc Aegyptij cyllastin dicunt. Alij ex hordeo confectū accipiunt: qui cyllastin uocetur: Herodotus ex siligine: semidalites ē similia. Dictam uero similam à Cere trepauerim, quā Syracusī Simaliā nominant & Sitona. Aleutites à farina. Cyrites à polline, condrites ab alica, siue zea. Desyncomisto, & autopyrite, & apopyria diximus. Item de Cappa docia, & hapalo, Parthico, & aquatico, & rubido. Ipites & caminites à coquendiratione: Item æscharites à craticula sub sinē cœne cōiuiis apponi solitū, & intingi passō usq̃ ad ebrietatē legitimā: Hic & inuoluebatur atq̃ ita ut calebat intortus, Athenis maxime placebat. Coniectari liceat id genus panificij, quod à tenuitate, & candore nebulas ferē uocamus, æschariten ueteribus fuisse: nam & apud nos uulgari uoce ita dicit, una tantū detrita priore litera: hinc & æscharulas mulieres à panificio dictas crediderim, cuius uerbi mentionē in Plauto ut ceteros taceā, inuenias. Tabyrites pusillus erat: Achænes prægran dis, quo in Thesimophorijs utebātur Atticæ mulieres. Qualis aut sit a punites, Polluci nō cōstat. Præfertur omnib⁹ sanicatis usu à Galeno cribanites, siue qd idē est clibanites, hoc est, ut Varro, textuaceus, à clibano quē Attici cribanon appellāt, nostri textū, q̃ in textu calido coquere: usas comitalib⁹ matronas scribūt. Cribana uero placētæ genus sunt, specie mammofa. Encryphiaz qui & agoræus, hoc est, forēs, & uenalius, & Atticus uocari solet. Dipyros qui & pyrites Polluci delicatus fuisse dicit, siue idē qui dipynites ab Hippocrate cognominat, siue alius: quia porro dipyrites ad aquā intercutē cibo utilis existimāt, cōiectari liceat, pro bis cocto pane capiendū esse eum. Laganā siue laganā minimo pōdere: *ἡ γὰρ leuior* & tenerior etiamnū à carbone dictus epanthraxis Saturnalia præberi solitus, nihil ut quidā putant, ab encryphia differēs: uterq̃ subcinericius est. Iam homoros, & stactes, & encris, & aliphaites, & hemiation, & placites, & qui tyrontes à caseo nomen habent. Encridi similis est physicillus, quo Spartani utebant in sacris epulis rapieffigie. Magnos & fordidos panes Cilicios uocabāt: & à colore subnigro phæos, sicut agelæos, qui à nostris cibarij & gregarij dicunt. Ornides ab oryza siue ab semine quodā Aethiopico, tam simili sesāmo, ut difficile possit internosci. De siqu

Aegyptia sycaminites sit. Collabus, siue quod idē est collix, & per diminutionē colliphio, ut xyliphion, ē caseo recenti cōstat: de q̃ Iuuenalis & in Petia Plautus. Hic & crimmatias & chondribos quoq̃ dicitur. Sunt & maconides uocati: sunt chrysofolia, sed ex li no ac melle. Aegyptij sunt, & ad sistendā aluū utiles, ut inquit Strabo, caces appellari. Sunt collaræ siue collyriæ: quos Plaut⁹ nō collaras modo, sed colluria uocauit, & collyria ut exitimo in Persia: & collyriadas sacre literæ: is olei mitione cōspersus intelligit à Hieronymo. Sūt obeliæ Baccho sacri, ita dicti, uel q̃ obolo Alexandrie uenirent, uel q̃ in ueru torreretur. Sunt eunitæ, aut etiam enitæ cognomēto lecythitæ. Sunt pani, unde apud nos uocabuli: etem Mestapios redundantiā & saturitatē panis appellassē et estis est Athenæus. Varro tamē panis uocabulū à pano duci putat, q̃ figurā in eo faciebant, ut in lana mulieres. Habetur & cnefos à nidore: Item banchylos, & thronos. Spodites idē uidet esse qd banchylo. Patrias nō bilitauere Cypr⁹ & Cappadox, de quo supra dictū est. Artopitius uero panis à clibanite ac furnaceo differre eo dicit, q̃ hic ē durior fermento splēdidus conficitur: illi fermentū semper perq̃ tenuerrimū desiderant. A boletiforma boletinus, papa uere accepto & fumosi casei colore. Streptitius, siue streptos, ex la cte, oleo, pipere conficitur: aut olei loco, adipē. Artolagana pusillū uini, lac, piper, oleum, siue adipē, olei uice cōtinent. Caprydiā sunt quæ alio nomine tracta dicimus, ut Athenæo placet: cuius uocis & apud Catonem mētio est, ubi de placētā, & spira, & scriblata loquitur: quo uerbo ipse non panificiū, sed portiones tota materia detractas, & in solū, hoc est, strātū in tabella, siue alueleo diffusas cōgestasq̃ significat. Proinde in hoc uerbo Græci loquunt: *ἡ ἀπὸ πλάκας*, pro eo qd est tracta facere: hinc & ceta cādida tractū dici à Græcis q̃q̃, aut ore Photion, à q̃ uerbū *πλάττειν*, pro eo qd est perficere ac subigere, ut alba fiat cera. Paulus q̃q̃ cerā tractam ad plocas cōmendat. Sīt & cubi, hoc est, quadranguli aut etiā quadrati, ex oleo, anetho, caseo: quanq̃ Athenæus eos qui iromæ quadra uocantur, incisuris præcinctos, & bomilios à Græcis appellari prodit. Thargelos qui & thacysius: ita dici panem uoluit, qui primus ē nouella melle fingitur. Est & samites & pyramus: quē nonnulli eundem cum sesamite trepauerūt. Thiagonos dijs coquitur in Actolia. Sūt & dramices & araxis: q̃q̃ dram in Macedonia uocari qui panis in Thessalia dicitur, nonnulli scribunt. Ericitem uocant, qui ex confractō nec excreto sit tritico. Blemā porro calidus & egregie subactus ac dephitus panis est apud Seleucum: quem nostri forte despiciū uocent, ut est apud Catonem: quanquam in Catone sunt qui speuritū à festinatione legendū putant: nec ut arbitror male. Brattimes & ptyrites idē est qui fursuaceus, à quibusdam euconos & teuconos appellatus: Nam spolea eum panē Græci uocāt, quæ necessarii dicitur a cognatig: uelicitur. Est & phacinos de lente, populatis Alexandrie, ut scribit Athenæus. Operis pistorijs genus est & quod buccellatū ab Paulo, & Actio uocāt. Iustiniāni codex & Marcellinus inter militaris uocant: nō geneta connumerat, quæ bis coquatur, à buccā dictū: est aut buccæ, ut ex Suetonio colligit, idē ferē qd bol⁹. Sūt qui buccellatū fermento puet carere. Plautus rubidum panem cum nominat, uidetur nauticū accipere, quā sit bis coctus. De placētis ali⁹ mihi locus est.

est, & sanè prolixa mētio ea foret. In amylo dicētur, ubi & panis quēdā genera, sed admodū pauca, necessario libabimus: alioqui & placenta panis est, ut Athenæus inquit. Illud obiter annotasse non fuerit inutile, genus id quidriticon & itirion Græci appellāt, à nostris libū uocari, & neutro & masculino genere, ut Athenæus testatū reliquit. Ego nō libū simplicitē sed libū luminalē interpretor, ut in amylo docebitur. Catolū ex caseo & ouo cōdidit: ut ait legumen, ita & triticū si coquas, appellatiōnē habet nouam. E pīso & faba etnos: ex lente & aphaca, lētucū lam: ex tritico pyanū, & ut recētiōres malunt, holopyron uocamus. Aliqui fruges omniū generū in pāslo coctas pyanon appellāt, ut mirer Iulium Pollucē, qui pyanon quasi cyamon pro faba cepit. Chidron uero coctū triticū, ut Athenæus inquit, seu frictum far: ut Hieronymus, quasi molā salām. Est autē molā salā tostum far, sale confersum, quo uictimæ perfundebantur, uolochyon Græce dicta. Iulius Pollux chidron sorbitionem ex tritico uirētis factam inteligit: quia uirens triticum chicia ab Aristophane dicatur. Nam pelanos apud Aristophanem, à quibūsdam accipitur pro specie leguminis. Pausanias placentē genus accipit in panio. Euripides pro qua cunque re concreta gelata ue.

HORDEVM.

CCCCX.

Hordeum chymistæ lutum Vulcani appellāt in Græcis codicibus. De hordei radice, ortu, herba, flore, spica, in tritici mētiōne diximus. In Aegypto mētiō sexto mense, alibi multo tardius. In Chalcia Rhodiorum insula celerrimè quodā loco. Item Messania in Sicilia, ubi milas uocat. In India syluestre nascitur, iocundū in panis esu. Hoc equis appositum Alexandri, necabat eos primo, deinde in palea exhibiti, paulatim desit esse noxiū. Fundit hoc in brachia, quēdammodū & crithanias, hoc est, ut superius dixi, hordeago. Ad Cedropolin in Thracia quod nascitur, iumenta non attingunt: cuius rei causa, ut Theophrasto placet, malus odor, etiā nō sentit, homini. Genera hordei complura: alijs granum rotundius & breuius, alijs maius, oblongius, & rarius. Aliud candicat, aliud uergit in purpurā: copiosius farina ualidiusq; q̄ candidum. Iam aliud binos spicæ: uersus, aliud ternos quaternosq; habet, item quinos: nullum tamen plures senis, cui spica folio perq̄ proxima est, amplitudinē & crassitudinis maioris: hoc Achilleis & Achilleas ab Hippocrate cognominat: ob id propensius obnoxii erugini. Erythron Græci uitiū hoc appellāt, pleniusq; ferè accides, quod & rubigo frequetius dicit, hordeo q̄ tritico infestior. Eteocrithon genus hordei est turū à rubigine, quoniam incuruū nascitur. Sunt & leptides, à tenuitate dicta recētiōribus Græcos: nam amphicaustis in tragedia hordei mōtanum significat, quod eustron uocat. Differt polentā à farina hordeacea: q̄ totte polēta, non farina. Polentam Græci alphita, non ut in Palladio corruptè legas, alphica. Item gerania infrustum nomine q̄ percutiuntur ligneo, & enaulemata, præsertim cum uino & oleo. Hordeū erithen & cri, & proconion poētæ: q̄q̄ & triticū tostu proconion q̄q̄ dicit, & genus item fuscitū Photio. Galenus in Hippocrate proconium polentā ex hordeo recenti aut etiam ex hordeo nondum tosto significari tradit. Hordeacei uero panis genus unum mazam nominat, inter hordeaceos panes deterrimum, Aëtius polentā horde-

aceam, quæ sic humido cōspersa, mazam appellari cētis est: quæ uidelicet mandatur cruda cū destruto uel melle, uel alio quo huiusmodi. Mazarum uero plura genera siue nomina: Phyllen Attici uocant, quæ nō multum subacta sūt & anthemā, & ephicois, & concon, & tripte, & cardamale dicta, & berex siue barax: alij caryx etiam caryceæ: à nigritia nomen habens, nō à nucibus. Distinguitur berex à caryca Iulio Polluci, & tolypa, & thridacina siue thridacisca, & anemolos. Item à uino cēnutra, sicut à melle melituta. Nam Achilleos uocata ex hordeo cui Achilleis nomen est, constare creditur. In nomine sunt & Cypria & magidis. Hesiodus amolgeæ dictæ meminit, quæ nihil aliud sit, quā recens. Iis uero quæ in sacrificijs Trophonij degustandæ præbebantur, melitute, arestæ, & hygieæ nomen erat. In summa laudatur Lydia, caryceæ Eretria: præfertur omnibus conchos. Mazza in Latino non habet nomen, nisi quæ interpretetur panis offam, ut ipsi quandoq; fecimus, & ante nos Theodorus Gaza. Offam, inquit Festus abscisum globi forma nominabāt, ut manu glomeratam pulrem. Frumenti genus est quod ueteres ador & edor, & semen adorem, & far uernaculum, aut etiam uermiculum uideo appellasse, ab edendo, uel quoniam adurebatur ut tostum fieret: ex quo molā salā in sacrificijs & adorea pro laude: nam hordeum etiam si far quandoq; dicitur, leguminibus ferè ascribitur, quia ex eo pīšana fiat ut Columella inquit. Inuenio tamen & sacrum hordeum à Græcis uocari denudallidā: quasi eo pro farre ac molā salā ufos existinare liceat, si Photioni credamus, qui & canchryn dici frictum hordeum notauit. Galenus plurali tantum numero canchryas pronuntiat: singulari uero, nō hordeum frictum, sed radicem libanotidos, hoc est, roris marini ab Hippocrate significari commonet. Contrafactum porro indiligerent hordeum, ericidas idem Hippocrates appellat. Seminis porro adorei quatuor sunt publica discrimina. Far Clusini candidius ac nitidius: Far quod uocant uermiculum, rustico colore: Far candidum maioris utrunq; ponderis q̄ Clusinum: quarto genere semen trimestre halicāstrū uocatū, pondere bonitateq; præcipuū. Hordei uero illæ differentie. Cantherinum quiddā & exhausticum appellat, animalibus quæ ruri sunt pascēdis utilius, & homini quoq; melius q̄ malum triticum, fragili culmo, & nulla uestitum palca, celeriterq; decedens, ac tritu facile. Aliud genus est quod distichon siue galaticum uocamus, ponderis & cādoris eximij: quod oryzam esse quidam interpretantur uocet nostra. Græci quemadmodum far ipsum uocant, nisi hordei appellatione contineri dicant, haud scio reddere.

ZYTHOS ET CYRMI.

CCCCXI.

Zythos & Zythum dicit, & græce uulgo phocadion. In Aegypto fit, ideoq; à poëtis quandoq; Peleusiaca potus uocatur. Madesunt aqua fruges, donec resoluantur in liquorem uino similem. Inebriat hoc & acre gustu est: quoniam ex putrilagine accecente constat. In Mediæ montanis septentrionali sitū, gentes uni loco succum ē radicibus quibusdam ebibunt. Cum porro fortasse hoc fit, quod ceruissim in gallia uocant, & curmi curmithos infestitur. Possidonius homo Stoicus non curmi sed corma appellat. Inuenio & celiam & ceriam, unde sicera & sicerites uinū forte nominetur: quam Hieronymus in ea uoce quā uult Hebræicā in-

telligi, accipiendum esse dicit omne portionis genus, quod inebriare possit bibentes. Id aut pluribus omnino modis ac nominibus, ratione tamē una ferē ubique. Hispani iam & ut uisitare ferre genera ea docuerunt: spuma uero dum resoluitur frumentum cōcreta, utuntur fermenti uice: quam ob causam leuior illis q̄ ceteris panis est. Aristoteles pinū uocari tradit, quod ex hordeo fit uinum. Hoc qui sunt temulentii, non in omnem partem cassabundos correre ut ceteri, sed retrorsum data xat, ac supinos. Paulus uisū quod ex sordibus uellerū elutis cōficitur, pinon uocari putat. Sophocles, & Echylus, uinū ex hordeo bryton uocat, non zythron aut pinū. Est & apud Theophrastum bryton. Hellenicus & ex oryza bryton fieri cōmemorat. Fit & emilio, ut Athenæus testis est. Nā cyceon Homericus aliud genus erat: id ex mixto farina caſeo cōſtabat, in sorbiciōe usum. Sunt qui pinon pro uino capiāt, quo lanx cū sordibus suis lauatur, atq̄ ita siccatur reponit. Illud notatiōe dignū existimamus, diofcoridē ebur scribere maceratum zytho facile tractari. Plinius nō ebur, sed ipsum animal tractabile hoc modo reddi pradicat: ceterū, inquit, elephantri mitificanē hordei succo.

Z E A.

CCCXII.

Zeam nostri semen dicunt. Hec si feratur pinisita, hoc est, tusa, trāsit in triticum, ut tiphā: idq̄ non protinus, sed anno demum tertio, nunq̄ contrā. Nihil hac robustius, terrāq̄ magis exaniens radice alta, multiplici, culmo numeroſo, fructu facillimo, cunctis animalibus iucundo, simillima tritico alpeſcenti, que madmodum & tiphā: solum non quocunq̄ ut tiphā, sed lætum pingueq̄ desiderat. Zea & in bromon dictā cōmeat. Dionysius Halycarnaeus Latine dictā fabiliā existimat. In Carone porro fabulus albus, fabā candidā, ut arbitror significat: quam bubus cū languenti, dari praeipit: ut in Columella deprauate legi purē, balbulos albos in cura boum pro fabulis albis. Diofcorides certē papauer album à Romanis fabiolū uocari tradit. De hoc lectorem ad fabæ mentionē differo. Zea zeteion, & zontion, & zoston apud Aristophanem in comœdia, quæ Babylon inscribitur, locus uocat quo seruitia punita mittebātur: meminit & Pollux ad quod allu sit poëta noster comicus in Añnaria (ni fallor) cū dixit: Qui polentā pransitant, & ubi uiuos homines mortui incurſant boues. Gregorius Tifernās in Strabone zeas interpretatur, rustica potius q̄ Latina uoce speltas: credo quia Rhēnus Palæmon prior usurpauerit in carmine de pōderibus ac mensuris, q̄d tñ Prisciano grāmatico inscriptū circūfer: octo inquit speltas pendere scrupulum.

CRIMNON.

CCCXIII.

Crimnon fortasse hoc est, quod cremor Latine dicitur, ut succus à cremore differat sola crassitudine. Interim confunditur. Cornelius Celsus cremorem prisanæ pro succo ferē accipit: crimnon & hordei genus est Photion, & cyceonis Homericum liquamentum. Hippocrates crimnodeas urinæ pro crassis, & ad similitudinē farinæ tritici corporis lentis accepit, ut Galeno placet in Amphorismis, sicut aliās eruo, aliās frōdibus, aliās furfuribus haberi si miles docemur. Nam crymodes aliud est: Ita uocatur febris quæ pulmonē sacrisignibus correpto prouenit: sicut lepyria, quæ stomacho: & typhodes, quæ iocinore. Pulcē Græci polton & poltaron appellāt.

Plinius calidā inquit potionem in pultario poposcit Offilius: ut pultariū aut pro uase, aut pro sorbitionis genere acceperit. Puls certē ut Aëtio placet, omnis sorbitio uocat, quæ aut de leguminibus, aut cerealibus granis coquenda in succū resolutis cōficitur.

O L Y R A.

CCCXIII.

Olyra siligo à nostris uocat autem Plinio: Carioni quoq̄ g genus est tritici. Siligo locis aperitis celstisq̄ serēda, & ubi sol quam diutissime sit. Vitium est siligo tritici: nam omne triticum solo uliginoso, post tertiam sationem conuertitur in siliginem. Est & olyra Galliæ propria, quæ cognominatur arinca, uel italicæ copiosa. Theophrastus olyrā folliculo describit multiplici, ut tiphā, sed bronzo & zea molliorem firmioremq̄. Sit autē siligo, quam nunc rustici fecale uocant, ambiguum est quibuscūq̄, non mihi. Plinio certē farraginē & pabuli genus est fecale nominatur, occurrantū desiderans: Hoc inquit Taurini sub alpis uasiam uocat deterrimū, & ad arcendā fame nō utile: fœcunda, sed gracili stipula, nigritia triste, sed pondere præcipuum. Admiserit huic far, ut mitiget amaritudinem eius: & tamen sic quoq̄ ingratissimū uentri est. Nascitur qualicunq̄ solo, cum centesimo grano, ipsumq̄ pro lætamine est. Farrago autē ex recentissimis pradenfa feritur, admixta aliquando & uitia. Eadē aliquando in Africa fit ex hordeo, unde hordeacea farrago dicitur. Hanc esse puto quam Græci uocant cratin, ut est apud Aristotelem, siue quod idem est grastin: interpretantur enim grastin uirens hordeum: alij crastin dicit, & fœcunum seminaridum intelligunt, utiq̄ Pollux, quod & poam & chilon uocat, atq̄ chonton. Fit igitur optima farrago cum cantherini hordei x, modis iugerū obſeruit. A' farragine in farraginā deducimus, pro loco ubi farrago feritur. A' siligine differt radicula, quā pastores consiliginē uocant, in Marſis montibus frequentem, omni pecori maxime salutarē. Corrigēdis in Columella est locus, ubi de cōsiliginis usu loquitur: circūſcribēdum esse ita manāte sanguine tanq̄ olite reductū appareat: legendū est, tanq̄ oliterē dū cū apparet. Hoc in trāsitu monuisse quid offuscet.

A T H E R A.

CCCXV.

Atheram ex olyra constare Plinius, Diofcorides & zea scribit, Aëtius etiā ex amylo: Familiaris Aegyptio athera ex siligine, hoc est, olyra, quæ ut dixi arinca dicitur. Julius Pollux atheram uocat pultē ē miliacea farina, in Plauto atherathriō compositum uidet ex athara & tritho, quod placet aut libi genus est, dictum à folijs fici quibus circūdata: aut seorsum utrunq̄ legant, qui eius poëtæ studiosi sunt. Potest & athara & oachrion legi, ut est apud Alexin comœdiæ scriptorē: à quo locus in Plauto festiuiussum ex persona coci sumit: qui & cādauili mentionē habet: erat aut canda uulos sine cādyllos, miscella ex carne cocta, pane, caſeo Phrygio, ut Athenus inquit: Photion, ex lacte ac melle, qui & amatæcem tradit herociti edulū fuisse. Dicit & pinula ea quā ſu b uentre habet thyndides athera, ut inquit Aristoteles, sed ut sit tribachys.

T R A G O S.

CCCXVI.

Tragos cognomine *onidē*, hoc est, cerealis, ut ab herba trago diffingatur, frumentū genus est. In Hippocrate quid sit strygis, quod ipse leuius esse tritico, & uentri magis soluere testat, non comperimus: hic pro trago strygitæ capiat.

BRO.

BROMOS.

CCCXVII.

Bromos correpta prima, semen est spicae ferentis herbae, de qua & libro quarto sepelita mērio est: hic enim de grano ipso potius, quia sit inter fruges, dissertur. Semen hoc natura maxime operuit, ut Theophrastus inquit. Radice copiosa innititur, multiplici culmo sparsa, sylvestri ferē habitu quasi agriops: inter uitia legētis haenae modo nascitur, dependens ut Dioscorides inquit locustis, ut Plinius, Iolis. Poetae bormon & bormacem quoque dicunt interim.

ORYZA.

CCCXVIII.

Oryzā Galaticū oryzon uocauit: quidā hordeū Galaticū quia graue sit atque cadidum, appellat. Peregrinū initio semen, ex Indiaque illatū, simile zea, aspectu solī magna parte, in aquis cubitoꝝ quaternū altitudine, ceteris effundit non spicā, sed milij modo ac panaci iubam. In Baetrianis quoque ac Babylonis & Suside atque Syria inferiore gignitur: in Italia uero multis locis. Indi hac farris seu zea modo pistam, reddunt concoctū facilem. In eadem gente bosmorus frumētī religiosi genus traditur, tritico minus: inter amnes prouenit, ex cūsum arcis torretur protinus: lura mētoque adigunt messorum, non absorpturos id se prius inde quā coxerint, ne semen in alias terras communicari possit. Strabo autor. In Diodoro bosphoron non bosmoron, corruptis exemplaribus inuenias.

ALICA SIVE CHONDROS CCCXIX.

Alica Theodorus hac interpretatur, quā Graeci *ἀλική* uocant, quod & Plinius quandoque facit. Paulus alica differre à chōdro putat: Alix inquit similis chondro est natura, nisi quē uentrē magis supprimit. Plinius alica, inquit, res Romana est, neque Pompeij magni ætate in usu fuisse traditur, prorsus alicā uentfertur sine dubio. Pisana Graecū uerbū est, & pisana quoque dicitur, & olim Graecae dæfana. Chōdros porro, ut Paulus ait, similis est tritico: plus tamen lētoris habet si commāduetur. Hippocrates chōdron dicit esse utilissimū cibi forbitionem. Aëtius chōdrū alicae cum dicit, pisanā alicae significat, hoc est, alicā farris modo fressam in forbitionis usum, ut pisanā. E' zea pistā quemadmodū chondros fiat, ut ex olyra quoque generosa tragos, rei rustice scriptores Graeci produūt. Inuenio & hadron dicit quā sit chōdros. Alix & alicū uocatur, quā alicū Callimacho pro chlamyde accipitur. Thessalico uocabulo chondros & cartilaginē significat, quod nucleū in thure, praesertim ceu quendā callū, quē & pyrena Hippocrates appellat. Omnino chondros ea frumenti species à graecis intelligitur, quā à nostris far siue farrum uulgo nuncupatur. Archigenes far chondro potius simile quā idē uidetur existimasse: Far inquit Romae, ut chondros graecis, conficitur sanitatis usu. Frumētum aqua maceratum nudatur cortice, mox siccatum in sole tūdatur, sed leuiter, ita ut singula grana in partes quaternas quas uē dissiliant. Idem Archigenes (ut meminit Aëtius) pulve ad dysentericos ex farris quēdam cōficiatū docet: Ad eumque usum far inquit Clusinum de sidero: ita enim legendū credo, non illiusum, ut omnes Graeci habet codices. De Clusino farre dictum est supra ex Columellae sententia.

MILIUM.

CCCXX.

Milium intra quadragessimū diem metitur: Caulis ei harundineus: Flos lanugineus ut

frumento: largior aquatio, detrahit folia. Plus centum manet annos, si condatur quo uenti non perueniāt. Nihil leuius, mollius, aut coloris capacious milio est. Farinā milicē seu fractū milij, sunt qui scitum uocari putēt in Horatio: Sunt quibus uasis potius appellatio ea uideatur, ex scroto id est corio confutū, quod genus Graeci thylacos, id est folles & quasi pascēolos dicunt, in quibus tamen, ut est apud Aristophanem, panis quoque seruabatur, cuiusmodi & panarium & panariolū à nobis commodē uocari potest, quacunque constet materia: quae uox in Varrone & Pappino pōbēta & Maruali, Suetonio Tranquillo legitur. Nos de scroto quid sentiamus, in cicere dicimus: nā miliarij uas à pondere, non à milio nomē habet. Est autē in quo excalcium aquae, ut Athenaeo placuit, quod & Graeci aliqui appellat, ipso lebetā id est caldariū: Porro milium à miliaria summa deriuatū, non à Graeco, Festus existimat: apud quos cenchros & Straboni cenchrys dicitur. Hippocrates paspaleū uocauit: Varro milium à Graeco deducit: nam id melinē inquit uocant. Dioscorides & Theophrastus melinem pro panico intelligunt. A' milio aues quēdam miliariae dicitur, ut eidem Varroni placet, quas ego non assimilare credere, quas à milio Graeci cenchridas appellant, quae illae uideantur in Latino tinnunculi uocari.

PANICVM.

CCCXXI.

Panicum helymos, etiam melinos à Theophrasto dicitur. Nelinos porro cantionis Graecae nomen est. Item elynos siue linos lugubris ciuitatus, quem nos lesium dicimus. Tibia genus quoddam apud Sophoclem uocatur helymos, ut in harundine docuimus. Quadagesimo die absoluti cōstat, ut aestiuā omnia. Calamus harundinis ut milio. Flos lanuginis. Durantissimum inter fruges panicū: ideoque Dioscorides medicus mel frugum merito appellauerit. Seras uermiculos, & quibus serici uellus meretur, panico aliquid triennii apud Seras populos tradit Paulianas: quinto anno harundine recenti, quam pēdoliū paluū auditis carpentes, dissiliant: alioquin non ultra eum finem uicturi. Ex utero bombycem eam pectū, multo fertiliorum quā uiuentium detrahit pedibus, quos araneorum modo sub arbore trecentium octonos habeant: esse autem corpus ipsius amplitudine scarabei maximi. Seras ipsos in Aethiopia sinum rubri maris intimum colere, uel ut alijs inquit placuit, in Scythia Indis contermina, qua insule iacent Seria & Abasa & Sacea, nihil contendo, uerum falsum uē dicar. Scio & ab alijs de hoc iactata. Illud testari bene est, seras uermiculos iam pridē in Italia tam multos ali Vincentino maxime agro, ut non alia re prouentus quibusdam maiores cōstent. Sed nos non panico, non harundine, sed mori folio uesci: ob id, multis locis plātaria sunt eius arboris frequentia. Circa Mediolanum quoque Abiterno agro seritur, aliās non magno opere in illis uisā regionibus, nunc crebra in latifundijs Ludouici Sfortiae, clari ætate nostra principis praedij eius ad Ticinum amnem uilla magnificētissime substructa.

SESAMVM.

CCCXXII.

Sesamum & sesama uocatur, & Plauto poetae sesuma, caule ferulaceo, flore foliaceo, ut irion. Quadagesimo perficitur die. Genus ex eo candidum praefertur dulcedine, quod & in ceteris guminibus.

guminibus cōtingit. Crana eius in siliquis distincta, ut lupini, sed peculiari quodammodo septa. Viride nullum attingit animal. Nihil ita emacrat solum, ut pote cui crassior & multiplicior harundo sit q̄ milio, & radix quoq̄ numero hor. Sefaria & sefania quādoq̄ legas corrupte in Columella pro eo qd̄ est sefama.

L O L I V M. CCCXXIII.

Lolium ē tritico & hordeo corruptis uligine seminibus, elino quoq̄ nasci nō desunt qui affirmant. Negāt uernā esse frugem, sed hyeme ita tum incūte proflire terra, folio angusto, hirsuto, pingui, non tunicis ut auena multis, sed nudum: nec pertūdatur. Quidā non ex tritico aut hordeo, sed inter ea ut in Sicilia melampyron provenire putāt. Inter lolia Rosculi uisuntur, & carne tantū non ē cortice arguena, ut ceteri. Lolii greci *κλῆρα* uocāt, etiāsi Calimachus pro pila quoq̄ & globo *κλῆρα* accipit. Plinius certē aliud uidetur genus existimare lolium, aliud aeram, unde farina *ærina* dicitur. Aera, inquit, granū minimum est in cortice aculeato. Cum est in pane tā æra q̄ lolium inebriat, celerimeq̄ uertiginis facit. Aiunt in Asia & græcia balneatores ad pellendā turbam, solitos *ærā* intjcere carbonibus. Triticum hæc circumligando se strāgulat. Plautus quoq̄ lolii oculis officere testatur in Milite: quanq̄ nō lolio, sed oleo corrupte legebatur hoc modo: Mirus oleo uictitaret & tā uili tritico. Quid iam? quia lusciosus es. Sed scribendum ita fuit:

Mitust' lolio uictitare te, tam uili tritico.

Et reliqua, Ouidius:

Et careant lolis oculos uictantibus agri.

A M Y L V M. CCCXXIII.

379 **A**mylum ex omni tritico, ac siligine, ut Cato uoluit, sed ē sitanio, id est trimestri, quod itē siliginis genus est laudatissimū. Inuētio eius Chio inclūe debetur: unde commendatissimū Plinij temporibus. Probatur leuitate ac leuore: utiq̄ recens sit. Quia uero etiā placente genus est amylyon, de placentis agere tempus est, quod & in tritico pollicitus sum. Ergo patriæ nomen habent Paria, & Samis, & Rhodia, quā & coptā & coptoplacunta nomināt, insignem duriciā, ut Martialis placet. Accipiebat hæc & papauer, & mel, cui simile uidetur. In Festo coctum dici legimus & aliubi coccentum, Alexandrinis pācapra celebrabat, in modū rotæ papyri inuoluta, diurnitatis gratia. Similis hæc nris erat, quæ itria dicuntur & à Festo fumenalia, ut consicco: q̄ fumen *ἴριον* dicebatur. Constabat autē itron sefamo ac melle: quanq̄ à sefamo & sefamuntes & sefamides pilari specie appellātur. In nomine sunt & amæ toni, quas alij ametas & ametiscos uocant. Sunt & splenia, colore cāda. Habentur & amphiphontes, sacri Dianæ ferunt, faculis utrentibus circumdata, ut balsina, iridi: ex triticea farina cum melle. Celebrātur & thymātides, & samia, & philoxenia. Sunt & coccora, quoq̄ meminit Demosthenes in oratiōe pro Ctesiphonte. Sūt & tagenia, quas & enchridas uocat Pollux. Apud Catonē est quod uocatur enchyton, cuius & Menander meminit. Aliud hoc an idē sit genus cū eo quod epichytes dicitur, æstimandum relinquo. Phorion nihil distinguit: Pollux uideatur seijgere. Epichyos certe atagantes quoq̄ nominatur, ut Pamphilus existimat. Catonianæ sunt, & spira funi nautico in orbem conuolutio similis. Et globi siue globuli, fortasse ij q̄ Syracusani epicyclos uocabant: nam passillum in sa-

cris libi genus rotundū erat. Item etneum, & sphaerice, & scriblitæ. Item saullum, quē Athenæus subityllum nominat, & ex alica quoq̄ fieri monstrauit: Aelius Stilo subuculum uocari scribit libigenus ex alica, oleo atq̄ melle, ut Festus inquit. Chrysippus multa ijs genera adijgit, Tarentinū, Craflianū, siculum, Crustulum, Iulianū, Apicianū, Canopicū perlucidū, Cappadociū, hedybion, Maryptum, plicū guttatū, Montianū, Cœrianum, Tutatū, Tabonianum. Tria hæc postrema crustulacei sunt generis: ijs adijcit multacea à mullo, quorū hodieq̄ in Lunensi agro usus. Multacea sefamata: Puriū, Gogloianum, Paulianū, & hæc quoq̄ crustula. Iam lucentula, argyrotrophe mata, hbi circi siue circuli, adempta farina & aqua & cafeo: quia circuitū æqualiter undebāt, hos qdā q̄ magis incēdere faciebāt, & lixulas & femilixulas uocant, ut Varro inquit, Sabino uocabulo. Exaphæ crustoplacunes, oryzitæ, phthoēs, ostracites, & quæ catillus ornatus à Romanis dicit, lactucas, & piper, & axungia accipiens, fit ex siligine. Post hæc sunt creion, quam apud Argiuos spontē ad spōsum ferunt. In carbone coquitur: glycinas ex passio & melle, Cretenibus familiaris, eademq̄ ferē cum mustaceo, qd̄ ex mullo fieri docuimus. Empemtas uero triticeus panis est cauos, ut in quē placenta casearig, ut in thecam recondi soleāt. Encris in oleo primum coquitur, mox accipit mel. Habet & panis hoc nomen, ut diximus in tritico. Cyribanæ Lacedæmōis sunt propriæ, in conuiuijs sece minar: circūferri solitæ, cū uingola uadā esset à choro muliebri. Crimnites à crimino fit, de quo supra diximus. Statites ex pingui, melle, & cafeo ac sefamo conficitur. Erat & panis nomen statites. Charisios Aristophani placētā est, panis Eubulo: præmiū in hoc in peruiigilis dabatur: apud nos hinc fortasse chalissones, quasi charisioses appellati ex amygdalis & saccharo, nec alia ferē materia q̄ maza: panes sed oblongi, fastigia ijs in medio, quasi dehiscere crusta tuent. Ex eadem miscella sunt & fungi, solitudine matronali cum feriātur, prælatis semper quos sanctimoniales ipsæ finxerint. Epidatron sub finem cœnæ mensis apponebatur, unde nomen. Nanos panis uidetur placētāces magis q̄ placenta: cōstat cafeo & oleo. Ptochia, siue ut alij piathyria, sunt qui micas panis, quas & attaragos uocāt, ita nomina tas putent. Attaragus porrō & pro rimula in pane ignis uis facta capitur, et omnino pro uilissima & minima quaq̄re, ut ecta apud nos, unde uerbum ectafacio de quo Festus. Polluci attaragos est superior in pane crusta, sicut in ima epephasia: sunt qui genus placētāces fecerint. Taganitzā à patellis ac fartagine dicuntur. Elaphos à mensis nomine quo fingebatur. Sicula est amoribis: aliud ab hac genus est amoras appellata. Oedepeia Coli celebrat, Syracusani myllos ex sefama & melle, muliebri pubis specie, quas sece minæ deorum focis & altariis circūferāt. Nastos & nucibus & intestinis & fartilibus, a dicto melle fit atq̄ lacte: unde dicitur nastos, quasi fartū. Ab erinaceo nomen echinus habet: ab hemina, cotyliscus: à tritico, pyramuntes, & ab ijs diu ersæ pyramides, fortasse haud ijs dissimiles, quas Cato graneas triticeas appellat. Pyramides porrō in peruiigilis dabantur, quasi premia ijs q̄ nocte rota infomes excubassent. Quidā tamen & pyramuntas hoc genus uocabant: à cafeo & usu cribri tyrococina dicuntur. Ab ijs differunt hypotyrides appellatæ, quas & cafeo, lacte ac melle

melle condunt: nam pityrides, siue ut alij quidā legunt epityrides & epityra, oliuæ genus est, ut aliubi docuimus. In Creta fit à uentre, gastris uocata, è nucè Thasia, & auellana, & amygdala, & papauere: itè pomis & sesamo, & pipere, quadrangula figura: ab his est poltos dicta, quā nos pultem uocamus. In Catione quidem Punice fit pulvis mentio inter placentas: forte non dissimilis à libo eo, quod Punicum uocabāt, q̄ ex Africa uenisset, & probum cognominabatur. À melle melicerides à subius choetina. Latina sunt & sacris dicata libi genera, quæ ferunt, & strues appellantur: unde strusetani, qui ea ferre consueuissent. Strues uero dicebatur, q̄ erat digitorum confectorum similitudine, qui superiecta panicula in trāuerfum continebantur. Item libum farreum à farre: libi uero, q̄ prius libaretur q̄ esset coctū, ut Varroni placet, dictum est.

FOENVM GRAECVM CCCXXV.

140

Foenum Græcum à Theophrasto *βασίλινος* uocatur, ab aliquibus ceratiss, epiceras Hippocrati, quoniam semen habeat simile corniculis, unde siliquam nonnulli appellant. Plinius siliciā, Varro siliculam. Inuenio & carpum in nostris, & græcis autotibus uocatum: quanq̄ & pro ballami semine carpum ferè accipiunt. Item carphos pro feno græco, quasi flocculum, siue arētem furculum. Dioscorides boton quoḡ dicit uocatam: quidā lobon, hoc est siliquam legendum, non loton credunt. Ego & lotū dici posse uideo, ut in anonidiximus.

LINVM.

CCCXXVI.

Linum à græco sumitur. Semen eius *ανταρπιος* appellatur. Oleo seminis expresso fraces & retrementa quocq̄ ipsa reponuntur, saginando iumentorum generi, præcipue bubus, obestitate sola insignibus futuris, quales ad nos Mediolano coronati ueniunt, principibus quotannis officij gratia donantibus: uisceratione hinc solenni orta, magistratibus diuina carne globulis: quos quia ferè pares sunt, fociolos confutudo appellat: quidā non fociolos, sed succidulos à uilla uisceratiōe uocari malunt, quæ singulis annis ante curiam uenerationis die agitur. Inter lini genera est Colchicum, quod tamen sardonium uocant græci. Est & Aegyptiū, à quo xylinae uctes, quas & gossampinas dixere: hoc iuris periti lanā ligneam appellant. Est autem gossampinus, siue gossipion, siue xylon, fruticulus è superiore parte Aegypti etiam in italiam delatus, fructum ferens barbaræ nuci similem, plenum lanugine: nec alterum lini genus est, quod huic candore aut mollitia præferri putent quamquā firmitatis in eo parum. Huius putant esse generis quod uulgo à pocilli credo forma cothone uocamus, siue à mali similitudine cotonei, quod in eo gignitur: id maturitate hiafēs, lanuginis pilas ostendit. Folia huic uidiū minorā. Aliqui gito nemā git, cui similem ferè gerit in capite folliculū, appellant. Draconis acerarij è lini semine, ut post dicemus, nascens, folia ipsa testantur originem.

CICER.

CCCXXVII.

Cicer ipsi *βουτ* à Græcis uocatur. Legumina gallicani ut Varro ait, nominant legaria. Dicuntur ita, quoniam uellantur è terra, non subsecentur, ut fruges. Eadem Gellius etiam legumenta nominat. Inter hæc cicer altissima radicē adhæret. Floret diuissime ut eruum: quadragesimo die uellitur: caulis admodū lignosus. Ciceris aliud arietini,

uipis à Græcis uocatur, aliud columbinum idemq̄ Venerium, erui similitudine, orobiazos ob id dictum, à Columella Punicum. Siliquæ ciceri rotundæ. Vni leguminum florenti pluuiæ officium. Erucis nascentibus eluta falsiflagine nigrum & rufum candido ualidius: herbas omnes enectās, sed tritubulum celerissime. Sideratio radici & erucæ, quas aliqui uricas & Græce campas uocant, ciceri proprie dicuntur. È cicerē corrupto nullum fit animal, contra quā in cætero frugum genere: quanq̄ hoc & semininis olerum, & quibusdā alijs commune. Nigrescit hoc cum corripitur: durat erui modo annos. Ciceris generibus syluestre adijcitur, à Dioscoride, Galeno atq̄ Paulo: cuius uis alia duo excedat. Orobiazos, siue orobias, calidior est arietino, subamarusq̄ ut erui unde nomē. In columbino & orobiazon & syluestre contineri puto. Nasci & in India sum cicer aiunt, diuerfum omnino genere, ceterum tam simile, ut mensis appositum, dinoscifere non possit. Ciceralum uero Theodorus putat esse quā lathyron Græci uocant, folio non rotundo, ut plurima leguminum, sed oblongo: caulis humi serpens, ut piso: quaterni & inæquales grano sunt anguli, ut Plinius inquit. Idē Theodorus ochrō uocatū, interpretatus est modo eruiū, modo eruiāle, modo cicerum. Folio ut cicerula oblongo, uetmīculus ut item cicerulæ obnoxio, secutis post imbres caloribus. Columella quidem cicerulā similem piso tradidit: ciceram uero non tam leguminibus q̄ pabuli generibus annuerat: nec cicerum, sed ut dixi ciceram uocando, quæ bubus erui loco detur fresa in Betica, nec hominibus inutilis, sapore nihil differens à cicerula: colore tantum discernitur, quo fordet, obsoletior uidelicet & nigro propior. Sunt qui ochros etiam phasios appellari scribant. Habentur & dolichi uocati, quos Theodorus à Plinio sumptū interpretatur siliquas, quæ & lobi siue lobia nominantur, quod soli ferè leguminum, ut inquit Aëtius, cum thecis suis mandantur in patinis. Scandunt hi pedamento cui accubant, prælongo affixo: ita enim reddi putant frugi: contrahens eruginem, ni fiat ita. Semen eius æuum non patitur, breuiq̄ marcescit, ut aphaca. Nec desunt qui lobos siue dolichos à ueteribus pro phasiosis dictos existiment, & à recentioribus pisos: cæterum Theophrastus & ante Theophrastum Hippocrates pisum à dolicho manifestè separauerūt. De phasiosis nusquam meminit, nisi quis phasios ab eo significatos dolichorum appellacionē cēseat, ut Aëtio placere uideo: sed non semper Paulus pisos, & ochros, & phasios à lobis, siue quod idem est, dolichis manifestè se iunxit: illud quidam putant lobose esse, non candidos istos & triuales phasios, sed rubentes ex milace herba: alioqui idem Paulus in quadam compositione phasios requirit albos, quasi sint etiam non albi, ut quidā renes. Pifus, pisum, & pisa, uis tantum Palladio genere foemino dicitur, cuius Africanum genus unum haberi meminit. Idem ualuulas thecasq̄ ciceris cotulas appellat: qd̄ admonitionis gratia non imitationis retulimus. Inter legumina & caniferuntur, à duritie uocati, quod eos *μαλ* qd̄ est frangere non sit: lenti similes, ut grāmatici quidā interpretantur: ego haud scio idem an diuerfum id gen⁹ sit ab aracis, quos Aëtius cathyris hoc est cicerulæ, ut Theodorus uult, similes esse dixit, & usu & uiribus duriores tantum & persici difficiiores, Aracos inquit Theophrastus, inter aphacas

cas

cas siue lente nascitur; res dura & scabra & proinde uilis. Hippocrates aracidā nominat: ab aliquibus dicta lecitios. Est & aracidna, & alia quoq; aracos, in tubere dicenda. Quidā lecitio pro genere accipiunt ad pisum & araci: nec scio an his assentiā qui lecitio ab oui luto, cui similis colore sit aracus, deductum putēt: cum scriptura fortasse diuersa sit. Galenus certe lecitio pro lente, cui detracta sint putamina, uidetur interpretari apud Hippocratē, quasi *λευκὸν ὡς ὄν*, hoc est id quod intra corium est. Proinde contrariū ei genus esculentū fortasse fuerit quod Horatius illo uersu insinuat:

Vilia uidentem tunicato scruta popello.

Vt Plautus quoq; scutea & collubia in hūc forte sensum appellauerit in Persa. Cæterū Horatianū forte nō scruta sed scuta legas, pro uasculo rustico, unde scutricū Catoni sæpenuero matellū, trullū, scutricū unum: matellā, trullā, nāsternā unā: quanq̃ pro uase sunt qui coeperint scruta in Horatio. Cæterū collubia & collubie sunt quæ tragemata etiā & bellaria dicuntur, cicetis frixi uarumq; passæ uilia munuscula, ut Hieronymus interpretatur: unde colybitas pro numularis mutaticum fœnus exercitibus, uocari cœptos aliter: quod genus à Polluce nominatur colybos. De colybo & ante diximus: propterea locū in Plauti Persa cum, non strucea & collute ut omnes habent codices, sed strucea & collubia legendū putamus. Fortasse scutea sunt quæ Græci catachymata hoc est missilia uocabāt, spargi solita: siue à uilitate, ut diximus, siue quoniam ē pellicis folliculis quos & pascēolos uocamus, effundi consueuissent. Quid si coluthra legamus? cum maturas ficus ita Græci uocent, ut inquit Philemon: nā strucea pro cidonīs q̃q; sumi possunt. Apud Aristophanē & comicos lecitio polæ mulieres dicuntur, quæ uilia quædā uenditāt, quæsi nugiuēdū. Sidorius Apollinaris in epistolis: Nunc, inquit, quædā friuola, nūc ludo apra uirgineo scruta donitabat, hoc est scutilla quædā & quicquillas & nihili munuscula. Meleager græcus autor uolum singularē scripsit. lecitii & phæces cōparationē continens. Porro legumen omne, ut inquit Athenæus, tribus modis manditur: aut enim ex eo fit quod eternos dicitur, ut ex faba & pīso, quā nos conchlin uocemus si placet: quanq̃ quid sit conchis proprie, dictum est alibi: aut lecitios, ut ex araco aut phace: aut ex aphaca & lente, quod nos lenticulā. Theophrastus loti Aegyptiæ radicē de cōciā, lecitiodem fieri cibo gratā scribit, hoc est araci leguminis alterius in modum: quanq̃ Theodorus albumen oui, quemadmodum in ea uoce luteum intellexerit, uehementer miror: cum lecythos uitellū oui potius q̃ candidū significare uideatur. Hoc primi uidimus, seu recte seu perperā: certe si errauimus, utilis & eruditus error futurus est. Nec illud tacuerim lecytho pro gutto oleo rio & ampulla falsō à quibusdā cœpisse lenticulā uocari. Nescio q̃ perire: cum lenticula uasculū non sit magis, q̃ id quod græci dīscum uocāt. Defendit eos fortasse Apuleiē de strigilecula, quæ lenticulari forma uidebatur, autoritas: satis est locū notasse. In summa lecitios pro legumine, aliquādo pro putamine periota scribitur: pro uitello per y: pro ampulla per u potius q̃ per y. Hæc fortasse curiosus q̃ debui profectus sum: sed immorandum fuit, quia & græcis & Latinis multa hinc caligo perdiu fuit.

F A B A.

CCCXXVIII.

Faba Græce *βίβη* & *βίβη* uocatur ad differētiā Aegyptiæ. A. Cellius & Festus fabā etiā fabulū appellāt. Plautus in Stichō: Cōuiuium, inquit, hoc facis est pro opibus nostris, satis cōmodu le nu cibis, fabulis, ficulis: de quo & in zea diximus. Græci cyamon uocāt & primā in māmā concretu nem lactis. Eadē parte scapus & radix funditur, idq; in omni legumini cum genere. Non diuersa ut in frumento singularis ei radix, sed capillata fibris, ut cetero legumini. Folij exit multis ut pisum atq; cicera, nō singulis, ut triticum: diebus quadraginta floret, non uniuersum ut frumentū, sed particulatim ut reliqua legumina: post florē toridē diebus perficitur, quantū legumina nulla. Differunt folio rotundō, ut maxima pars leguminū geniculato & inani caule, lignosissimōq; post cicera. Sola ferē leguminiū scapo recto asurgit. Circa Philippōs ateramon uocāt in pingui solo herbā, quā necātur fabæ. Teramon de qua in Macrobio, nonnunq̃ porro fieri, ut teramos in ateramō trāseat, cum uapore atq; alitu terrę madidā, indigena quidā uentus afflauerit, ut Theophrastū Plinius intelligit. Aliter Theodorus, qui duo illa teramon & ateramon, siue ateramon pro coctibili & incoctibili, non pro herbis ita nūcupatis accipit. Theophrastus certē alio loco facile significat ueriorē Theodori q̃ Pliniū sensum fuisse. Ateramna uulgo legumina Græci uocāt, inobsequiosa & contumacia, q̃d genus feminis etiā cerasabolon uocatur à Platōe, superstitiosa origine, quasi sterilia & irrita proueniāt, quæ per boum cornua ferēdo cecidissent in terrā. In Macedonia & Thessalia moris est arua fabis florētibus inuere: quia legumē id solo proficit, quasi pro stercore. Nascitur in marcescente faba uermis quem dixi midas. Siliquæ fabas: folliculi sunt: fabalia uero purgamenta earū dicunt, autore Plinio: At nigriū id quod in summa ea uisitur, hiliū uocatur, cui responderit in proterbio apud græcos gry: etiam si aliud significat, hoc est unguium fordeculas. Legumina Græci *βίβη*, & Theophrastus chedropa nomināt. Aristophanes belecchos, ut quidā interpretātur. Fabe genus quod Mariscum uocāt, uere scribitur. Faba cū suis corticibus elixa conchis appellabatur, ad discernim fræz: nā conchos aliud elijū genus est, ut in hordeo monuimus. A fabis fabaginem Cato dixit, & Plinius fabalia. Interdictum esse Pythagorici cibo fabā, in ualuit opinio contra uerum: si cubi porro testatos usum eius ueteres inuenias, nō cyamō, id est fabā in eo uerbo, sed Venerē intelligi demonstrat oportere cellius. Totā Insabria & Liguria recentes fabæ uidentiu uoce nūcupātur baianz. In Etruria & Latio scaphi: utriq; originē habet eruditā: Nam & baianas Apitius ipse appellat, & scapos fabas Plinius xviii. libro: Inuentus est inquit scapus cunctis fabis onustus, ut inde uulgo scaphi pro scaphis, tenuis in stailē diuerticulo, uocentur.

FABA AEGYPTIA.

CCCXXIX.

Faba Aegyptia et Colocasia idē sunt, ut fructus tamen ipse ciborum dicatur, radix uero Colocasia et mazianion ab Aëtio. Pocillius quibus hac similitudine mazarion uocari scribit Athenæus. Paludibus stagnisq; nascit: caulis ei longissimus redidit, decē pedū à Strabone, uel ut Theophrastus & Plinius, cubitos; quaternū, digitali crassitudine, mollis & sine geniculis, rimæ intus per totū utililio, propter quod & lilium Aegyptiū ab Herodoto uocatur.

cat, quemadmodum & locus ipsa. Calyx in cacumine rotundus, uel parum fauo similis: triginta plurimum loculis, qui singulas singuli contineant: non quidem omnino rectas, sed paulo extantes. Ipsi quoque calyces aquis extant, latissimis circa folijs, quæ singulas fabas obire uideantur. Magnitudo ijs ad similitudinem eorū, quæ ut Plinius inquit, perfonata in nostris fluminibus uocant. Atterent fabas, amaritudo uel odor reproditur. Radice crassissima, pleniorē q̃ harundinis, rimosa ut scapus, qui & araneosus sentiri dicitur, ubi coctus est in mandando, ait Plinius hoc filis ad morsum, ut in lana sequacibus, autore poeta Martia li. Thyrus uero inter folia emicat specabilis, à Theophrasto pilos, ut arbitrat, uocatur: q̃q̃ Theodorus pilulas interpretatus id uidetur: alij calycem rotundū in eo uocabulo significari uoluerunt. Indigenæ implexis Colocasiae folijs in uariam speciem uasorum poticare gratissimum habet. Nascitur sponte ac satū, quomodo & in Italia quoq̃. Non excoquitur Syria Cilicizq̃, & in Torone Chalcidis lacu, ad maturitatem omnino peruenit, sed magnitudine deficit. In India quoque fluuij Hydaspes cernitur, Alexandria id falsū in coniecturam trahente, nauigari posse in Aegyptum inde. Fructus quidem, ut dictum est, amarus, sed ipsa radix perq̃ lauta cibus. Scribit limo paleato, ut descendat semel chædatis, ob id spirobolos quoque dicitur: ubi semel coaulit, durat ad in finitum. Refugit eam crocodili spinis horrentem, caule ac radice: oculis timentes, quos hebetiores habet. Nominatur & faba quedam Indica, ex arboribus in siliquis digitum decem longitudine dependens, melle plenis, sed quo gustato difficile sit euadere, ut inquit Aristobulus.

LEN S.

CCCXXX.

Lens feracissima leguminum, siliquis in latitudinem mollior fulis. Melior quæ coctibilior, & quæ maxime aquam absorbet. Encat lentem herba securidaca, ut Plinius aparina, siue lappa ut Theophrastus. Nascitur & sua India lens, scenogræco similis, quam circa occasum uergiliæ demunt: & faba quedam Indica, ex arboribus in siliquis digitum decem longitudine dependens, melle plenis, sed quo gustato difficile sit euadere, ut inquit Aristobulus. Differt hæc à nostrate omnino: sed illa cibo discerni posse negat ab ignaris. Aegyptia lens à Marone Ouidioq̃ laudatur, Pelusica ob id uocata. Græci lentem phacon, lenticula phacen uocant: quo nomine & Vlyxis foror fuisse traditur: ab alijs Calisto appellata. A quibusdam non phace, sed phaceus ut Orpheus & Peleus uocata est lenticula: sed ij peregrinitatis in comedia coarguuntur. Laudes lenticulae apud autores Græcos legas, præsertimq̃ Pythagoristas: ut si rationem Zenonis sequare præcipientis ut in eam coriandrum duodecima parte indatur.

εἰς δὲ φακὴν ἡ δισκοειδὴς ἡ γλυκὴν.

Congruunt & cum ea bulbi, ob id & bolbophace dicta est à poeta quodam: unde scitum illud ortū uidetur, contra perditos gulones: lentem illud ut apud Phaleræum Demetrium est. Notū & ptouerbiū apud Varronem in satyra Menippæa & ἐν τῇ φακῇ μύρον legitur. Et ne librarj mendum fuisse, uideretur, Theodorus Gaza locum interpretatus est: fabulam in lenticula: hoc nos Athenæi uiri doctissimi testimonio corrigendum monemus. Hoc adagiū contra catozelos & apiropalos inuentum est: quos, ut est

apud Senecam & eundem Gellium infronitos appellamus, qui nullo discrimine rerum quas agunt aut dicunt, habito, pari nixu cuncta moliantur: & eadem ornamenta, figuras, emblemata, conuenire omnibus locis & temporibus existimant: cuiusmodi & illud est: & ἐν ἀνακτορῶν πίπτον, hoc est, piper in oleribus.

PHASIO LVS.

CCCXXXI.

De phasiolo in cicere differui. Habetur & gen^o herbæ phasiolis, ut post cōstabit. Græci pro legumine phasulon, & phasiolon, & phasiolon quandoque appellant. Nostri phascolum & phasolum, Columella.

ER VVM.

CCCXXXII.

Eruum herbum uel aliud candidum aliud rufum. In siliquis grana sine septe habet, quæ se inuicē quasi tangūt, ut in pīso. Siliquæ formæ teres, & ad rationem grani cylindracea, ut ite pīso. Patientissimum uerustatis est atq̃ cicer. Genus est & erulia leguminis, quā nōnulli falsō durellam uulgo dictā interpretantur, propterea q̃ hodie quoque in Vmbria uocant eruliam agricolæ, quod in Gallia & Venetia provincia doram, durellamq̃, folio crasso & oblongo leotopodij, sed maiore, capiculis semen includentibus minutum, simile nasturtio, tantum exilius: flore candido. Scopas ex ea ruri faciunt. At erulia syluestris herba est, amaritudinis eximia, colore & folio cicerculae, q̃q̃ minore.

LV PINVM.

CCCXXXIII.

LVpino cura officit, quāuis alte conditū in terra, diducit eam radice, & in summa nititur atq̃ ita germinat ceu per uim. Grana eius in siliquis discreta sepius. Viride nullum mādēt animal. Diuturnius id tradunt eruo accicere. Sabulum & arenas & omnino uitia terræ sequitur, horretq̃ culta ex omnibus quæ eduntur. Sicco nulli minus ponderis, plus utilitatis. Mitecunt cinere aut aqua calida. Circumagi lupinum cum sole tradunt pleriq̃.

LV PINVM SYLVESTRE.

CCCXXXIII.

LVpini syluestres per omnia minores inueniuntur satuius, præterq̃ amaritudine.

RAPVM.

CCCXXXV.

Rapa quasi ruapa, ut inquit Varro, tellure accumulata conditur ab olitoribus, ut in sequentem annum regerminet. Semen includitur siliqua. Vtrumq̃ sexum in hoc quoque genere intelligūt, ex eodem semine proueniētem, ut scribit Theophrastus: quanq̃ uidetur Athenæo marē à Theophrasto nihil aliud intelligi, q̃ napum buniada. Effecimus collocatè rarius dicuntur, masculifere densius cōpositæ. Laudatur semen eius tenue. Seritur semine, post transferitur. Dulcescit alioribus, per quos & in radicem non in folia incrementum capecit. In Italia Nuring præferuntur à Columella. Pollux & Athenæus ē Mantinea maxime commendat. Gongylen & gongylida græci uocant, quemadmodum & nostri rapum atq̃ rapam: nam rapina ut napina & cepina dicitur, & rapitum ut auitium, piscitium. Caro coles rapitios uocauit alio loco: Rapā biēnio sata conuertuntur in napos: alio, napus raporum naturam accipit. Gongyliorum uocabulo Hippocrates globos pusillos quasi pilulas, & catapotia significat Galeno: ipsos autem pastillos siue orbiculos, quibus in medicina utimur, dactylilos appellat: quod & officinarum modo seruant. Rapas Lacedæmonios gasteras uocant.

uocare Apollas tradidit: sed Nicander Colophonius gasteras à Boeotis brassicas intelligi: rapas uero zacecidas appellari uoluit. Amerias & Timachides nō rapas, sed cucurbitas ita dici arbitrat̃ur. Sunt & Græcis q̃rhap̃hyn esse dicantur napum buniada: licet glaucus non rhap̃hyn sed rhap̃yn uocet: unde apud nos rapo nomen uideri potest manasse.

RAPVM SYLVESTRE. CCCXXXVI.

Syluestris rapa lōgiōr, in speciem q̃r raphani, cau le breui, semine intus candido, duplo maiore q̃ papaueris. Has in Dalmatia frequentes sponte nasci Possidonius est autor.

NAPVM BVNIAS. CCCXXXVII.

Naporum in medicina quoq̃ orci fastigia ser uant: angulosi foliorum caulibus florentia, quod bunion uocant, dicendum inferius: Alterum genus buniada appellant, de qua hic agitur: Ametrinā buniada maxime sunt qui probet̃, Græci Thebaicā. Officinæ modo ignorat̃ buniada, & syluestris rapisemine buniadis uice utuntur: q̃q̃ facile cognosci poterat: est enim syluestri rapo semen & nigrius & maius, q̃ buniadis.

RAPHANVS. CCCXXXVIII.

Radix, quā ut Varro inquit raphanon, & raphanida, & crambidion oraci nominat̃, caudice uno assurgit fere arboreo, ut in ruta quoque cernitur: proinde hoc genus olerum dendrolachana cognominat̃, hoc est ut Theodoros placet oliariabores. Die tercio à latu prostrat̃, radice terra adoperta, rapimodo: sequenti anno germinat, tellure abiecta. Semen in siliquis. Genera Boeotium, rotundū & dulce lithasid, quod alij Thracium uocant, patientissimū hyemis: Cleonæon in longitudinem porrigitur: Corinthium amplissimū detecta stirpe nascitur. Quod foliū leuius, eo suauior atq̃ mitior est raphanon. Dulcescit ut rapum frigoribus. Tra dicitur genus unū eræ folio. Pulices appellat̃ur bestiolæ raphanis innascentes. Raphanos radices lignescere Theophrastus est autor. Hæ, ut inquit Palladius, formini generis existimantur, quæ minus acres sunt, & habent folia latiora, leuiora, & iocunde uiridia. Raphanon ut brassicam uicibus inimicum esse constat, ut si circum se feratur, diffugiat. Genus ei unum est, quod ab Herodoto uocatur firmæa, in Aegypto cū cepis & alio pyramidibus condendis præberi solitum: Iulius Pollux autor. Confirmant id & Diodorus & Plinius, qui scribunt ad id opus in raphanon cepas & allium taleita mille octingenta erogata, ut mirer Laurentiū Vallam apii uertisse pro raphano. Sunt & Græcis qui firmeam apud Iones genus oleris apio similis accipiunt: itemq̃ pro edulio ex adipe, atq̃ melle: sed firmeam legi malo q̃ firmeam. Vtq̃ hinc fortasse ferculum nuptiale uulgus firmiā corrupte pro firmæa dixerit, ex amygdalis & pulpa gallinacea & saccharo: nam Hippocrates firmeam suæ firmææ pro succi quodam genere, seu passum, seu defrutum id sit, intelligi uoluit, cū præciperet: quid in uino odorato firmæa uesumendum esset. In compositionibus quibusdā Pauli & Aetii bacanum inuenio cōmemorari: nec quid ea res sit cōperio, præterq̃ in quodā glossemate, ubi semen, siue nucleum, siue mucronem raphani bacanum esse legebat. Bacanum Aetius iocinori prodesse in cibo, utiq̃ parti eius uisceris in curæ, prædicat.

AGRIORAPHANOS. CCCXXXIX.

Agrioraphan & ab ἄγριος ῥάπην differt autoribus: ut aliud sit syluestris raphanus, aliud raphanus syluestris: quemadmodum leucacanthus ab acantha leuce diffat, id est alba spina à spina alba: in quo tamen honestius puto nominibus Græcis uti q̃ Latinis. De agrioraphano & hic & lib. quarto paucis immutatis agitur, apion & ichada nominando: nec Theodorum probō, caricā atq̃ piron interpretantē. Falsum est & quod scribit inter spinas esse, quā piron uocat: non enim hoc in Theophrasto, quem uertit, legitur. Fefellit hominē, q̃ autor ille de orchide herba scribit, similē ei caulē esse apio, sed spinosum: proinde Plinius, caule inquit spinoso est orchis. Paulus chamæraphanon quoq̃ dici hanc existimat, quæ apios siue agrioraphanos uocetur. Radicem habet cepæ, sed ampliore, uel, ut Theophrastus inquit, asphodeli, uerum squamulosam. Nascitur in montosis & asperis, aliquādo & herbosis. Effoditur uere.

RAPHANOS AGRIA. CCCXL.

Papau & ῥάπην id est radícula syluestris, & quæ cheria, & in Ponto arinon, & ab aliquibus leucæ: à nostris armoracia uulgo dicitur, fronde copiosiore q̃ corpore. Laudatissima nascitur Arcadiæ, scribitur in Italia & armoraciam uocant satiuam, ut inquit Plinius.

SISER. CCCXLI.

Siser Græci sisaron appellant. Duoq̃ generis est, satiuū & erraticū, Inest lōgitudine & siseri neruus, ut pastinaca: qui decoctis extrahitur, magna tamē parte amaritudinis relicta: quæ multo in cibis temperata, etiam uertitur in gratiā. Nobilitauit hoc princeps Tiberius, flagitando à Germania omnibus annis ex ocelluba castello, quod impositum Reheno est, ubi generositas præcipua: ex quo apparet frigidis locis conuenire. Non prætereundū quod tradit, ideo utilem stomacho uideri cibum, quoniam nemo tres siseses edendo continuaret. Sisaram Varro, Plinius sisaram appellat herbam, cuius flore uescantur apes, ut in eryce disputatum est.

LAPATHVM. CCCXLII.

Lapathum nostri rumicem fere appellat̃. Radice altissima & inter olera maxime singulari: nec enim lateribus crassiores alias emittit, sed prætenues, Mukicaule hoc olus ac ramosus, & cum perfecte adoleuit, figura betæ proximū: corpus carnosum & madidum: eoq̃ uel exemptum terræ diu recens, viuacissimum præ cæteris oleribus est lapathum, præsertim satiuum. Differt hoc à syluestri, q̃ sesquipedalis satiuo radix, breuior syluestri, gustus tamen gravior syluestri, sed acrior, ut omnia syluestria satiuus collata. Syluestre lapathum Aëtius ῥάπην ἀπὸ τοῦ ῥάπην cognominat, radicem eisublongā tradens, raphanō parū similem. Quanq̃ porro lapathum à nostris rumex dicitur, proprie tamē rumex est quem oxalida & oxylapathum Græci nominat̃, satiuo similem, solis aquosis, colore betæ cædido, ita dice minimā, cantherinum lapathum ab aliquibus uocatum. Quidam oxylapathon satiuo similem esse q̃ oxalida siue rumicem existimat̃. Lapathos Democritus pro uenaticis scrobibus acceptis dicitur. Theocritus à lapathon uocat ab effectu, quoniam exinaniat: etenim Attici alapatha quæ nos inanitionis dicimus, appellant̃.

HIPPOLAPATHVM. CCCXLIII.

HIP.

Hippolapachum maius satiuo, candidiusq; ac spissius. Adiecere nonnulli bulapachon, radicis tantum altitudine differens. Sunt qui & hydrolapachum tradunt in aqua natum.

L A P S A N A.

CCCXLIII

Lapsanam Græci uocant *λαμ-αίναν*. Cyma est sue brassica syluestris, pedali altitudine foliorum trium, quæ hirsuta ei sunt, napo simillima, nisi candidior esset flore: hinc à Latinis uocari napii existimo, in quo tamen Dioscoridem autorem solui habeo. Lapsanam diui Iulij carminibus præcipue iocis militariibus celebratam ait Plinius: alternis quippe uersibus exprobrauere, Lapsana se uixisse apud Dyrhachium, præmiorum parimoniam cauillares. Aliam puto herbam fuisse, quæ cum lacte uictitauit exercitus, cara nomine, ut alibi notabimus: nam radice utebantur eius, non folio, ut ait Hirtius.

B V N I O N S I U E N A P V M.

CCCXLV

Bunio hoc est quod nostri napum uocant, ut in buniate meminimus: quod Dioscorides scopam regiam uocari Romæ scribat. Cæteri alia quæ scopia regia est, ut in siderite constabit. De qua porro scopia regia loquatur Plinius uigessimoprimo libro: non leuior, inquit, odor ei quam scopam regiam uocant, quod folia eius oleant non flores, existimandum re linquo. Paulus Aegineta bunion, à nonnullis arction appellari scribit. Galenus arcticon. De bunio eadem à Dioscoride libro quarto, quæ hic legebantur, detra ximus: quia inutiliter repetita esse uidebantur.

B L I T V M.

CCCXLVI

Blitum siue blitum (Græci etiā *βλῆτιον*) erumpit ocysissime, semet ut betæ corticeu, copiosum ramemofumq; ut atriplicis radice non una, crassa, in rectum tendente, ut betæ & lapachon & maxima pars olea, sed continuo, multiplici ac prolixa. Inspidum & sine acrimonia unde conuiuii fecminis apud Menandrum faciunt marii. Blitū duplex ostenditur, rubens & candidū. Apud Aristophanē quoq; blitoma: pro stolidis accipiuntur: quos Plautus noster bliticos appellat in Truculento:

Blitea, inquit, & lutea est meretrix.

Etiamsi corrupte legitur blitica. Hippocrates blitō quoq; nominat herbæ genus, modo mendū in uerbo nō sitisio enim & bolbiton pro simo bubulo, & bolbiton pro quodā polypore genere minuto capiti ab Hippocrate, ut Galenus testatū reliquit: sed & onobleton herba lingue similis Hippocrati contra foeminarum profluuium in uellere apponitur.

M A L V A.

CCCXLVII

Malua culturg opera intra sextum septimūq; mensē grandescit in arborem, hastarum baculorūq; usu in Arabia, Mauritania quoq; Lixi oppido æstuario, ad Hesperidū hortos & iuxta delubrum Herculis. Duo genera earum summa, quæ amplitudine folij discernantur. Maiorem Græci *μαλαχ* uocant in satiuis: alteram ab emolliendo uentre dictam putant malachen & syluestribus, cui grande folium & radices candidæ althæa nominatur. Est & quæ uniculis nascitur, monocaulos ex facto cognominata. Omne solum in quo seruntur malua, pinguius faciunt. De althæa quæ item dendromalache, siue anadendromalache dicitur & hibiscus, uolumine tercio differitur. Est & alcea huius ferè generis seorsum indicanda.

ATRAPHAXIS SIVE ATRIPLEX, CCCXLVIII,

Atriplex octauo die à satu Octobri mēse pro uenit. Radix ei una descendit in altitudinem, unde fibræ aliæ promanant ut in betâ. Foliatum habet semen & obductum cortice, numerosum racematimq; singulis ramis infidens. Atriplex & syluestre est & satiuum, accusatum à Pythagora, tanq; faceret hydropicos, morbosq; regios & pallorem. Coquitur difficillime, ac nē in hortis quidem iuxta eum nasci quicq; nisi languidum culpauit. Addidere alij plurimas agritudines ex eogigni: nec nisi quæ sæpius mutata coquendum. In Italia difficulter id nā scēbatur. Syluestri capillos tangebant. Atriplexum ueteres, non atriplicem uocasse perhibent, ab Græco nomine potius q̃ ab atrore, ut arbitror. Hippocrates etiam adraphaxin appellat: post atraphaxin dixere, Atctis, d, literam in, t, mutare amantibus, ut facit Aristoteles, qui entelechiam pro endelechia usurpauit, ut Lucianus autor est. Quibus porro atriplex idem uidetur esse cum eo genere quod spinacia uulgo dicimus, & Græci recentiores spanachia, falluntur apertissime. Si quem porro uocabulum id parū delectat, atriplex Hispaniensis nominetur. Et Hercule fieri potest ut inde profectum sit ad nos olus ieiunij aptissimum, nec ueteribus (ut consijio ac demiror) compertum.

B R A S S I C A.

CCCXLIX

Brassicam antiqua Græcia non cramben sed raphanon appellabat, quod & Aristoteles, ut Iulius Pollux inquit, & Theophrastus ferè sequitur. Crambe quasi coramblē dicta existimatur: quod pupulas oculorum quas Græci coras uocant, hebetet, autore Columella: sed & ipsi quoq; Attici corambem dicunt eam. Dedit hoc locum pro uerbo fortasse, repetitam brassicam, nedum nocere, etiam occidere. Græci tollant carnem crambaleam uocant, Athenæus autor. Brassica, ut Varro inquit, dicta quasi pallica, ex exscapo minutatim præferebatur, & passa fiat. Die à satu decimo se ostēdit brassica. Digeritur à Theophrasto in genera maxime tria, syluestriscul folium æquabile, paruum, rotundum, multiplex, Ramosa, succo aspero, medicato, ad detractiōnes per aluum præcipuo. Secundum crispæ, quæ & amplitudine folij & bonitate succi præferunt omnibus. Tertium leuis appellatur. Nonnulli addidere quartum, cui semet deterrimum, aut omnino nullum. Cato quoq; tria facit discrimina: unam extentis & gradibus folijs, cauile magno, propterea caulodē uocatam, aliquando Septembrinam, ab alijs eleada: Alteram crispā folio selinada nominatam, à similitudine foliorū apij, quæ & apiam cognominant, alij cliuaculam. Tertiā proprie appellatam crambem, minutis caulibus, folijs tenuioribus, & simplicibus densissimisq; sed a mario rem, leuiorem, teneram, quæ ob id & lenis dicitur. Sed de syluestri brassica suo loco agemus. Athenæus tria, inquit, brassicæ sunt fastigia: primum halmiyris, quam & præfert omnibus, præsertim in Eretria, & Cumis, & Ephesi, & Rhodo & Gnido genitam: secundum *αἰθυλλὰ* & a foliorum leuore dictū, ubiq; nascens: Tertium Seleniua folio crispo, & apij similitudine à qua & nomen habet. Hæc naturæ, illa genæ distinctio. Tritiana magnitudine ac sapore præcipua, cui pedale aliquando caput. Dein Cumana sessilis folio, capite patula: mox Aticina altitudine non excelsior, folio numerosior q̃ tenuior: cuius sub omnibus penè folijs fruticat cauliculus peculiaris: Ideoq; utilissimū

g

genus

Genus existimatur. Pompeianæ in oppido Campaniæ. Pompeijs procetus caulibus, ab radice gracili, intra folia crassifolios. Rariora hæc angustioraq; sed teneritas in dote: frigora non tolerat. Sabellicæ usq; in admiratione crispa sunt folia, quosq; crassitudo ipsum caulem extenuat: sed dulcissima perhibetur ex omnibus. Non pridè ante Columellâ subiere Lacutres à loco dicti, quo lacus Turni, siue ut Plinius scribit lacus Turonis fuerit, conuale Aricina, capite prægrâdes, folio innumero: Alij in orbem porrecti, alijs in latitudinem torosi. Nec plus ullis capitibus post Tritianos, & cyma nullis serior. Hoc genus quidâ interpretantur quod modo capitibus coles, & in Hispania Murrianos uocant. Brutiani frigidioribus aluntur, crâsses folijs, caule tenues, sapore acuti. Adduntur ijs Sileritenses, Tiburtini, Stabiani, Patthenopæi, qui sunt hirsuti. Vesuuii qui sunt amari, non sine sua uitate. Marrucini rubent paucis folijs, Signini breuioribus, crassiores, lapidiores Cappadocæ folijs, caule penè nullo, frequentibus tuniis & cõtra frigus muniti, priusq; in florè exeant, ut uix prima folia discernatur hyeme. Cuicunq; generi pruinæ plurimū suauitatis conferit. Sua uilissima ex omnibus est cyma: est autè cyma quidâ ipsos caulium delicator teneriorq; cauliculus, què à prima sectione proximo uere præstant. Greci *κνύμα* quasi patunt eius uocant: nos et cymas et cymata uocamus: nec in brassica modo, sed in raphano & alijs compluribus folijs, q̃q; absolute cyma non nisi de brassicæ fructu capitur. Palladius quymam uocat, & semel opere in toto Plinius. Post cymam æstiu autumnalesq; cauliculi, mox hyberni, tum deinde iterū cymæ. Nullo æque genere multifero, donec sua fertilitate cõsumatur. Omnibus oleribus anteposit Cato brassicam: propterea ut inquit Varro, nomine oleris brassica intelligitur. Vites ad brassicâ assitæ diffugit, introrsumq; in fundis se declinant: quo argumento usus Androcydes, contra ebrietatē ualere brassicam dixit. Râta est inter plantas quoq; discordia. Hinc Nestor in eo libro qui *κνύμα* inscribitur, olus hoc ex lactymis Lycurgij à Libero patre uitibus addaligari, natum prodidit. Brassicæ decoctæ aqua nihil æque feret humi effusa. Crustæ si occupent intus uasa calidaria, intantum ut non sit eas auellere, si brassica in ijs decoctâ fuerit, abscedunt: coles capitatos uulgaris sermo scapitos appellat: antiquilacutres & Tritianos ut consilio. Ex semine uetusto brassicæ nati aiunt rapham, & cõtra ex raposq; brassicam. Nobilitauit brassicam Ionia, per eam iurando quasi per aliquè deorū, ut Zeno Citius Stoicę familie caput, per capparin, Socratis credo æmulatione deieratis per canem, ob id & mātīn ceu uatrem quandâ ab Hipponacte brassicam uocari testis est Athenus, qui & puerperis in Attica regione amuleti cuiusdâ loco brassicâ apponi solitam commemorat. Nomē oleris commune quidè est quibuscunq; lachanum apud Græcos, priuatim tamè brassicæ tribuitur. Ab olla dictū olus, testis est Varro: ut eò uideatur poëta Veronensis alludere cum cecinit: Nō olera Olla capite. In quo sciamus obiter: non pro uase in eo uerū capi ollam, sed nomē esse uiri propriū, quod ignoratē ferè grāmaticis delirant: quemadmodū et in eiusdē poëtæ uerbo Mentula.

BRASSICA SYLVESTRIS. CCCL.

Brassica syluestri Græci mediantes ceram quoq; nominant, nos erraticam: q̃q; sciendum beram genus raphani à Plinio acceptum nō

brassicæ. Hanc alij petraeam uocant, inimicissimā uitibus. Sunt qui colem syluaticū appellent. Syluestris laudes immenso plus prædicat Cato q̃ fatiatur. Folia syluestri leuia, rotunda, parua, & ut Plinius inquit, binas: sed densissima & plurima, plantis oleris similior. Inter syluestres brassicas & lapiana est ut diximus: item sandix, & iasione, & enthuficon, siue ut alij codices, anthricon. De petraea Theophrastus, si modo hæc est quâ supradiximus, circa Plophidē nasci scribit optimâ numerosamq;. Aliubi nō petraeam, sed petregum uocatur: alioquin & capparis petraea quandoque dicitur: nam petrophytes *ἀέλιον* est, ut *κνύμα* *τοῦ* faxitraga.

BRASSICA MARINA. CCCLI.

Brassicæ marinæ cauliculus quidâ halmyrida uocari putant, quoniâ nisi in maritimis non proueniat. Nauigatione quoq; longinquauitibus asseruatis ad transferendū. Plinius hanc marinum olus est ubi appellatur: recentiores Græci thalassocramben.

BETA.

CCCLII.

Beta culturæ quadam ratione incrementum capescit arboris. Scriitur circa mensem Maii: sicut omnia quæ Græci uocant epispora: quod genus etiam sementis primæ nomen habet: etiam si alio quoque fata mense proueniant: Ideoq; beta æstate sexto die nascitur, hyeme decimo. Peculiare in beta est, ut non continuo singula semina producat, sed anno interim sequenti, sæpe tertio. Radix betæ unica, longa, recta, carnosâ, gustu iucunda, & nonnullis grata cibo uel cruda. E lateribus aliq; item crassæ, modo singulæ, modo binæ, ternæq; funduntur: è quibus fibræ coherentes alligant. Cortex neque crassus, neq; raphani modo extricabilis, sed olusatro ad quandam modum similis. Semen integrit cortice. Folio beta uir, pede candicat, figuram b literæ cum deprimitur, ab olitoribus refert, unde nomen. Beta hortensium leuissimum est. Græci præferunt ex Asira ubiq; candidam, parçissimi seminis, appellantes Siculam. Nostri betæ genera faciunt uernum & autumnale: q̃q; & Iunio & Ianuario feratur. Medici betam innocentiorem quam olus esse indicauere, ut inquit Diphilus: si quam uobrem appositam non nemini degustare etiam religio erat, ut quæ ualidis potius in cibo essent. Gemina huic natura, & oleris, & capite ipso exilientis bulbi: neque aliq; hortensium latitudo tanta, ut in lactucis, cum ceperit colorem trahere, imposito leui pondere, in binos pedes aliquando se pandendo. In Circeiensis agro amplissima proueniunt. Vini sapor in doliis corruptitur brassica, sed odore betæ folijs demersis, restituitur. De alia porro beta proprie syluestri, dicemus in limonio. Græci betam modo *στύρα* & modo *πύρα* & uocant. Hippocrates tetrylon (ut arbitror) nisi corruptus locus est in eo libro, qui de mulierum natura inscribitur. Aliud uidetur genus esse teutlis, ut Athenæus inquit ex Diphili comici sententia: nam duo fuere Diphili, medicus qui & Siphnius cognominatur, & comicus: hic imperitium quandam in comedia describit, taxansq; teutlon teutlida nominaret. Eundem quatuor betæ facit genera, uulsi, fursculosum, populare, candidum. Betam Græci ouillum corium uocant: unde beylusis lapis appellatus est, quem

quem pro Ioue Saturnus uorasse fingitur. Monstratur & saxum hoc nomine ad Iulio polin in Syria, proxime Libanum montem. Est & auiacula que uocatur betylus olim dicta cetylus.

ANDRACHNE SYL.

VETRIS.

CCCLIII.

ANdrachne syluestris, de qua hic agit, genus est aizoi, ut quatto uolumine constabit, ubi Dioscorides hanc herbā ferē ipsē uerbis de monstrat. Nasctur breuiore cacumine quā minus aizoum, qđ in muris parietinisq; prouenit, cui & similis ostēditur. Colligi hanc & cibi causa cōstat. Habentur & alia duo genera syluestris andrachnes, hoc est, portulaca nomine, ut in Telephio & pepi diximus. Telephion in Theocrito sunt qui folium papauer accipiant, ad explorandū amorem crepitu adhiberi solitum: qui lusus ferē puellaris erat, ut inquit Pollux, etiam nūm ex lilio. Non desunt qui sui generis herbā intelligat, succo feminis sanguineo, folijs loti satius, siliqua pampini modo intorta. Alij miscellā quandam esse putant Telephion, quā corporis partibus imposita, si cutis rubescat, indicium moris esse, ob id philtron quoq; dici fin accendatur & exulceretur, odij. Ego Telephion Theocriti eandem esse cum ea, de qua hic agitur existimo: quippe cui excaletoria & ulceratoria uis infit.

PORTULACA.

CCCLIII.

Portulaca exitio cūcitur. tanuario mēse ut Theophrastus inquit scribit. Hippocrates portulacam fluuiatlem dicendo, uidetur recentē, & non inueteratam intelligere. Fluuiatilis inquit portulaca refrigerat inueterata excalet atq; purgat.

ASPARAGVS.

CCCLV.

Asparagus uel ab asperitate, ut inquit Varro, uel quoniam ita Græci nominent, aspharagos à Theophrasto dicitur. Ipsum quoq; guttur à quibusdam aspharagus uocatur: ab Appione tamen grammatico nō aspharagus sed spharagus. Corrudā nostrī appellat hanc herbam. Spinosi sunt asparagi ex toto ferē ut scorpius, unde scorpiōnes quoq; à Columella fortasse nominantur: quanq̃ asparagus cognomento scorpius, siue scorpio, aliud genus est, ut in scorpio de herba disputabitur. Post æquinoctium Autumni flos exit ē quodam folliculo secunda a culcos. Asparagam uero Theophrastus pro plāta ipsa uidetur accepisse, aut etiā pro loco ubi satus est asparagus, eodem etymo ferē quo apud nos cepina, rapināq; Theodoros corrudāginem quasi aliud qđ corrudā, gen^o interpretat. Cato certē ad eundē modū corrudam, quo cepinā & rapinā accipit: In harūdineto, inquit, corrudam serito, unde fiant asparagi. Exit uere caulibus idoneus, tum scabescit, & processu in storem abicit: non ex ipso tantum, sed ex prioribus erumpit: nō enim caulem habet annuum. Hæc ueteres, qui altius asparagos non uidentur nouisse. Corrudam Attici non hormion (aliud enim est) sed orminion & ormenon potius: aliqui Libycum asparagum dixere, utiq; syluestrem qui post inuentos altius proprie corrudā est. Corrudā iterum species dug, candoris solo discrimine. Cādiōri efficiatior uis tribuitur. Iulius Pollux syluestre asparagida scribit uocari: satium, ormenon. Seruntur spongij hortenses asparagi: ita enim radicula altitium uocatur. Vel sunt præter quā primo anno radicitus, alioqui degerpit stirpes præfæctæ angunt, & quasi excaecant

oculos spongiarum, nec patiuntur asparagum mitti. Spongiæ post quadragesium diem inter se implicantur, & quasi unitatem faciūt: post annos aliquot transferuntur fertilitate in decennium duratē. Seruntur & seminibus paxillo dimissis. Viret thyrsifolius stilus primū emicantē, qui caulem educens, tempore ipso non fastigiatus est, in thoros struitur. Nulū ijs gratius solum quā Rauennā fuit, quæ gloria in hodiernū quoq; mansit ei terræ. Nomen porro asparagi generale est, ut betæ, blito, lactucæ, atriplicis, malux, rapo, sinapi, radicula, pyrethro, brassicæ, nasturtio, bryoniæ, lauragini: ut in omnibus ijs alia res asparagus, alia frutex sit. Errant qui corrudā pro eo capiūt, quem medicos officinæ lupulum cognominant: folijs apertissimē reclamantibus, quæ in corrudā capillamenti modo tenuata, in lupulo bryonig similia, paulo asperiuscula. Caulis ei spinis horret, ac cum in bustani & corrudā modo in torulos turbatis. Flores habet foliaceos & candidos, qui ferē alium uinumq; subolent: hanc Græci uulgo bryon uocant à bryoniæ ut puto similitudine. Brusculam quasi bryon scāfite tura dicit. Aut hæc omnino, aut nō abissimis huic herba est qua occidētis populi ceruissam suam maceratis humore floribus commendant, sapore quodam uini, habiolam siue habillā gallicē uocantes, uulgarum & tolophā Germani. Ego lupum salictarium à Plinio dictam cēse: subit enim scanditq; salices & arbuta omnia, circumuoluendo se cōplectitur. In Flaminia quoq; lupus reptitius uulgari nomine uocatur hodie. Herbarum inquit ipse nascuntur quibus utimur in cibis, in Italia paucissimas nouimus, fraga, tanum, ruscū, batin marinam, batin hortensianā, quā aliqui asparagum uocāt Gallicum: præter has pastinacam prætensem, lupum salictarium, eaq; uerius oblectamēta quā cibos. Habetur & aliud quoddā genus, ut idem Plinius testatur, in culcis asparago, mitius corrudā, passim etiam in montibus nascens refertis superioris Germaniæ cāpis: nam quod in Neside Campanie insula sponte inquit oritur, optimum existimatur.

PLANTAGO.

CCCLVI.

Plantago herba stelephuros & ortyx à Theophrasto dicit: à Plinio sela pyros & ortygia. Cōturnix à Theodoro uertitur, à Dacis limpeax. Alij thyeticem, alij theu caricon appellāt, à nostris quandoq; sepiet uia: quanq̃ heptaneuron alia uidetur herba qđ plātago, id quod ex emplastro quodam aduersus collectiones, qui nomē est botanicon, aperit liquet: quippe in quod tres quarantur herbe, plantago ternis uicis, heptaneuron senis, leoneuron quoque ternis: Nec quæ sit leoneuron intelligi. Flosculus ei Ianuigenus ut frumento, particulatim erūpsent aphaca & intubū. Inter spicatas est plantago, sed minor nigrioribus folijs, & lingue pecorum simillimis, unde nomen apud Græcos amoglossio: maior folijs laterum modo includitur: quæ quia septem stili, heptapleuron nonnulli uocauere. Caulis angulatus & similis napi. Amoglosson & amoglossia dicitur à Græcis plantago.

SIVM.

CCCLVII.

Sium latius apio est, nigrius, pinguius, copiosum semine. *oivē vāci* à Græcis uocatur, hoc est, sium in aquis, siue aquaticū: hoc multi uulgo cressionem dici reñt fallo, promiscuum & acetarium olus, & refrigerantis naturæ, At sium caliaci-

gis est & odoratum. Sunt qui lauer Plinio uocatum in riuis proueniens, utile torminibus coctum & conditum, & ad calculos uessicę crudum pro sio capiāt: nam & Dioscorides hoc loco sium ait à Romanis lauer dici etiam si lauer de scriptum est. Sunt qui herbā quā ab eodem Plinio silaus dicitur, in glare olis & riuis nascētē, & ipsi similitudine, uellicis perinde laudatam pro sio & cresonibus intelligant. Ego in castigatione Pliniana uerbum illud silaus adulerinum arbitratu sum: nec silaus, sed lauer scribendum. Hoc autem lauer ipse pro cresonibus accipio, nō pro sio: quod odoratum est, ut commonui.

SISYMERIVM.

CCCLVIII.

Sisymbrium, siue ut recentiores Gręci cimbium, degenerat in nepetā aspectu, sed odore in mentiam, ut Theophrastus existimat: leuissimum nascitur circa piscinas & stagna & in putoreum parietibus. Folium in sicco nascenti angustius, quod in riguis prouenit, de quo mox agetur. Sisymbrio montes plerique scāt, sicut Thracia ubi & Ierpyllum: aut aquę deferunt ex his auulso ramos ferunt que item Sycone ex suis motibus, & Athenis Hymetto, sisymbrium folio tantum coronat.

SISYMERIVM AQUATICVM AVT

SYLVESTRE.

CCCLIX.

Sisymbrium syluestre à quibusdam thymbregum appellatum, pedali non amplius altitudine conspicitur: huic cognomentum est cardaminę, ut Galeno placet atque Dioscoridi.

CRETHMON.

CCCLX.

Crethmon batis Latine dicitur: quanquā batis duplex, marina & hortensiana, quā malique asparagum uocant Gallicum: Liguria baticulā hodie quoque appellat. Caulis ei palmum altus Plinio, cui bitalis Dioscoridi. Semen feruens, nucleo interiore, qui ut in rosmarino cachrys uocetur. De marina potius quę de hortensiana, siue quod idem est satia, loquitur Plinius quoties crethmon nominat. Proinde alio loco de bati medicinis, alio de crethmo differit. Satiuam batin & olus chordum à Columella dictam inuenio. Hanc quia serotini sit olus, quo modo & fecum chordum pro eo quod secundarium est, & Augusto mense uellitur, Autumnale quę uocatur. Sed & pecus chordum, & chordum suum dicimus, ut Gregorius *hymni nam uatolę uiciatus in utero partus suillus* uocatur Aristoteli. Hanc crustica Hecale apud Callimachum notatur apposuisse. Hippocrates Aethiopicam batin cōmendat. Est & batis siue batos inter pisces, quemadmodum & botis: quanquā sunt qui botin pro herba potius quā pro pisce capiant, ut Athenæus inquit. Batin argbaton nostri rajam appellant. Nam quod Gręci rhinam, ipsi squatinam uocamus, cuius aridam cutem Hippocrates ichthyen nominat: quę & instrumentū medicinale, quo partus ex utero præcidit, ichthya dici solet. Rajam certe Theodorus probat rachio siue rana quandoque uertit, nisi alterutra lingua librarius errauerit. Batis porro piscis in tria genera dirimitur, baton, liobaton, & asterianbatin, & ex squatina & raja natus rhinobatos.

CORONOPVS.

CCCLXI.

Coronopus, hoc est, pes cornicis, inter aculeatas à Theophrasto ponitur, sponte nascētes. Interim & feritur medicinę ad usum: silago aut silago dicitur à nostris, à Gręcis etiam coronopodion, ut Galeno. Sunt Arabes qui hanc coruinum

uocant: nec prohibeo, dum res constet, quibus cuique libet uocibus utatur. Illud monendi sunt, herbā quę modo pes coruinus ab officinis & herbicidis appellatur, non tam coronopoda uideri, quā ranunculi genus, quod polyanthemom cognominat: quandoquidē aculeata & oblonga esse coronopus herba traditur, & aluius prodesse: coruinus autem pes, uis eius & ranunculi similitudine conspicitur, plurimis foliorum diuisuris, cuius uel tactu solo pulsulę am busti modo corporibus attolluntur, flore aureo, copioso: quę: quibus notis ranunculum polyanthemom uocatum cōficiunt.

SONCHOS.

CCCLXII.

Sonchos in candidum nigrumque diuiditur. Lactucę similes ambo, nisi spinosi essent, caule cubitali, intus cauo, sed qui infra cōspicuo copioso lacte manet. Sunt qui nigro uelci prohibeant, quāsi faciente morbos. Sonchū Hecale cum bati supradicta thea apud eundem poetam intulit, non tamen cōcedo Eudidis parafici dicto non infusulo, qui sonchum in cena copiosam apponenti, senariū ex Euripide poeta protulit, ubi Capanetus inquit:

Μοῖρα γὰρ ἔστιν ἡ τοῦ Σονχίου ἡρώ.

Aculeatur postquam tenera esse desit, & adulta facta sonchos, ut galenus inquit. Aëtius hanc quādoque diplacon uocauit. Dioscorides cicerbatam à Romanis dici prodidit: quod quidem uocabulum in Etruria hodie quę durat: Nunc Romanum uulgaris crispinos, Venetiā lactucinos. Folia ex aceto saleque manduntur: esculentia est & radix.

SERIS.

CCCLXIII.

Serin satiuam Dioscorides non describit, sed syluestrem duntaxat. Summa ergo intubos generas, & cichorium. Seris lactucę simillima, troximona rectioribus Gręcis uocatur. Iterum du plex hæc, satia quę proprie dicitur seris, minor cichorio & uenosior: & syluestris, melior priore: nigra hæc & æstiuā: deterior hyberna & candidior. Cichorium, siue ut Theophrastus inquit cichore, nūquam est satiuum. A Latinis ambigua & intubus erraticus in Aegyptio cichorium nomē habet. Duplex & hoc naturę: folio angustulo chreston & pancration propter salubritatem uocatum: folio latiore, quod edypnoidea cognominat, & leonis dens uulgaris uoce dicta creditur. Similitudo intubis tanta cum lactucis, ut neque eodē genere dici possint, neque item ex alio. Hyemis quidem impatientiores sunt quā lactucę, uirustque præferentes: sed caule non minus grati. De cichorio Theophrasti uerba subiiciemus in condrilla: quando & illa species existimatur intubi à nonnullis.

CONDRIILA.

CCCLXIII.

Condrilla siue condrillon, olus est folio intubi, & propter amaritudinem ingustabili. Succus radici lacteus, copiosus, acer. Caulis fere pedalis, succo manans amaro. Radix fabę similis, aliquando numerosa. Gummi eius proximum terrę funditur. Herbam mures agrestes à serpentibus lassi mandunt. In Theophrasto andryala, in Plinio condryala pro condrilla deprauate legitur: hanc Galenus specie feridis unam effe meminuit, germinat post Vergilias. Omnia intubacea ut Theophrastus inquit, ineunte uere caulem floremque simul edunt. Cichorium foliatu & caulis & ab radice, unaque cum emerfu, ramulorum stoculus emicat in caule per partem

partem ut heliotropiū usq; in autumnum. Caule magno surculisq; brachiato pluribus: itemq; ad uinctū quoq; lentis ut radices: quaz; prolixitate cōtumaciter emoritur. Fert & siliquam siue folliculum, & in ea semen per extrema caulium. Intubam autem pleriq; falso intelligunt amari icoris non herbam in Vergilijs uerū, primo Georgicorum:

Et amaris intuba fibris:

Quo doctissimus poeta ad genus illud intubi uidetur alludere, quod picris appellatur. Aëtius picrida pro cichorio sylestria, quod & serin dici uult, accepit. Iulius Pollux autor est, appellatione cichorij ueteribus sylestria olera uenisse duntaxat, quaz; & gracilia & tenuia cognominabantur. In Ouidio ad curē probari feram legimus illo uersu:

Et simul instantis corpora finge feraz.

Quod autem id genus sit fruticis, non ausim decernere: nisi quis ab eo ferā pro feride uocatā credat: nam & condrilla quaz; item feris est, ad illum usum, ut Dio scorides hac parte docet, adhibebatur.

CVCVRBITA. CCCLXY.

Cucurbitam satium colocythen Græci uocant: sylestria, colocyntida. Erumpit satium post quintum, sextū, septimū ue diem. Cucurbitę multa genera, satium & colocyntis ut prædiximus: tertium somphos cognominata, quia sit inanis, digitali crassitudine, non nisi in faxosis nascent. Cucurbitam marinā nonnulli putant. Satiuz; fastigia duo, prima emerariū in tecta scandens, leni umbra testudines & pergas operiens: plebeiū humi repat flagellis. In priore mire tenui pediculo libratur pondus immobile: auraz. Crescit qua cogitur forma in uaginas utiles cōiecta, postq; deslorui: plerūq; & draconis intorti figura: libertate uero pensili concessa. Iam uisa est nouem pedum lōgitudinis. Cortex uiridi tener deraditur cibis, quemadmodum & primus quoq; caulis. Ipse quo longiores tenuioresq; sunt, eo gratiores, & ob id salubriores, quę pendendo creuere, minimum quę feminis tales habent. Chrysippus unus omnium dandnabat eas in cibis, cum tamen adagiū illud celebre iam esset: *καλὴν ἢ λυγρὴν*, hoc est, saniorē esse quam cucurbita. Siccantur fumo cucurbitaz; hortensū seminibus condendis: rusticę supellectili, Alexandrinę maxime: iam in balnearum usum uenere urceorum uice, multo etiam prius cadorum ad uina condenda.

CVCVMIS. CCCLXVI.

Cycumis à curuitate, ut placet Varroni, Græce *olus*, & Attico more sycos uocaz; & sicydion à Phrynico poeta, & cucumeria sycelata. Cucumerem Heraclides Tarentinus hedysæon uocauit. Quinto, sexto, septimo ue die emicat, sed omnino celerius quàm cucurbita, radice breui ut pepono. Dulciores sunt maceratis aqua lacte ue feminibus. Tres satii differentie Theophrasto sunt, Laconici, scythali, Bœotij. Laconici rigantur, non gaudent aqua reliqui. Adiecit ijs Euthydemus quos dactylas uocauit. Tanta porro naturę cognatio est inter cucumeres, pepones, melopepones, cucurbitas: ut sæpenumero & proprietates & nomina Latini Græciq; confundant. Ipsum quoq; instrumentum cucurbitulam Græci à cucumere cognominant, sicyam uocando: q̄q̄ non desunt qui sicyam hoc intelligant quod uulgo angurium & Palestinus melo dicitur. Athenæus certē sicyam ueteres pro cucurbita

uocare solitos affirmat: atq; ita & Nicandrus poetam uti Georgicorum uolumine secundo, Apud Græcos certē cucumeris appellatione pepones quoque ueniunt. Demetrius Ixion sycos dici uoluit, *ἀπὸ τοῦ σικυνοειδὲς*, quia Venetrem cleant: quod tamen cōtra mulcenscunt. De cucumere prouerbiū Græci celebrant illo uersu:

ὅταν τρώγονται γυναικὶ χυλίσαν ὕδατος

ut mulier uidelicet texendo cucumerem manducet: Fortasse quoniam textrix ea, ut Aristoteli placet, impudica sunt magna ex parte. Cæterum cartilaginei omnia ea generis sunt: crescūt quacūq; libeat effigie. Virides Italię cucumeres & q̄ minimi sunt, inquit Plinius, prouincijs q̄ maximi. Citrinos nigrosq; probat. Copiosissimi Aphrice, ac grandissimi Mœsie. Aquas ita diligunt, ut eas modice distantes etia distecti atte-pant. Oleum o dēre mirē, ita ut in hamos curuentur, ne attingant. Inuenti & sine seminibus sunt, macera to uidelicet semine farina cuiusdam herbe, quam culicem appellant. Citrinos cucumeres intelligunt qui uulgo citreoliā colore citrinominant, maiores multo uulgaribus, nec stricati, qui iam & in Italia passim nascuntur. Particulatim flores cucumis sibiis superflorēscens, & fideores locos patitur. Candida lanugine obductus, magis q̄ dum crescit. Seruat in muria usq; ad alios ferē prouentus, & uiridis quoq; in sabulo locis opacis, sereno sicco opertiente. Cucumeres in fistula, ut est apud Hippocratem, dimisso flore, mira longitudine quasi anguina specie proueniunt: q̄q̄ anguinus cucumis, idē uidē esse qui sylestria, multo infra magnitudinē satii, errati & angueus Columellaz; appellatus, à satiuo penitus differē, uix ut solo aspectu gētillis ei appareat. Serotiniū æstatis germen & flos, gaudetq; frigidis. Cucumim nasci præcipuum in Arabia, mox Cyrenis tradit. Alij in Arcadia, simile heliotropio, cuius inter folia & ramos proueniret semen magnitudinē nucis iuglādis. Esse autē ad speciem scorpionis, cauda reflexa, candida, propter quod aliqui cucumim scorpionū uocarūt. Decoctio nem sylestria sparfam mures non attingit, cimices necantur. Cucumis sylestria elateriū quoq; dicitur, quemadmodū ex ipso succus. Vinū & inde fit ptherium uocatū, ut post liquebit. Herbā culicem, cuius hoc capite meminimus à Theophrasto conopa uocari censēā nec ne, quoniā & cynopa scriptū est maioriparte, nō dixerim. Theodorus canis oculū & canu ram cōuertit, quasi cynopane non canopa probauerit. Olus est hoc, Theophrastus inq; primisq; post equi noctiū imbribus germinat, & inter spicata herbas ponitur: à Plinio quoq; duobus locis dictum, ut in cōligatione Pliniana demonstauimus.

PEPO. CCCLXVII.

Pepo à Græcis pepon, à Theophrasto sycos & persycos quandog dictus, à Polluce spermatias, cucumerum generi contribuitur: siquidem cum magnitudine excesse, uocantur pepones. Particulatim flores ut faba. Sunt qui & melopepones dicunt, in Campana primum reperti, effigie mali cotonei, à quo & nomen sortuito natum ibi, mox semine ex illo genus factum. Non pēdent hi, sed rotundantur humi, figura & odore præstantissimi ubi maturare: quanquam non pendentes statim à pediculo recedunt. Lusitani regis liburnicę inter alia meridianę illius navigationis miracula, melones in Aethiopia nobilissimos haberi prædicant, quoz; odorē

elephan-

elephantes sagacissimi olfactus animal, de longinquo sentiant: a duolantesq; cucumeraria tota depolentur acpropterant. Illud propter lactatam à medicis controuersiam præterire nolo, autotes esse ergo aliquos, qui precipiant, post pepones melopeponesq; unum bibendum ijs, qui pituitosi fuerint: biliosus uero acida edenda.

LACTUCA. CCCLXVIII.

Lactuca, lactucula, & lacte cula, sicut apud græcos thrudax, & thrudacina dicitur & uulgo myiulon, caulē primo blandum, processu spinulos inhorrentem habet: die quarto aut quinto emergit. Suauior reciso caule regerminat. Semē lanugine oculis. Ex ijs cārida tenerior & dulcior. Lactucæ græci tria monstrauere genera, unum lati caulis, adeo ut olitoria ex ijs ostiola lactitari prodiderint Theophrastus & Plinius, foliumq; ijs paulo maius herba ceo & angustissimum ut alibi, cōsumpto incremento: alterum rotundi caulis: tertium à gente cognomen to Laconiciū, sessile, folio scoly mi, rectū amplumq; nec brachiātum à caulibus. Alij distinguūt in nigras, rubentes, cāridas, ratione satus colores variante. Pri mas Ianuario, secundas April, tertias Martio serētes. Quidam fastigia quinq; faciūt, purpureas & crispas, utraq; Cæcilianam uocātes: tertiam Cappadoces, quartam Græcas: lōgiora his folia, caulesq; lati, præterea longi & angusti intubis similes: quintū genū picris, a maritudo insignis, unde nomen: ali j crispā, fuscā, Cappadocem, Tartesiācam, & Cypriam ut Columella. Cappadoci pexum, densum, pallidumq; folium. Tartesiācæ siue Beticæ, candidum, crispissimum. Cypriæ siue Paphiæ rubicundum ex cārido, tenerissimum acleue. Alij distinguere atram, quæ meconis & meconitis dicitur, à lacte papaueris simili maxime saporifero, quod apud antiquos Italiæ solū genus earum fuit, & ob id lactucis nomen inditum. Purpuream siue fuscā maxime radicis quam uocant Cæcilianā à Cæcilio Metello dictā. Rotundā minimā, sed latis folijs, attylida nominatā, siue ut Græca fides habet, quæ & à mulieribus, ita uocari scribit, attylida. Et eunuchion à Pythagora, hoc est, spadoniā, quia hæc maxime refragretur Veneri: Candorem lacteum contingere putant arte atq; cura: sed ijs duntaxat quibus semen albu m est. Cārida lactuca maxime hyemem tolerat. Irrespit & satius alia, ut Plinius inquit, admodū probata, quæ Cæcilia uocatur à supradicta Cæciliana, quæ purpurea est, differens: folio Cappadociæ, nisi crispum latiusq; esset. de caprina & alijs agrestibus in lactuca dicemus syluestris: & uno eodemq; pede quemadmodum lactuca, ocimum, apium, eruca, & omnino genera oleæ diuersa proveniant, Græcus autor Didymus memorat scriptum reliquit. Cyprii lactucā brentisitin uocabant. Sunt & brentiæ quædam radicales, quibus mulieres genas rubificant, quas nonnulli fucum aut anchusam interpretantur.

LACTUCA SYLVESTRIS. CCCLXIX.

Lactuca syluestris radice breuior & multicaulior q̄ satia est, sponte nascens in aruis, folio pusillo, & ubi consummatum est, aculeato: caule candidiore, à lacte copiosissimo acrimedicatoque, quod carpitur per menses scapoinciso, præclarum ad multa. Syluestris lactucæ plura genera: Elopōn de qua hic agitur: secundum capring, qua pices necantur: mariniā Cornelius appellat, de qua

inter cithymalos sermo est: Tertium in syluis proueniens, latis uocatur: quod & duplex est, satium & syluaticum, ut suo confabit loco: quartum Hieracium, rotundo folio, quemadmodum post liquebit. Communes notæ syluestrium candor caulis, interdum cubitali longitudine, Thyrsio & folijs scabris, succus omnibus candidus.

GINGIDIVM.

CCCLXX.

Gingidium Syria in hortis operosissima, unde natum sit adagium: multa Syrorum olera. Simillimam thapsylo & scandici herbam ferit, non differenda recentium medicorum imperitia, gingidium pro fumaria siue capno accipientiū.

SCANDIX.

Scandix olus est syluestre, ut in brassica notauimus, Plauto quoque dictum. Hæc Aristophanes Euripidi poætæ obijcit ioculariter: matrem eius ne olus quidem legitimum uenditasse, sed scādicem. Vnde uerbum *scandix* pro eo quod est, *scandix* confictum, hoc est, ad imitationem Euripidis aliquid aut dicere aut facere. Eademq; erat, ut Theophrastus ait, enthussicon, siue ut Athenæus & Plinius anthriscōn, sit enuiora folia odoratoria que haberet. Et iasione olus est syluestre, repens in terra, cum lacte multo, florem fert candidum. Concilium uocat singulari folio: sed ut descriptio tamen, & quasi rudimetum multorum in ipso appareat. Theophrastus autor. Plinius, folium inquit unum habet iasione, sed ita implicatū, ut plura uideantur. Huius flos ut Theophrastus uerbis utar, conceptaculo auerfa parte non indiget, sed postrema eius exeunt in angulos, qualis ferè oleagineus aspicitur. Stimulat hæc herba coitum, lactis uberatatem præstat, phthisicis prodest, infanti illita capiti nutrit capillum. In Plinio tamē pro iasione lassina deprauatum erat duobus locis. differt scandix à sandice: quod scandix herba est, sandix metallica. Scandix aliter non describitur, quam quod olus est syluestre, gustu acri subamaro que, folijs anthriscis, sed maioribus & minus odoratis. In exemplari Græco Dioscoridis appictam uidi scandicem, lœniculi folio ferè cum corniculis, in summo floribus luteis siue albis. Hæc ipsa species in syluis quoque uisitur, frutice odorato, flore candido. Paulus, Aëtius, & si recte memini Galenus, similem gingidio fecere scādicem.

CAVICALIS.

CCCLXXII.

Caucalis olus est flore candido, syluestris daucos ut Galenus inquit, à pluribus uocata, propter similitudinem & gustus & uirum.

ERUCA.

CCCLXXIII.

Eruca euzomos Græce dicta, quoniam commendet iura. Concitat hæc morantem, ut poetā inquit, Venerem, frigorum contempreris: iccirco inungitur lactucæ in cibis, ut contrariæ duarum naturæ temperamentum afferant. Nemo ignorat florē erucæ cādidū, multas in folio diuifuras esse.

OCIMUM.

CCCLXXIII.

Ocimum prorūpt & terra celerimē, floret particulatim, contrā q̄ olus cæterum. Primo parte inferiore, deum superiorem: quod fit ut diutius quoque floreat, quemadmodum faba & heliotropium. Radix uae descendit in altitudinem crassa, & admodum lignosa. Cæteræ à lateribus exiles ac prolixæ. Semini cortex obducitur. Vni ocimo aqua datur meridie: cū cætera matutinis rigent. Erucen.

Feruenti quogaqua sparsum, maturius prouenire dicitur. Sub canem exalbescit. Differre uidetur ocyum ab ocimo: quod ocyum pabuli & farraginis quoddam genus est, uocatum ab ocys uerbo quod ualet cito, ut Varro placet: siue ab eo quod citat alium bubus, & ideoque datur ut purgentur. Pabularium & Catoni erat ocyum, sed sistebat eo bubus alium: id erat & segete uiridi defecta antequam gelaret: quam manibus carpendum, non falcula secundum, ut renascatur ocyum Cato precipit. Sura Manilius aliter interpretatur, & tradit fabam modios decem, uitia duos, tantumdem & cruillam in iugerum: melius & hauena Græca, cui non cadit semen, addita misceri & autumno boi causa feri solitos: hoc apud antiquos ocyum uocatum. De ocimo sunt qui scribant capras id aspernari, & insaniam facere. Tritum speriatur lapide scorpiem gigni. Manipulo eius cum canis decem marinis uel fluuiatilibus trito, conuenire ad eum scorpiem ad proximo omnes. In cibo pediculos facere. Capras id evitare alij uolunt. Habetur & syluestre ocimum, quod aliud est quicquid aginos: quam quicquid aginos quemadmodum & ocimoides, à Romanis ocimastrum uocari Dioscorides existimat. Illud monendi sumus, de syluestri ocimo nihil scripsisse Dioscoridem: de ocimo de nihil Plinius. Martialis de ocimo scripsisse miram dicitur: quod modo putreos, modo albos, modo roseos flores pariat: & si ex eo semine frequenter fati sit, nunc in serpyllum, nunc in silybrium abire solitum. Recentiores Græci: qui de rustica re scripserunt, basilicon & misodolum appellat ocimum: tantumque cum eo scemine discordiam inesse prædicat, ut si pulcario subiectum sit, nec mulier id fiat, futurum ut nunquam cibo manus admolatur, priusquam subductum fuerit: ut fortasse huc alluserit Persius poeta illo uersu:

Dum ne deterius sapiat panutia baucis.

Cum bene discincto cætauerit ocima uerna.

Pro exantauerit, hoc est cantando exclusit. Nam & Vatro Plautusque, ut ait Nonius, exantare usum patet pro excludere. Meretricula quandam Corinthi Ocimi uocatum legimus in comedijis: sicut aliam Abrotonum, quæ & Themistoclis mater fuit nomine: quamquam sunt qui Euterpem uocatam scribant, & aliam Thryallidem, & aliam Sisybrium, & aliam Meconidem, & aliam Herpyllidem, & aliam Myrrinen.

OROBANCHE. CCCLXXV.

OROBANCHE. CCCLXXV. Orobanchæ cynomotion quoga appellatur à similitudine canini genitalis. Enecat & cicer, circumuoluendo se ut eruo, unde nomen orobanche. Dicitur à recenti Græcia & *καρπώδης* & *λεοντίνος* *βερβάνη*, hoc est herba leonina.

TRAGOPOGON. CCCLXXVI.

TRAGOPOGON. CCCLXXVI. Tragopogon hoc est hirci batia, quæ & scandix à Plinio uocatur, nisi quod suspicor, deprauata lectio est, describitur à Theophrasto in hunc modum: Radix longa, dulcis, folium croci longius, caule paruo, super quem calyx latus & barbula: quæ summo uertice incana & proluxa funditur. Nescit in asperis sine usu. Acetarium quidam olus hanc esse falsum uolunt, quia uulgo barbam petra, & in calia cispadana barbula hircinam uocent. Habetur & quæ getontopogon, id est senis siue presbyteri barba dicitur, tragopogoni ferè tota similis, nisi quod lacte manat, & radice amara est, non dulci, à Nicandro ge-raos pogon fortasse nuncupata: sed & radice dulci

carpitur Romæ. Tragopogona uocari & in trago pisce, inuenio partem sub gula eius nigratam, ut Athenæus autor est. Tragos porro piscis ex occeto, qui & Adonis uocatur, similis describitur, præter nigrum id quod sub gula cum habere diximus.

ORNITHOGALE. CCCLXXVII.

ORNITHOGALE siue ornithogalon caulem habet semipedalem Plinio, Dioscoridi duum palmo rum. Coquitur in pulre.

TYBERA TERRÆ. AE. CCCLXXVIII.

TYBERA TERRÆ. AE. CCCLXXVIII. Tybera Græce *Ἰβήρα* à Galeno dicitur, quidam à tumore legunt *ἰβήρα*. A Theophrasto describitur, carens medulla, neruis, uena, cortice: hoc & Aschion ab eodem autore nominatur. Sunt & alia sine folio, aut herba, aut caule supra terram piluscula, cibo idonea in Aegypto maxime, ut aracida & quod araco simile uocatur à Theophrasto. Plinius atacos appellat fructum. Duo hæc pariter sub terra non minorem superno: cuius pars carnosa radicem mittit altam atq; crassam, simplicem: cæteras uero quibus insidet fructus, graciles atq; multas, & summo cespitate coherentes agit: nec folium, nec herba ulla, aut quicquam aliud supra terram cernitur. Loca modice arenosa diligunt. Quia porro geminum & utraq; parte fructum ferunt, *ἰβήρα* cognominatur.

SMILAX HORTENSIS. CCCLXXIX.

SMILAX HORTENSIS. CCCLXXIX. Smilax *ἡμικλῆς* id est hortensiana, non eadem uidetur esse cum ea quæ leuis à Dioscoride quarto libro cognominata est. Recentiores cum Aëtio phaeolus à Dioscoride hoc loco intelligi scripserunt, utique non candidum, sed rubentem, qui & lobos & dolichos dicitur, & Latine siliqua: Etenim duo esse phaeolorum genera Paulus Aegineta in compositione quadam ad remum uitia quæ *ἡμικλῆς* uocatur indicat, phaeolosin eam querendo candidos, quasi sint etiam non candidi: quamquam est ubi Plinius siliquam syluestrem dicendo, sciamus quo quæ fieri possent aliquam intelligat: de quo in simillace tractet latius. Porro Theodoros cognomento Priscianus, quam recentiusculus: phaeolo inquit uirtutem eam tribuunt, ut & uentem soluat, & urinam moueat. Dioscorides phaeolos alium lobia siue simillacem urinas ciete uoluit.

MEDICA. CCCLXXX.

MEDICA. CCCLXXX. Medica nominationem unde inuenit, testatur ipso nomine: quamquam imperitia uulgi melica uocari coepit. Theophrastus perire stercoreatam putauit, aut minuste pecoris inqum-bentis resperam. Pet bella Persarum, quæ Darius intulit Græciæ, aduecta scribitur. Differt ab ea quæ Medion uocatur, ut suo loco indicabim. Medica feritur iactato semine, ita ut pabulum & frumentum, tanta doct, ut non satius plus tricenis annis durare credatur. Similis est trifolio, caule folijsque semper uirens, ut Dionysius est autor. Item geniculata. Quicquid in caule affurgit, in folia contrahitur. Sexies reflorescit: cum minimum, quater, modo non secetur. Arescit surculosa: postremo in puluerem inutilem extenuatur. Pabularium omnium comendatissimum. Hac quondam plena erat Venetia, sed pridem perijt: nunc in eandem prouincia reuertit eam quasi postliminio curauimus, ab annis multis ferè non uisam in Italia, sed ne intellectum quidem magnopere qualis esset, allatam ex Africa

in Campaniam. Semen eius sub dente phaseoli recē-
tis saporem præferat. Propter altitudinem radicū
eius reliquæ herbæ intereunt, sine ipso damno.

APHACE.

CCCLXXXI.

Aphaca differt ab aphā, quæ olus item est ut
aphaca, florem edens cum germine. Differt
et ab apharca, quæ arbor est uet dōi similis,
ut diximus. Aphacā Theophrastus modo leguminū
generi, modo inter olera connumerat: et ut uerum
farear, idē an diuersū genus sit, ferē ambigo: Olus
inquit est aphaca, imbribus autem sunt alius
germinās, per partes florendo, amaritudine ingusta
bili, aculeata herba: uerum ex mitioribus properat
flos eius, sed breui marcescit, et in lanuginē pappum
uocatā soluitur: deinde alius subnascitur, atq; iterum
alius, hyeme tota, et uere usq; in æstatē, qui et luteus
sit. Forma siliquis aphace latiuscula, ut lenti: celeriter
perit ut dolichos: necatur a securidaca. Semen præ-
ter alias differentias madidius est q̃ lentis. Inuenio ē
recentioribus, qui uiciā esse aphacē existimant.

PORRYM.

CCCLXXXII.

Porrum siue porrus, die à satū decimono, in-
terim uigesimo prorumpit. Bienniū perfert: ab
eo tempore semetescit emoriturq;. Vermiculi
porros, brassicā, lactucasq; infestantes, et alia quædā
olerum, prassocurides uocātur, quasi porricidæ, aut
etiā ut Palladio uidet herbicidæ: non ut Theodorus,
blattæ alueariorū apud Aristotelem, q̃ uermiculi pro
uermiculis legerat: etiam si tinea aluorū in Columella
dici legimus exstercore papilionū nascentes, et luci-
fugas blattas in Marone. Nascitur et in mari porrum
extra Herculis columnas, ut Theophrast⁹ inquit, sed
inter algarum genera. Capitū porri oracī cepha-
loton appellat, et gethyllida. Sūt qui gethyllida, pro
gethyo acceperint, quod et epithyllida uocauerunt.
Didymus uir doctissimus, is qui tria milia et quingē
ta scripsit uolumina, gethyum simile facit ampelo-
praso, mox dicendo. Gethyllides, ut Athenæus inq̃t,
Latonæ sacras esse Græci uolunt, quoniā olus id in
Malacia prægnans Latonæ occupasset. Delphis legē
esse, ut qui maximā attulisset gethyllida, sportulam
et sacerdotis mēsa caperet. Has magnitudine rapi cre-
scere nonnunq; tradunt. Gethyon inuenio et getion
sine y et aspiratione scribi.

AMPELOPRASON.

CCCLXXXIII.

Ampeloprason dictum est, quoniā in uinctis
folio porri nascitur, ructugraue.

CEPA.

CCCLXXXIII.

Cepæ, aut etiā cepulæ, caua sunt folia, quod pe-
culiare cū gethyo habet, nec nisi oleribus hæc
proprietas. Plura eaz genera: Sardix, gnidix,
Samotheaciæ: Seraniæ omnium minimæ, sed prædul-
ces: præterea fissiles et Alcanoniæ. Fissiles appellant
quia hyeme cum sua coma inertes relinquunt, et fo-
lia uere detrahunt: sijs deniq; diuisiuis alia parte infe-
rioribus subnascuntur. Hoc exemplo reliquis etiā generi-
bus uelluntur, ut in caput crescāt potius q̃ in semen.
Alcanoniarum propria natura: etenim uelut steriles
sunt ab radice, nec parte illa crasse sunt. Maturæ cele-
riter putrescunt. Seri semine præcipiunt: quia deposti-
tæ, caulem sementi tantū reddat, deinde inaniantur
et euanescat. Samo et Sardibus cādidissimæ pro-
ueniunt. Iulius Pollux et Samotheaciæ commendat. De
Creticis dubitatur an eadē sint quæ Alcanoniæ: quia
satis capitari soleant: sed dicitur sapore tantum dulci,

Reliqua ceparum genera dolumeli proficiunt. Asca-
lonium genus optimū Columella prædicat. In nomi-
ne est et Pompeia cepa, et Marfisa simplex, quæ uo-
cant unionē rustica: ea est aut quæ non fructificauit,
nec habuit soboles adherentes. Cepa in rectitudinē
dissecta non germinat. Radix nō ut alio nucleis in-
cluditur, sed tuniciis ut bulbis et scilla. Cepæ sylue-
stres non sunt ullæ, ut qui apud Aristophanē poetā
thymum pro cepa syluestri capiti, etraffe coargua-
mus obiter. Mentem lædi cepa quidam scripsere. Hip-
pocrates conspectu potius q̃ elū cōmendat dicit.

ALLIUM.

CCCLXXXV.

Allium siue caput allij, habet plures uelut co-
hærentes nucleos siue spicas, quas Græci gel-
ges et aglithas, Dorice ipsum quog; allium agli-
dion appellat quādoq;. Distingunt, q̃ aliud præquox
est, sexagesimo die maiorem scilicet, aliud serotinum. Est
et in magnitudine diuersitas. Vicipiū nominat præ-
grāde, Græci Cyprium et antiscorodon præcipue ce-
lebratū Africa, ob id et Aphroscorodon siue à spuma
dicitur, à nostris allium Punicū uocari consuevit, sed
crudum inter pulmentaria ruris, quæ myrtotos ap-
pellat, allio trito in oleo et aceto: ut mirari sit, quantū
ita incretat spuma. Myrtotos ab odoris fastidio est
dictus. In hunc et caulem quog; adde bāt. Alij genus
placentæ faciunt ex oleribus, ut Photion: nos in Dio-
scoride q̃ hac parte myrton legitur, myrton legē-
dum monemus. Est et in nucleis diuortiu: quod enim
plures fuere hoc asperius sentitur, genus esse Theo-
phrastus ait sine nucleis. Radix primo extumescit in
nucleos, deinde de curuatur: ubi accreuit, diuiditur ite-
rum in nucleos, et ex uno plura fiunt, præsertim ul-
picum, ut cepæ: nisi matura protinus uellatur. Scor-
diō à scorodo id est allio, itē ophioscorodo id est allio
syluestri differt: q̃q; imperitia medicorū fit, ut allium
syluestre pro scordio in pastillos theriacos addi soleat:
cum tamen scordium folio trixaginis non allij de-
scriptum legat, si modo auctores bonos audire susti-
nent. Sunt in quibusquidē capite sed nō folio: nam et in
cepa et in porro capitis et capituli nomē legas apud
Columellā. Alioq; manipulū Græci *ισπικαν* appellat,
adhiberi solum quibusdā sacris, ut Photion inquit:
in quibus mos erat allium masticare, ne unguenta redo-
lerent. Comas eius cum capite suo molyzam Hip-
pocrates appellat. Caput ipsum etiā dactis uocat: q̃q;
dactis lapadē quog; pusillā significat. Galenus auctor.

SCORODOPRASON. CCCLXXXVI.

SINAPI.

CCCLXXXVII.

Sinapis et sinapi et sinape media producta legi-
tur. Græci et napy uocat, quasi naphy, ut Athe-
ngus interpretatur: quoniā acri et proinde inco-
moda natura esse uideatur: addit et pusillo corpore.
Sinapi uero dici putat, quia olfactum luminibus of-
ficiat, ut allium. Athenienses etiā thapi et lauriū ap-
pellat. Quanto die potest satum cōpare: eoq; semel sa-
to, uix est liberare locum, quia semen candens protin-
us uiret. Tria eius genera: gracile: secundum, rapiso-
liss: tertium, eruca. Optimū Aegyptiū, præsertim ad
sinapismū, in quo usu et Syriaticū probatur. Succus
tribus modis exprimi in fictili, calcescit in eo mo-
dico ad solem. Exit et cauliculo inciso lacteus, ad den-
tium dolores cum induruit. Fit et oleum ex semine,
ut docuimus: pro pulmētario quog; in patellis deco-
quuntur, citra intellectum acrimoniæ: Coquuntur et
folia

folia sicut & reliquorum olerum. Pythagoras principatum ei dedit inter ea, in quorū uis in sublime fertur: quia non aliud magis in nares & cerebrū penetret. Sinapisimus à dropace distinguitur: quod dropax cum pice fit, eolypittois & pitois quocūq; dicitur, hoc est oppicatio: Sinapisus ē sinapi cōficitur, multoq; uehementior est dropace: propterea sinapisimum dropax uel præcedit, ut præparet uel consequitur, ut reliquias absoluat. Maxime laudatur dropax galus cognomine.

NASTURTIVM.

CCCLXXXVIII.

Nasturtium die quinto enascitur: duorum generū, micæ ac syluestre. Prioris quocūq; ratio duplex, albi & nigri. Nomen ei a natum tormēto, uigoremq; uel prouerbio significat: iubente nasturtium mandendum inertiūbus, quasi torporē excitet, animumq; obacuat: contra, uenerem inhibeat: quāq; Dioscorides accendi eam putet. Miræ amplitudinis in Arabia dicitur gigni. Nasturtiū herbis reliquis succū admixtū iuxta satis, quod ut apud Aristophanem poetam legitur: Hanc Greci non modo cardamum, sed etiam cardamida uocant, ut Galenus inquit, & Hippocrates sauridion, à sinapis, quod & saurion dicitur, similitudine. Miletium nasturtium ueteribus laudatissimū fuisse Iulius Pollux auctor est. Persas id cum sale mentis apponere solitos celebre est, cum principio frugilitatem amplecteretur, mox aucto imperio, in omne genus luxus prolapsi.

THLASPE SIVE THLASPI.

CCCLXXXIX.

Thlaspe loculos fert peltarum similitudine, in quibus sic semen: folia latitudine digitali & longitudine. Galenus thlaspen, Dioscorides thlaspi neutro genere pronitiat. Thlaspiō & thlasposin Hippocrates, peltā Amazonicā Iulius Pollux hedere frōdibus affimilat.

ARABA.

CCCXC.

Legebatur Draba non Araba. Sed huius secundæ calce, ubi caput hoc repetitur, arabis siue Araba, non draba scriptū est. Galenus Paulusq; nullam mentionem huius herbe faciunt.

ERYSIMON.

CCCXCI.

Erysimon Galli uelularum, irionem Romani appellat. Inter fruges annumeratur, caule ferulaceo ut sesama, flore item ut sesama foliaceo, amarum, fruticosum, folijs eruce angustioribus paulo & sanguineis, omninoq; ut Theophrastus inquit, sesamæ proximum, nisi esset pinguiusculū. Erysimon nostri herbarij significat, quæ uulgo nobilis eruca dicitur, quāq; eruce peræ præferunt, ut mirum sit, quā mobrem inter fruges à Plinio constituta uideat.

PIPER.

CCCXCII.

Piperis genera duo Theophrastus constituit: totū ut eruum, putamine carneq; subrutila ceu lauri bacca, oblongi, nigri, semina continentis papaueracea, quod muleo ualidius priore iudicatur. Passum in India sunt, ut Plinius existimat. Quæ piper gignunt arbores, iuniperis nostris similes: quamquam in fronte Caucasī solibus oppositæ, nasci tantum eas aliqui putauerunt. Semina à iunipero distant paruulis folliculis, quales in phaseolis uidemus. Piper quod interperie cœli carbuncula tur, lingua Indorum bregma dicitur, significans abortum: hoc & pallidum est & asperimum. Tria cæteri fecere genera, nigrum, quod & commune dicitur à medicis, Dioscoride, Paulo, Aëtio de nigris longo & nigro est candidum, Piper longum facillime adulteratur Alexandri

no sinapi. Emitur hoc in libras xxv. album xviii. nigrum xiiii. utiq; Plinij temporibus. Nicander Colophonius uetustatis studiosus, non peperis sed peporion appellat. Hippocrates uero medicum pharmacum. Aliud genus est apud eūdem Hippocratem indicum pharmacum, quo feminæ, quibus anima fœtet, ora sibi collunt. Medicamentum id est, cuius cōpositionem reddidit ipse: ceterum est ubi piper semen indicum dicatur ab Hippocrate, in quo rotundum, quod inest, myrtidanum uocari prodit. Est etiā ubi rotundum piper strongylen myrtidanū scriptum reperias in eodē auctore. Syluestre porro gentibus suis est piper. Piperis arborem iam etiam habuit Italia, maiorem in myrto, nec absimilem. Amaritudo eadem recentī, & cum la tescit, quæ piperi. Desideratur tota illa maturitas: ideoq; & rugarum deest & coloris similitudo. Huiusmodi est & quod Lusitanie regis diligentissimi lumburnice magna parte meridiani situs ambitu Mauritaniæ circūuectæ, retulere hoc anno: sed abest illa, ut dixi retorrida rugosaq; maturitas: nā solibus tostum piper, ē candido & leui mutatur in nigrum rugosumq;. Adulteratur iuniperi baccis mire uim trahentibus: in pondere uero multis modis. In Aegypto granum piperi simile paulo tātum maius nascitur, corion uocatum, ut Straboni placet. Est etiam in India piperis grans simile, quod uocatur garyophillon grandis fragiliusq;. Tradunt in loco Indico id gigni. Aduehebat odoris gratia, nunc & cibi ut piper, Septentrionis maxime populis. Paulus Aegineta caryophyllon non garyophillon uocandū existimauit quasi nucifolium: etiam si hāc inquit nō habet naturam, quæ nomine præterditur. Sed flores arboris cuiusdam Indicæ fœtucæ caci sunt & nigri, longitudine pollicari, acres, odorati, subamari. Lignum eius xylocaryophyllon appellant. Ab huius odore uiolarum genus altilium caryophyllon, uulgo dicitur ubiq; modo nascens.

ZINZIBER AVT ZINZIBERI.

CCCXCIII.

Zinziber in Arabia & troglodytica in uillis nasci dicit. Parua herba, Pretiū radicis in libras vi. Quidā hāc & siniberim & gingiberim appellant. Facile pertundit zinziberi ob incoctā quandā & excrementi corporis uulginē, ut Gale inquit.

HYDROPIPER.

CCCXCIII.

Hydropiper quale sit in Plinio, nondū cōperit: nā piperitis, quæ & siliquastrū dicitur, nō nihil ab hydropipere uidetur differre, non solū medicinæ usu, uerū etiā descriptione: monstrat enim caule rubro & longo, densis geniculis, folijs lauri, semine albo, tenui, gustu piperis, uulgo dicta costū. Di stat potro siliquastrū à salicastro, ut in mentione suā docebi mus: sicut & à seliquastro: Etenim seliquastrū herba nō est, sed antiqui generis sedile, ut Pompeius inquit. Georgius Tiphernās siliquā ceraunā in Strabone siliquæ altius interpretatus est pessimē. Nō desunt q; Persicariā modō nominatā hydropiper esse suspicentur: quāq; folium Persici huic reddatur, unde nomen: hydropiperi uero mentæ atq; lauri. Est & in folio Persicariæ litura, maculæ modō inscripta: quæ si fuisset in hydropeperi, fortasse non omisissent auctores. Est ergo Persicaria folio Persici, flore candido, spī caceo, gustu acri, semine minuto, caule nodoso, rubenti, longo: quæ sunt omnia & hydropiperi tributa. Liberum sit æstimantibus iudicium,

PTAR MICE,

CCCXCV.

Parnice

294 **P**armice subfalso herba gustu, diptarmice à quibusdam uocari solita, quoniam sternutamentum iterari faciat.

STRUTHION.

CCCCXCVI.

Struthio à nostris radícula uocatur: spinosa herba, non tamen acanacea. Flos sine odore, spectabilis aestibus, caule lanuginoso: semen nullum: radix magna, quæ conciditur purgadis lanis: mirum quatum cõferens cãdore mollitrag. Nascentur satia ubiq, sed sponte in Asia Syriag, taxosis & asperis locis præcipua. Trans Euphratem tamen laudatissima, caule ferulaceo, tenui, & cibus indigenas expetita, & tingenti quicquid sit, cum quo decoquatur. Folium oleæ à medicis aureum poculum uocatur. Hippocrates commendat nascẽrem in Andro insula litoribus. Ab hac similitudine potiorum quoddã uasculũ fortasse struthion appellatũ sit. Smyrneæ mulier Galena, florem hunc nõ struthion, sed struthion uocat. Porro struthetum Latine, ut est apud Festũ, à salacitate passeris, membrum uirile significat, præcipue in mimis: ut qui passerem in Martialis & Catulli uersibus aliter accipiunt, nihil mihi dixisse uideantur: ne quis in ea re Policianum, quia sine autore loquitur, somniasse cauilletur.

CYCLAMINOS.

CCCCXCVII.

295 **C**yclaminos à nostris rapum, & tuber terræ dicitur, ut inquit Plinius, non malum terræ, ut Theodorus putauit: nam malũ terræ, ut Dioscoridi uidetur, aristolochia est: erraticum uero malũ à Plinio uocatum, & ad calculi radice commendatum, quale genus sit, nondũ competeri: præterq̃ si quis pro anthemide accipiat, quando uilem uesicę uirgĩẽ tam nouimus, & ~~hanc uirginem~~ hoc est malum terrestre dicitur à Græcis. Cyclaminos folia habet minora q̃ hederæ, nigriora & tenuiora sine angulis. Flos ei, ut Plinius scribit, Colossinus, & in coronas admitti solitus: Est autẽ genus in eo nomine coloris, ut Straboni placet, à Colossis urbe Troadis, ubi præcipua laniatij commedatio fuisse, quemadmodũ Laodiceæ coracium pecus, à colore item uelleris appellatũ. Sed cum duo florum genera cyclamino reddũtur, purpureum & candidũ, uter eorum Colossinus dici possit, extimandũ relinquimus. De coracino Leodicẽsum uellere etiam Vitruuius. Pernicialia cyclamino cum olere sunt odia: siquidem aduersam ei brassicam inarescere affirmant. Sphæritis herba quæ sit Aetio, non constat: quid si cyclaminon inter preteret cum q̃ alopecias emendat, tum q̃ cyclaminos orbicularia Latine dicitur, hoc est sphæritis.

ALTERA CYCLAMINOS CCCCXCVIII.

297 **C**yclaminos altera est cui nomẽ ab hederæ floribus impositũ uocabatur, & de qua hic agit. Plinius & tertiũ cyclaminon demonstratũ sibi prodidit, cognomine chamæcissũ, uno omnino folio, radice ramosa, qua pisces necatũr: ideoq̃ hãc proprie ichthyoteram uocari autumo: q̃q̃ nomen hoc à Dioscoride cyclamino primã datur.

DRACUNCVLVS maior. CCCCXCIX.

Dracunculus à caule uario draconis more dicitur: siue à cauda, quæ illi subrutila est, & draconis intorti modo conuoluta. Diffonat aliquantum in hoc genere scriptores: alijs dracunculũ ab aro separatibus, alijs idẽ existimãtibz. Glaucias dracunculum sylvẽstrẽ arũ uocabat. Phœnias aron, & aroniã: aliqui radicẽ arõ appellauere, caule dra-

cuntion. Theophrastus aron putauit genus esse, sub quo species quasi multæ continerentur. Dioscorides quatuor uidetur fecisse genera: dracunculũ maiore, dracunculũ minore, aron & arisarõ: q̃q̃ in describẽdo aro discrepat à Plinio. De dracunculo quoq; parę cõuenit inter eos, ut sequẽti capite liquebit. Dracunculus hordeo maturefcẽte fodit luna crefcẽre, serpentiã sunt qui uocent. Inuenio apud Hippocrate & ophiin herbã, semine muliebribus medicinis utili probari: nec an eadem sit cum dracuntio faris constat, etiam si à serpente nomen habeat. Idem Hippocrates candidam radicẽ cum nominat, dracuntij radicẽ, ut Galenus uult, intelligit.

DRACUNCVLVS minor. CCCC.

Dracunculi duo sunt Dioscoridi, maior & minor, ut prædiximus: Plinio tres: Vnus folijs betæ, nõ sine rhyso, flore purpureo, similis aro: Alter radice longa ueluti signata articulosaq̃, tribus omnino cauliculis: Tertius folio maiore q̃ cornus, ra dice harundinea, totidẽ (ut aiunt) geniculata nodis quot habet annos, totidẽ etiã folijs. Aetius dracunculi semẽ occultari terra, & piperi simile describit. Oli tores & draconẽ uocatã ferunt, huic toto genere dissimile, quã mirabili quodã modo nasci prædicant ex lini semine incluso raphanis, aut scillæ bulbis, atq̃ in terra obruto: pusilla herba, nigro ac minuto semino, folio tenui & oblongo, acri & utrangoriginẽ prodẽre, linguã & folio & radice amburens, & aceri & salis gustu. Pyrethriũ sunt q̃ uetenibus appellatã falsũ putent hãc, inter olera acetaria gratissimã: ita enim uocare institit quicquid crudũ mãditur ex acero, uale, oleo: quauquam ortos uos prisci acetaria uocabant: non ab aceto, ut quidam rari sunt, sed ab accipiendo, quasi acceptaria: quippe quos ut inquit Cicerõ, quasi alterã succidiã uereres habuerint. Ab eodẽ uerbo & acetabulum deducitur, etiam si Græci oxybaphõ ab intinctu aceti nominatã: ita enim aceto uas dicatum uocabãt, ut Athenæus restatur: q̃q̃ & mensuræ genus significat, quod & cochleare dicimus.

AROS.

CCCCI.

Arorum Theophrastus inquit radices inhibita germinatione sunt alcales, folijs uidelicet terra obrutis. Prægrandia hæc sunt, itẽ caua, cucumeracea. Radix nuda castore, quẽ mãdi possit: nam & folia in aceto inquit decocta eduntur, nec insuauis cibus est, caule ei nullũ reddunt. Differt à dracunculo, si Pliniũ sequamur, qui radice habet nigra, in latitudine rotundã multo maiorem, & qua manẽ impleatur dracunculus subrutilã & intortã. Semen ei feruens ac mordax, aro lenius, quod & Galenus confirmat. In cibus aros fœmina præfertur, quoniã mas sit dulcior, & in coquendo lenior. Folijs arũ cascum ne computrescat, seruari affirmat: quod quidẽ à Dioscoride maiori aut minori dracunculo tribuitur.

ARISARON.

CCCCII.

Arisarõs, siue arisarõ in Aegypto nascitur, similis aro herbæ, minor tamen multo, minoribusq̃ folijs, & utiq; radice, quæ tamen oliuæ magnitudinem prægrãdis implet: alba geminũ, altera unicũ emittente caulem. Corruptere nomen huius herbæ edicunt, ut ab ipis iam non arisarõs, sed detritis duabus literis, alarõs dicatur: quod quidẽ & in asari mentione testati sumus, Est & aris herbã Hippocrati, nec qualis sit, & an pro arisarõ capiendã sit, non constat. Aris & instrumenti quoddã genus est.

ASPHO.

Asphodelus de clarissimis herbarum hastula regia uocatur: radice cibus apta, folio porri syluestris angusto, pro longo, sublenito, caulē precelenti qui cubitalis est, & saepe duum cubitorum: antheriscos siue anthericos à Græcis, albus à nostris proprie uocatus. Differt antheriscus ab antherisco, ut ex mentione scandicis facile colligitur. Asphodelus & aqua & sicco uiuit: lignosum ei semen, copiosum, triquetrum, colore atro. Nasctur in orbiculo subiecto flori, decidens estare, folliculo dehiscente. Particulatim floret asphodelos, in cipiēs ab imo. Vermes in eo uolucres, specie flosculorum erosio floris incipientis operimento euolant. Proprium huic cauli, q̃ tametsi leuis & angustus, in ramulos tamen funditur superne. Torretur hic in cinere ad esum: item bulbus cum semine, oleo & sale addito, cum ficiis quoq̃ tunditur, præcipua uoluptate ut uidetur Hesiodo, in syluis eum nasci prædicante. Mentionem asphodeli & Homerus fecit. Heroion siue ut alij codices erineon appellatum ab aliquibus uideo. Cochleæ terrestres mire in Campania cuilem eius persequuntur, & sugendo arefaciunt. Bulbos eius napsi modicis similes octoginta saepe simul aceruas autumnū colligunt, cum plurimum ualent. His mures necantur, & cauerna præclusa immoriuntur. Amuletum esse putant in domibus ante portas satū. Hellenicus prodit quodam esse Nomadas in Libya, qui nihil aliud possideant q̃ situlam, gla dium, & calicem, & ex asphodelo casulam, umbre tantum gratia, quam & circumferat. Eius tamen genera duo faciunt, albu cum intelligentes candidum, cuius capus cubito amplior, purus, leuissq̃: asphodelum uero, siue hastulam regiam, cui acinosus sit caulis. Dionysius discereit sexu, marem & foeminam pronuntiando in ea.

BVLBVS VOMITORIVS. CCCCLIII.
Bulbus uomitorius, à Græcis *ἰατρινὸς* uocatur, folijs nigris.

BVLBVS ESCULENTVS. CCCCV.

Bulbi folium angustum, ut omnibus ferè bulbosis. Radice seriat horrentis: nam semine partim primo, partim sequenti anno prouenit: quod & in hauena, loto, betaq̃ conspicitur. In Taurica Cherfoneſo tam dulces sunt, ut crudi mandantur. Laudatur ex Alcathoe Pelasga, ut Ouidius ait, urbe, candidus, hoc est, ut puto Megaricus, aut, ut Paulsanias, sed ad Venerem. Idem autor: Daunis an Libycis, bulbus tibi missus ab oris,

An ueniat Megaris, noxiū omnis erit.

Est & bulbi genus circa ripas amnium, cuius interesculentam partem, & summum corticem lanea cōtineatur natura, ob id eriphoros appellatū, ex qua uestes quoq̃ fiant. In Indis bulbi non lanigeri, sed critici nascuntur. Bulbis amaritudo in uertice. Habetur & bulbina rubicundo radicis bulbo: item candido & squamis carente, folijs parace, ut inquit Plinius. Codices antiqui non parace sed paruis habent: Ego porraceis legendum existimo: quandoquidem ita modo cernit bulbina, quam Maurice buberigi cognominant herbarij, folijs croci, flore uiole purpureo, siue ferrugineo in spicis, nigro semine. Syluestrium bulborum florem coronis inserere ueteres, anemonem uocantes post Narcissum, ut Theophrastus inquit, exeuntem uere. Codion bulbi eum florē

Græci

appellant: hand scio an hic sit, qui per initia mensis Aprilis Narcisso similis erumpit, maioribus diuisuris, ceu stella quaternis folijs candidus, cum caocis interioribus & odoratus, fronde porracea, radice bulbosa ceu allium, sine odore, glutinosa. Bulbū ruffum Græci *βυλβον* & Hippocrates *βυλβον πυρρὸν* uocant. Inuenio apud Hippocratem genus syluestris olens omoconitidem siue oloconitidem nocari, dulcem, bulbo simili radice, uerum parua, & oliuæ magnitudine, ad secundas trahendas utili.

SCILLA.

CCCCVI.

Scilla, siue ut Varro appellat, squilla, Hippocrates uero etiā scella & terra & mari alit, Radix sit bulbus an cyma, siue fructus, à Theophrasto dubitatur: quā sunt q̃ radicem in ea geminā demōstrēt. Vtūq̃ tenera esu est, nō omis, sed ei q̃ ab usu epimenidia scilla dicit, angustiore folio ac leuiore q̃ reliqua eius genera, quibus omnino lata ea sunt. Gernant celerius quædam intra scillam confita: nam & fructus condendos præsertim granata seruat, exempto pediculo prius. Folio caulis, ut in croco & Narcisso profilit. Florere ter dicitur, singulis floribus singulas sementes quæ ternæ, denuntiat. Cum senuerit, folia demum emicant. Scillarum in medicina species duæ: alba, quæ masculus: nigra, quæ femina. Genus unum scillæ aut bulbum eius omnem Hippocrates schœnon uocat, ut Galenus inquit: quāquā sunt qui schœnon scribingant, non schœnon in Anstophane poëta.

PANCRATION.

CCCCVII.

Pancration quam & scillam pusillam uocamus, 307
folijs lili alij crassioribus aspicitur.

CAPPARIS.

CCCCVIII.

Capparin siue ut Palladius cappar, alij diligenter marcescere affirmant, alij negant. Frutex est firmioris ligni, seminiosq̃ cibi uulgati: caule quoq̃ una plerumq̃ decerpto, aculeatos rosæ modo ramos habet: folio quodque horridulo ac spinoso, radice una, caule humili. Germen & flos æstate roseus odoratusq̃, folium ad uergilias usq̃ uiget, fabulosissimis macrisq̃ gaudet. Quatuor ei genera, Arabicum quod & pestilens est, ut Plinius & Galenus ait: Africanum, Marmaricum, Apulum, omnia quondam infesta, nunc mitia undecunq̃ illata. Quidam eum phyllostaphylon opheostaphylon uocant. Innocentius Italicum m cibo. Capparis nisi area defossa, hoc est circuli scrobe coercetur, & ripis undiq̃ circumstrictis lapide, late ferpit, euagaturq̃ per agros, & cogit solum sterilesce.

LEPIDIVM.

CCCCIX.

Lepidiū Aegineta Paulus Hiberida siue Hiberida tam uocari ceptū scribit, à Galeni (ut arbitror) temporibus. Lepidiū ab eo q̃ lepidas & maculas in facie dēſciāt ac repurget, quas Columella fucas uocauit, appellatum Græci putant. Idem autor Columella duo genera lepidij esse intelligit, syluestris & satiuū: ut syluestre quidam accipiant pro Hiberide, satiuum pro lepidio. Peregrinum, inquit Plinius, fuit & lepidium: seritur à fauonio. Dein cum frutificauerit, iuxta terram præceditur, tunc runcatur stercoreaturq̃. Per biennium hæc, postea rursus fructificans uruntur, si non fauciā hyemis impediāt: quando impatientissimum est algoris. Exit & in cā.

in cubitalem altitudinem folijs, nō ut Iberis nascitur, sed laurinis utiq; per initia, utrum mollibus. Post gladioli retulisse speciem accipiunt, ususq; eius propter acrimoniam non sine lacte. Herbarij modo hāc non lepidium, sed raphanum appellāt, in Pannonia frequentem, ubi ferunt eam non aliter q̃ radicis scobe. Paulus lepidium, inquit, quod apud nos habetur, folio lauri, sed maiore multo nascitur, quodei tamen ætate nullum est.

B A T R A C H I O N. CCCCX.

Batrachion siue ranunculus, siue strumea, quoniam medetur strumis: nam strumus solani genus est. Dicitur & apiastrum ranunculus, hoc est apium sylvestre, uenenum in Sardinia, manifeste Nigidij doctissimi uiri errato, qui apiastrum pro melissophyllo appellat: q̃q̃ hunc & Varro sequitur & Dioscorides. Opacis gaudet. Primū genus cui & color liuidus ad latitudinem malæ accedentibus folijs. Secundo generi, caules ut Plinius inquit alti, ut Dioscorides minores q̃ priori, nisi librariorum culpa fuerit *μικροκινιδίων* pro *μακροκινιδίων* scribentium. Genus ab his diuersum in totum uidetur, batrachio, cognomine polyanthemus, caustica uexulcerans cicatrices, & ad colorem eas reducens, & uiliginis concorporans: ne qualiter indicatur à Plinio quale sit: nisi quis & hoc in uam quatuor specierum contribuat ac reponat, illam uidelicet, quam plurimis foliorum diuisuris & Plinius & Dioscorides deliniant, uulgo dictam pes coruinus, alteram omnino q̃ coronopus, de qua superius habita mētio est. De uenato Sa-lustius. In Sardinia, inquit, quædam herba nascitur, quæ Sardoia dicitur, apiastrum similis. Hæc ora hominū & rictus dolore cōtrahit, & quasi ridentes inferimit. In ea insula, ut Paulaniz ac Solino placet, locis riguis prouenit iusto largior: nec tamē aquas inficit. Strabo ex hac ipsa herba Hispanos toxica genus conficere, quod urgente uis maiore haustum, citra dolorē humanis rebus exigit, à qua *σαρδίων* & uulgo *ελαιος*, quod & Dioscorides in uenenis meminit. Homerus Sardanion Rismum uocauit illo uersu.

μείλιον δὲ θυμὸν Σαρδίωνος μάλα σῖον.
Meminit & Plato in Repub. Timæus aliam originē proverbio huic reddidit, aliam Clitarchus, aliam Sophocles & Simonides poëtæ: nos id in annotationēs Plinianas distulimus.

A N E M O N E. CCCCXI.

Anemonem quidam fremium uocari putant, sed scribendum est phenion, autore Plinio. Edit florem suum haud multo post germē. Erumpit a uertumno post aphacē à primis imbribus. Inter aculeatas, sed micioris generis anemonem collocat. Quatuor sunt nominis huius fastigia: duo coronis dicata, hoc est syluestris bulbi florem uocatū anemonem, & aliam anemonem, quæ Timonia siue Limonia potius cognominatur, post heliocryson florentem, & cum uiola nigra uere. Duo medicinis, syluestrem & satiuam, de quibus præsens mētio copiosissima omnium est, phœniceum florem habens inter satiuas. Satiuus omnibus folia apio similia, nec ferē semipedalem excedunt altitudinē, cacumine asparagi. Flos nunq̃ se aperit, nisi uetō spirante, ob id anemone dicta. De orthonna Syria herba, quam quidā anemonem existimare, dicemus in loco. Nicæder anemonem, anemonida solet appellare, eamq; ex Adonis cruore natam prodiit, Sosibius anemonas à

Spartanis phenidas uocari tradidit. Horus anemone flores inquit, in Aegypto pingi, quoties morbos hominum intelligi uolunt.

A R G E M O N E. CCCCXII.

Argemonem & argemida puto dictam à Dioscoride, ubi de anemone loquitur. Folia habet anemonis æqualia, & apij modo secta: nascitur in aruis apud nos, ut Plinio placet, genera eius tria faciunt, ut id demum probetur, quod radice chusædoleat. Diuerfum uidetur gen^{us} esse quod apud Plinium argemon uocatur. Argemones radicem Eupatorium à recentioribus appellari quādoq; uideo, autoritate (ut arbitror) Dioscoridis in anemone hoc inuenta, ut aliud tamen intelligatur genus esse, quod Eupatorium proprie uocari solet.

A R G E M O N E A L T E R A. CCCCXIII.

Argemonem serpentibus & uenenis aduersaria nouimus, & ob id fortasse nomen habet, cum sit arges Hippocrati nomen anguis, ut Galeno placet.

A N A G A L L I S. CCCCXIII.

Anagallides frutice tenero, nō altiores palmo nascitur in hortis & aq̃osis. Prior floret cœrulea. Murum q̃ seminam pecora uitāt: aut si decepta similitudine (flore enim tantum distant) degustauere, statim eam quoq; (asyla, siue ut alij codices scribere, asyla uocatur, à nostris ferus ocul^{us}) in remedio quaerunt. Præcipitur effossuris ante solis ortum, priusq̃ quicq̃ aliud loquātur, ter salutare eā, tum sublata exprimere, ita præcipuas esse uires. Anagallin Dioscorides *σκληρὴν* quoq; dici perhibet. sit exemplaria in quibus gauritis non fauritis legatur. Hippocrates anagallin dicendo utilem mordēdis & asficandis ulceribus, anagallidem uidetur intellexisse. Aëtius nycterida herbam ad oculorum albugines cum probat, pro anagallide, ut puto accipiendā reliquit, quādoquidem & nycteritis à Dioscoride uocatur. Errant qui passerinam uulgo dictam florem candidum ferentem, anagallida existimant: quem admodum & qui myosotin, id est, muris auriculam pro anagallide compictam præferunt. Anagallidem phœniceam à colore Paulus Aegineta corallii quoq; dici meminit: de quo & compositioni datum nomē, quod *λιονορράλιν*: q̃q̃ & pastillum est hoc cognomine, sed in eum lapis corallius, non hæc herba fimmur.

H E D E R A. CCCCXV.

Hederam frutes quidem uendicant, sed arborum magnitudinem crescendo æquat. Folia primo angulosa, processu rotūdatur. Multa ei genera. Humi reptet chamæcissos, de qua in loco. Celsarum tria capita, candidum, nigrum, & helix, id est, clauicula siue pampinus uocata. Candidum aliud fructu solo, aliud fructu & folio, id quod fructu solo cander, aut crassiusculum, densum globatūq; habet eū, & corymbosus uocatur: Athenis uero a charnicon iriguum aut minorem acinum sparsioremq; racemum & silenition appellant. Simili modo in nigra, cui & suæ quædam differentiæ sunt, sed minus perspicuæ: alicui enim semen nigrum. Alij croaceum, cuius coronis poëtæ utantur: tollijs minus nigris, quam & Nyssiam, & Bacchicam, & Dionysiam uocabant, maximis inter nigras corymbis: cuius duo genera fecerunt, à colore acinorum, erythranon, & chrylocarpon. Helix ab hedera distat apertissimo discrimine: Primū folia huius angulata, concinna, exigua,

qua hederæ simplicia & totū diora q̃. Distat & lōgitudi-
ne internodiorū, præcipue tamen sterilitate, quoniā
fructum non gignit. Quidam hoc ætatis uitium in-
telligunt: primo q̃ esse helicum, & hederam senectute
fieri: quod quidē falsum esse Theophrastus & Plinius
contendūt, cum quia folium & germen heliciis
ab hederæ qualibet ænoasæ folio plurimum differat:
tum quia plures eius differentiæ noscantur. Herba-
cea seu uirens quæ nūmersissima est: Altera folio al-
to: raria uersicolore, quæ Thracia uocatur. Herbae
duplex genus: In uno renuoria folia digesta q̃ per or-
dinē, longiora densiora q̃: in altero diuersa omnia
in minus. In uersicolori quoq̃ alia folio crebriore, te-
nuiore, ordinato: in altera incondito, nunc maiore,
nunc minore, maculosoq̃. In cādidō genere alia plus
alia minus sunt candida. Crescit in longitudinem po-
tissimū herbaea. Nunc reuertor ad hederā. Hederā
ubi semenescere occipit, germen sublime rectūq̃
agitur. Ra dīce numerosa, contorta, densa, crassa, ligno-
sa: nec admodum profunda, præferrim nigra: & can-
didarum quæcūq̃ asperissima immixtissima q̃ est. Hec
& arbores amplexu & suctu stranguit, tanra crassi-
tudinē, ut ipsa per se arbor fiat. Signa eius folia ma-
xima & lanissima, mammas, hoc est germina subri-
gentis, quæ sunt cæteris inflexæ. Racemi stantes atq̃
recti. Radicosa & robusta. Huic maxime uni bra-
chia: Post ipsam nigræ, sed proprium albæ, q̃ in inter-
media folia emittit brachia, quibus arbores comple-
ctitur, & parietibus obrepit. Pluribus hæc locis suc-
cisa durat: arguiuit, & toridem iniuria radicis habet
quot brachia: ob id flexipedæ cognomēto apud poë-
tas. In nigra & alba alijs dulcedo acini, alijs tanta
amaritudo, ut aues non attingant. Est & rigens hede-
ra, quæ sine adminiculo stat sola omnium generū,
ob id uocata *neris* à Theophrasto & Plinio, quasi co-
lumellam in eo uocabulo significet: Sed summa di-
uisio sistem autoribus in marem & fœminam: q̃ al-
tera folium durius, pinguius, maius habear, & florē
ad purpuram accedentem, altera non habeat: utriq̃
tamen flos syluestri rose similis, sed minor & inodo-
rus: Quæ descriptio uidetur recentioribus quibusdā
non hederæ sed cisto conueniens, cui & sexus & flos
punicis tribuitur. Sed Theophrastum sequutus est Plinius
libro stirpium sexto, hæc ipsa non de cisto sed
de hederā prōdentem. Hederā Theophrasti ætate in
Asia nasci non poterat: nec in India nisi monte Mero,
unde ortus est zachus. Frustra & Herpalum labo-
rasse omnimodo tradunt, ut fereret eam in Medis. In
mica arbor satis omnibus, sepulchra q̃ ac muros rū-
pens. Serpentinū frigori gratissima. Vlos in funes, &
armamēta nauis hederā ueteres, autore est Athenæ-
us, quam & Rhodano petebant, ut canabim. Cato-
nis experimentum uolenti scire aqua in uinum addi-
ta sit nec ne, ut uasculum & materia huius faciat, uinū
quod erit dilutum transfluat, aqua manebit: nec em
continet uinum, inquit, uas hederaceum: quod pocu-
li genus Græci cissybion ab hederā uidelicet appel-
lant. q̃q̃ pro quocūq̃ ligneo id accipietur: In quo si-
gnificari & cymbium & cyPELLUM quandoq̃ sit.
Alij uerustos calices cissybia intelligunt, propterea
q̃ in Didymæi Iouis de dicatione folijs hederaceis li-
bare moris fuissen Cymbia uero quæ anfis careant
oblonga & angusta nauigij speciem præbentia. De
hederā Cilicia, quæ tamen hederā non est, in simlacc
Jax: quarto uolumine monstrabitur, Cisson, hoc

est hederam, pusionem Liberi patris fuisse Græcia cō-
finxit, in nominis sui fruticem conuersum, dū mini-
ster cum eo deo saliens, terræ allusum perfr. Athenien-
ses citron ipsūm Bacchū uocant & apud se Acharnis
uico natam hederā primo uolunt, ut inquit Paulani-
as. Syluestrem hederā cerui phalangio percussū in-
dunt & liberantur. Aelianus autor.

CHELIDONIUM MAIUS. CCCCXVI.

Chelidonium, siue chelidonia, siue chelidonea, 316
hoc est harundinaria maior, fruticoso caule,
folio paltinacæ erraticæ ampliore, ipsa altitudi-
ne duā cubitorum, flore luteo. Collyria quoq̃, qui-
bus ex hac utuntur, chelidonia appellantur.

CHELIDONIUM MINVS. CCCCXVII.

Chelidonia minor folia hederæ habet, min⁹ cādi-
da. 316

OTHONNA. CCCCXVIII.

Othonna herba nascit in Syria Plinio Scēdo.
Paulus othonnā uocādō in cōpositionib⁹ ple-
risc⁹ maius chelidonium inrepretatus est: sed
aliud tamen genus est othonna, quod hic describitur.

MYOSOTIS. CCCCXIX.

Mysotis alfine cognominata quasi nemora-
lis, nascitur & in hortis & maxime in parie-
tibus. Incipit à media hyeme. Arescit æsta-
re media, cum prorepit auribus musculorū expre-
ssis. De hac sub uocabulo alfine repetitū omnia hæc
libro quarto: propterea nihil ibi diximus. Dicuntur
myosotides, & myosotæ à Galeno.

MYOSOTIS ALTERA. CCCCXX.

Mysotis hæc quæ posterior describitur, iusti-
mus myosotis tanrum dici solet q̃ proxima, 320
quæ alfine potius, q̃ myosotis appellata sit
ueteribus.

ISATIS. CCCCXXI.

Isatis lactu cis syluestribus annuerant. Duo ei
genera Plinio reddūt: Item q̃ Dioscoridi nascēs
in syluis: alterum insectoribus dicatū, quod & sa-
tium Dioscoridi Galenoq̃ uidetur. Plinius syluari-
cum uocari tradit, simile la patho syluestri folijs, nisi
plura essent & nigriora, quā uulgo modo quædā,
ueteres gladium, siue gladii lingua Gallica dicebāt.
Eo Brianni mares & fœminæ oblinebāt se. Mares ut
cœruleo colore metū hostibus afferrent: Fœminæ ut
in quibusdā sacris incederent nudæ, colorē Aethiopū
imitantes. Isatin Dioscorides egnen quoq̃ uocari
prodit: credo hanc ab Hippocrate incen, siue Ignem
dici. Dioscorides isatin latine dici rutam, Apuleius
alutam scripsit. Fallum utriq̃ suspicor, & lutam si-
ue luteā uocari credo. De lutea herba Plinius & Vitru-
uius inter colores tantum loquūtur. Plinius: Chryso-
colla inquit illa quoq̃ herba ringitur, quā luteam ap-
pellant. Idem paulo post: Luteam chryfocollam ab
herba lutea dictam putant, quā ipsam cœruleo sub-
litam pro chryfocolla inducunt. Vitruuius: Qui non
possunt, inquit, chryfocolla propter raritatem uti her-
ba, quæ luteā appellatur, cœruleū insciūt & utitur
uiridissimo colore: hæc autem, inquit, insectiua appellat.

ISATIS ALTERA. CCCCXXII.

De hac isati dictū est in satia proxima. Qui &
radiculā quæ sit struchion, isatin uocari pu-
tent, ducitur mendoso loco, quē nos in Plin-
io correximus xviij. naturalis historix libro.

ARABIS. CCCCXXIII.

Arabis hæc est, de qua super⁹ quoq̃ dictū est:
q̃q̃ ibi drabam, non Arabida legi deprauate 320
cōmonium, TELEPHON. CCCCXXIII

h Telephid

³²¹ **T**elephion uagum & cōmune plusculis herbis nomen. Dioscorides senos septenosq; ab radice ramos ei tribuit, Plinius etiam octonos. Differte hanc merito existimant ab alia quam diximus hoc libro Telephion, & andrachnē agriam uocari, quandoquidē tam Dioscorides q̄ Plinius medicinas

earū atq; notas seorsum utriusq; reddūt, cū duorum generū. Telephion hic descriptā, sunt qui eam putēt esse, quā Romanæ officinæ pulmonariā uocāt. Vegetius in mulomedicina pulmonariā siue pulmonatiā appellat, quā & consiliginem dici tradit, bubulcis & mulomedicis, hoc est, ueterinarijs, præclare cognitā.

SECUNDI COROLLARII LIBRI FINIS.

HERMOLAI BAR-

BARI PATRITII VENETI, ET AQVILEIENSIS PATRIAR-

chæ, in Secundum Corollarij librum, PRÆFATIO.



COMPLESSE MIRACVLVM SVI NATVRA VIDERI POTERAT, cum tot odores, tot succi, tot arborum fructus: hinc animalia, rursus & Cereis dona, atq; horum tenetia recensita sint: quæ omnia parens illa optima, ne nulla nō parte sui prodesset, non ad usum tantum mortaliū atis, uerum etiam ad uoluptatem edidit. Hæc igitur naturæ peculiaris laus, hæc præcipua dos fuerit, & tot ad usum nostrum genuisse, & cotidie gignere, quæ occultas in se singula uires habeant. Nec contenta una alteraue terrarum parte munificentiam suam ac opes ostentasse: totum orbem beneficentissima complexa est: nullo certe maiore eius miraculo, si fateri (quod ille inquit) uerum uolumus, illa igitur à Meoticis usq; paludibus herbam Scythicam illa ab Atlanti extra amniculq; uias Euphorbiam petere nos docuit: ne deficiente terra, remedia etiam homini decissent. Quid quod & ipsas oceanæ extremas ad septentrionem insulas, & exustam Aethiopie plagam aperuit, ut inde Britannicam, hinc Aethiopidem ad nos afferret? Iam ne his tantum profuisse uideretur, quæ aut satui occurrant, aut cibo placeant, montium culmina, & solitudines alijs inaccessas, ipsius insuper sacre parentis fibras ac uiscera scrutari nos uoluit, ut radices etiā eius penetrabilibus abditi ac semina ad remedia nobis salutaria uerteret: eosq; benignitate progressa, ut sylvarū lucorūq; horrida facies medicinis non careat, ipsaq; solitudo opem non minimam præbeat. Quod cum ita sit, peractis his quæ superiore sui parte telus ferat, passimq; alat, eius ad hæc secreta rimabimur, & radices rerumq; semina, iūta non minus profuturā q̄ superi in a uie dicta, iam nunc homini monstrabimus.

HERMOLAI BARBARI PA-

TRITII VENETI ET AQVILEIENSIS

PATRIARCHÆ, COROLLARI

LIBER TERTIVS.

AGARICVM.

CCCCXXV.



³²² **A**GARICVM IN ARBORIBUS nascitur, fungus similitudine circa Bosphorum, colore candido. Masculus amarior. Calliarum quoq; glandi feræ maximæ arbores agaricum ferunt. Est aut (ut dixi) fungus odoratus, in summis arborib⁹ nascens, noctibus relucens, & candidus: Ideoq; in tenebris decerpitur. Dioscorides agaricū ueneni uim habere, sed id, quod nigrum est, affirmat: & regione Sarmatarum quæ ἄρπικ hoc est syluestris dicitur, nasci. Quidā codices non agriam, sed agariam habent: Vtq; tueri possumus, primū ex Plinio: Regio, inquit, Sarmatæ syluestris Hyleum mare quo alluitur, cognominauit: Alterū ex Ptolomæo, qui Agarum & urbem & annem in Sarmatia uocari tradit. Appianus Alexandrinus Agaros Scythicam gentem contra serpentium morsus adhiberi solitam refert, propter qd Mithridates eos apud se habuerit.

RHA PONTICVM, CCCCCXXVI.

³²⁴ **R**ha Ponticum, radicē Ponticā à Cornelio uocari cenſeo, à Galeno & Paulo theon, à Plinio rhacoma, nisi deprauatus (quod fere suspicor) locus sit, uulgo rheu, Aëtius rhaon. Plinius costo nigro similem demonstrat, in cætera cum Dioscoride conueniens. Habetur & rha barbarū multo præstantius efficaciusq; Pontico, sed ante Paulū Aeginetam ferè medicis in cognitū. Eius mentionem autor is in compositione quadam ad podagras habuit.

GENTIANA, CCCCCXXVII.

³²⁵ **G**entianam ubiq; nasci, sed copiosissimā sub alpinis montibus, in Illyrio præstantissimā affirmant, folio fraxini, magnitudine lactuæ, caule tenero, trium aliquod cubitorū, radice lenta, subnigra, sine odore, aquosa.

ARISTOLOCHIA, CCCCCXXVIII.

³²⁶ **A**ristolochiæ color ater, foliū alfinæ, ut Theophrastus inquit, rotundius. Nascitur in montibus præcipua. Genus quadruplex in ea Latini seruant: unum rotundā, quam & pheuxicteron uocabant aliqui, folijs inter maluā & hederam nigrioribus

oribus pingulioribus, quæ confusa cum calce, in mari spatia, pisces a duolant cupiditate miræ, ut ait Plinius, uide id testatur, continuoq; examinati fluitat: ob id piscatores, inquit Campani, uocabant hanc uenenum tetra: Nunc & cyclamini radicē id contigit in eadem terra, ut putant. Alterum masculæ atq; longæ: tertium radicē longissimā, quasi uitium nouellarum, efficacissima, quæ & Cretica nominatur, flore purpureo, colore buxo, bacculis ferēs, ut caparis: quæ tamen tria in omnibus quoq; inueniuntur generibus. Est & quarta pistolochiæ nomine, tenuior q̃ tertia, densis radicis capillamentis, iunci plenioris crassitudine. Hanc quidam polyrrhizon cognominant, & satyrion esse dicunt, ut in ea mentione docui. Odor omnium medicatus, sed clematidis, hoc est tertiæ iocundior: nardinis quoq; unguentis conueniens. Effodere eas messibus tempestiuum est. Maxime tamen laudatur Ponticā, & in quocunq; genere ponderosissima quæq; medicis aptissima. Nascentē ferē pinguib⁹ locis & plano, ut quidā scripsere.

ARISTOLOCHIA ALTERA. CCCCXXIX.
E hac qualis esset proxime indicatū nobis est.

ARISTOLOCHIA ALTERA CCCCXXX.
E hac quoque in primo aristolochiæ genere differui.

GLYCRRHIZA. CCCCXXXI.

Lycyrrhiza, siue ut Palladius glycyridia. Sūt qui hanc & eryngem eandē esse falsō putēt, qm̃ spinosa & foliata uideretur. Fruticosa est, præstātissima in Cilicia, deinde Ponto. Adipson uocatur, quia situm famēq; sedet. Carpitur Vergiliarum occali, quæ longa est ceu uitis, colore buxo, Melior nigra, quæ lenta q̃ quæ fragilis.

CENTAURIUM MAIUS. CCCCXXXII.

Centaurium maius caules habet geniculatos, folia lata & oblonga, & ab radice densa, radix tenera fragilib⁹. Durat annis nec ultra duodecim. Cōmendatissima in ijs quarū Dioscorides meminit regionibus præterq; in alpinis. Dicitur & cētaurea & Chironia, quia curatus ea Chiron sit, cū Herculis perta ciant arma sagitta excidisset in pedem. Nostri herbarij aliud centauriū maioris cognomine demonstrant, flore luteo, folijs per interualla binis, a uersa parte candicantibus interna uirentibus, salice maiori⁹ & connexis ferē.

CENTAURIUM MINVS. CCCCXXXIII.

Centaurium minus a foliorū tenuitate a m̃⁹ cognominatū, sicut libadion, quoniā secundum fontes nascitur. Ipsa herba legitur autumnno. Succus ē fronde aut caulibus concisus madefactisq; xviij. diebus capitur. Hoc centaurium nostri sel terræ uocant, propter amaritudinē summā. Galli exacon, quoniā omnia mala medicamēta potum exigit per alium. Est & centaureis appellata cognomine triorches. Hanc qui erunt, iubentur accipitrem cauere, dictū a numero testium triorchem, quoniā ut Theophrastus inquit, raro nō uulnerāt ab alite, qui colligunt. Tradunt & per se infestam esse carpentibus: raro unq; non ferientibus dum fecant. Hæc succū sanguineū mittit. Imperiti miscant hæc notas, & unī generi assignant: nam quod centauria panaces uocatur, alterius est naturæ, ut in panace mōstrabim⁹. Huius radix minoris penitus inutilis medicinæ est, ut Galenus quoq; scitibit.

CHAMAELEON ALBUS. CCCCXXXIII.

Chamæleonte album à Theophrasto ixinem uocari Theodorus existimauit, quia carduum pineam interpretari uoluit, quæ nihil aliud ē, ut Dioscoridi placet, q̃ albus chamæleon. Plinius in Theophrasto nō ixinem, sed helxinē uidē legisse. Ferē suspicor utrunq; falli Theodorū & Pliniū: Theodorū, quia chamæleontē album ixiam dēq; dici nouerat: sed aliud est ixine, aliud ixia Theophrasto, noni uoluminis initio, ubi non omnibus locis, sed in Creta lachrymam ab ixia, hoc est (ut arbitror) chamæleonte albo fundi scribit. Plinium quoq; decipi ex istimo affinitate uocis, helxinem pro ixine capientē, libarj⁹ alterum pro altero scribentibus: qui modo parum diligentes, modo nimis scioli, peruerunt omnia. Tres igitur herbæ sūt, helxine, ixine, ixia. Ixia chamæleon albus est Hippocrati & Galeno. De helxine suo loco agetur, ubi de ixina quoq; differendū nobis erit. Chamæleonte album ixion quoq; dici uideo, quia uiscum gignit album, non ubiq; sub aliis foliorum, maxime circa canis ortum, cum thurā nasci dicuntur. Succus radicis decoctæ mures contrahit & necat, nisi protinus aquam sorbeant. Volentibus scire uiscus sit æger nec ne, præcipiunt radicis diluto perfundi triduo qui langueat: morituum negantes qui tertias uices perferat. Theophrastus auctor. Nascitur æque omnibus locis, capite magno & acano herbæ simili, unde quidam inquit eam uocauerat acanon: quod quidē & ixine appellata cōtinet.

CHAMAELEON NIGER. CCCCXXXV.

Chamæleon niger spinosus generis, utrum folijs aculeatis non constat. Gelidis & inertibus locis provenit. Ex nigris aliqui marem dicere, cui flos esset purpureus: foeminam cui uiolaceus. Vno nascuntur caule, cubitali. Vlophyton uocatur, quoniam angina modo iuuencas necet, & ab odoris grauitate cynozolon. Ferunt & nigri uiscum, sed quod pro mastice non sit, ut ex albo.

CROCODILION. CCCCXXXVI.

Crocodilion radicē lōga, æqualiter crassā, odoris asperi. Aëtius hanc fortasse intelligit, cū radicem crocodiliadis eius, quæ maxima est, cōmendat in eo capitū dolore, qui cephalæa dicitur.

DIPSACOS. CCCCXXXVII.

Dipsacos folio cauo, in quo falsus ros: nascitur in aquosis & flumine: Huius herbæ carduus est, quo rudes panni, uelut is echino quodā, ut inquit Plinius, uestes expoliuntur & colluuntur, floccis siue fimbrijs quæ Græci crocydas appellant detractis, complanatis/ue. Hic frutex labrum Veneris aut Venerum Latine dicitur.

ACANTHA LEUCE. CCCCXXXVIII.

Acantha leuce, hoc est spina candida, ut superioris quoq; diximus, aliud genus est, q̃ leuca cantha, siue leucacanthos, etiam si & hanc nonnulli Galeno teste, leucacanthon uocare consueuerūt. Habetur sed intet a rbotēs uel promiscua, quæ spinus albus uulgo dicitur, cortice ligni cādido, molli folio, aculeata tora, pruni magnitudine. Quo nomine ueterib⁹ cognita hæc sit, haud possum reddere.

ACANTHA ARABICA. CCCCXXXIX.

Acantha, hoc est spinam Arabicam nonnulli hanc esse putant, quam Plinius lamam uocauit etiam in India nascentem, à qua gummi adulterio myrrhæ provenit, ut in myrrhæ & mastiche notauimus. Eandem hanc cum Aegyptia spina acaci

na acaciam fundente nonnulli faciunt: quoniam Galenus & Paulus hanc & Aegyptiam & Arabicam appellant.

SCOLYMOS CCCCXL.

337

Scolymos à Theodoro carduus, diu floret ac seorsum arefcens definit pungere. Caput ei Theophrastus contra quid Dioscorides, spinosum negauit, sed oblongum haberi dixit: quod in hoc non tantum spectetur inter ea, quæ lanugines folio spinosus obtinet. Nascitur similis scolymo carduus circa Tegeam, radice dulci, quam cum Pandius statuarum magister effraussit, alienatus mente fertur. Haec Theophrastus de scolymo sententia: nunc quæ cæteri scribere uideamus. Scolymon Oriens & limoniam uocauit. Frutex est nunc cubitali altior utiq; in montibus, & diu syluestris, & nondum altitudo: alioqui in Mauriaticis caulibus quatuordecim cubitos altus, palmos quaternos crassus esse dicitur, thyrsisq; foliorum ac radice dulci: laudata quondam in pauperis cæna. Florente scolymo cicadas accerimi cantus esse, mulieres libidinis audissimas, uiros contra in coitum pigerrimos, scripserunt Hesiodus & Alcæus postea. Distet ab hac quæ à Plinio item lemonia uocatur contra serpentes herba lacteo succo manans, concretescentem gummi modo in humidis locis, affirmare non a sumus. Est & lemonion pro syluestri beta ueteribus acceptum, graui lapsu Theodori, limoniam quæ scolymus est, pro syluestri beta in Theophrasto capietis, & aculeato folio eam prodentis. Habetur & anemone genus unum cognomine limonia, ut dictum est suo loco. Sunt qui & cynoglossion herbam limonion appellarent: sane scolymos carduus intelligitur syluester. Syluestrium autem carduorum genera duo: alterum fruticosius à terra statim, alterum uniuersale & crassius: Vtriq; folia pauca spinosa, muricatis cauminibus, lanuginoso caule: sed alter florem purpureum mittit, inter medios aculeos celeriter canescens, & abentem cum aura, qui proprie scolymos dicatur. Radicis horum ex aqua decoctæ natura sitim potioribus uini facere. Hinc illud Columellæ de cinarum: Quæ dulcis laccho

Potanti ueniat, nec Phœbograta canenti.

Quid autem sit in Columellæ uerbo: mirtiolum in cinara crinem spectari aliquando, nihil habeo quod afferre possim: nisi quis non mirtiolum, sed mirteoli, uel muriceum certe legat. Sunt enim muricata scolymo cacumina, ut inquit Plinius. Murtioli mætionem in Columella & alio loco uideas, ubi hæc uerba sunt ultimo uolumine: Habeto, inquit, uiridis sceniculi femina & lentifici destricta & purgata murtiola. Fate or nescire quid sit mirtiolum. Scio Murcium montem Romæ dictum, qui sit & Auentinus, autore Festo, ut obiter corrigamus locum in Plinio iuniore, Auentini & Martium montem ab Anco Martio urbi adiectos prodente: non enim Martium, sed Murcium legere oportet. Scio & intimum circum Romæ à murcis cognomen habuisse, quasi ab urceis, quibus ibi fingerentur, ut Porcilio placet: siue à propinquo Veneris Murtæ

facello, quam postea Murteam & Murtiam uocare ceperint, in Auentino colle, ut Varroni. Hinc & myrtum arborem uulgo, & murtum, & murtellam uocamus hodieq;. Plinius certe duobus locis scolyumum & medicinas eius ceu durarum rerum descripsit. Cinaram porro carduum intelligunt satium: ita enim Lucius Columella uocat. Palladius carduum à cinere, ut quidam autumant, quo lætatur, uocatam. Sunt qui puellæ nomen in eam herbam uersæ intelligant. Paulus & Aëcius scolymon à cinara discernunt: priorem stomacho prodesse, cinaram officere monstrantes. Proxima certe genera uidentur esse. Fuit hæc ueteribus maximè res quæstus, ex Carthagine magna & Corduba præcipue, festertia sena milia carduetis etiamnum paruis inferentibus ærario. Tantus est earum rerum proventus, quæ Veneri obsonantur & ganæ, ut nihil iuuere poterit quædam naturæ uideri carduus, & quæ refugiant quadrupes, quo minus in luxum eos humana gula uerteret. Adhibentur cinaræ conuiuijs asparagi modo coctæ iuribus: nec sine his magnifica, aut adificialis ulla est cæna, utiq; si neq; locus neque tempus obstat. Liguress arcocum uocant quasi alcoccalon, ut prima eius uerbi syllaba pro articulo fit, quem Mauritanii omnibus ferè uocibus præponunt, ut in hyoscyma ex Plinij quoq; usu ostendimus. Coccalus uero Græce idem est quod strobilus, hoc est nux pinea, cui similis est scolymus, Dioscorides, Romani scolyumum uocant, inquit, strobulum. Nondum irrepsit hoc ferculum Venetijs: una tantum eius planta Mauriano uico cernitur in hortis barbaricis.

POTERION CCCCXLI.

Poterion circumsoditur autumno præciditurq; ad succum. Radices habet multas, bene olentes, sed duas aut tres, cibitorum binum. Galenus hanc neuradis appellatione intelligit. In Plinio non poterion fed pontirion, nec phrynon, ut in Dioscoride, sed parcenion xxvij. libro legi uideo, corrupte utrunque. At xxv. non parcenion, sed phrynon: nec pontirion, fed polytrihizon mædofe item scribitur. Phrynon porro à rubetisanis dicta est, quibus aduersatur: eas Græci phrynos uocant.

ACANTHION CCCCXLII.

Acanthion spinulam significat: est enim sping alba proxima, sed minoribus multo folijs.

ACANTHA CCCCXLIII.

Acantha siue acanthos, topiaria & urbana est herba, elato longoq; folio, crepidines marginum asurgentiumq; puluino toros in hortis, historiali facilitate uertens. Duo genera eius sunt, syluestre aculeatum, crispum, quod & breuius est, agriacanthos appellatum: alterum læne ac satium quod proprie pæderota uocant, alijs melam phylon, de qua hic agitur. Vnguenti quoque genus est quod pæderota nominabant, quo & Demetrius Phalereus sibi os linebat. Alexis poeta sceminas, quibus nimis candida cutis esset, pæderote uti solitas, in comœdia significat: quod & Aegyptium unguentum dicitur, ut in stactis diximus. Pausanias autor est, genus herbæ Sicyonis in uno tantum Veneris septe nasci, pæderota nomine, folio minore q; sagittariote q; ilicis, & omnino quænis simili, altera parte candido, altera subatro, ut alba populi: hanc ibi tantum spectari, præterea nusquam gentium. Sic autem acanthus hæc uulgaris spina, cuius & ut aspalatho meminit

nimus,

himus, nec ne dubito. Plinius certe duobus locis, altero acanthon, altero spinam vulgarem appellando, eandem utrique medicinas tribuit. Spina est & appendix uocata, quoniam bacca in ea puniceo colore nomenitur appendices, siue ut veteres dicebant, ampendices. Ii & lumam pratenfis spinæ genus appellabant, & ab eo lumecta & lumarias falces, aut Varro dictam ita, q̃ à terra solunt, id est, lunt eas agricola. Acanthos Seruius inquit grammaticus, in Aegypto & Cyrenaica insula nascitur: sed homoliterator, herbarumq̃ parum gnarus, cum spina Aegyptia cōfundit, quæ ab acantho prorsus alia est, ut facile dignosci potest.

A G R I A C A N T H A. CCCCXLIII.

DE Agriacantha, hoc est sylvestri spina, proxime dictum est, ubi alterum spinæ genus sylvestre nominatum.

A N O N I S. CCCCXLV.

ANONIS & ononis quodq̃ dicitur, ut Galeno Theophrastoq̃, spinosa post uer, folio rutila, aculeata ramis, ut tribulus. Nascitur solo culto, præcipueq̃ in segetib⁹, aratro inimica, uiuaxq̃ unice. Propagat se in annos, ideoq̃ runcanda & extirpanda tota est, cum terra madebit imbibibus. Germinare incipit æstate, à frugibus perficitur autumno. Durat anno folium toto caule per intervallo collocatum ut corona. Flos mutilus in siliqua nec conseptus. Est & alia ononis cognomine flomitis, quæ à Dioscoride ononida dicitur: quamquam sunt qui onomida non ononida uocent, hoc uolumine à nobis reddendam. Ononim potro dictam Photion uult, q̃ asinos se ad illam terentes & scabentes iuuat. Plinius anonin similem sceno Græco, Dioscorides lotio scenariæ aut ruta faciunt, ut æstimare liceat lotum scenariam cum sceno Græco eandem uideri, aut per similem.

LEUCACANTHA. CCCCXLVI.

LEUCACANTHA siue leucacanthos, ab acantha leuce differt, ut sc̃a penumero communis: priorem Græce Plinius ferè appellat, posteriorem Latine spina candida, id est, acantha leuce.

T R A G A C A N T H A. CCCCXLVII.

TRAGACANTHA siue tragacanthos, radicem spinæ albæ continet, in Creta nasci tantum creditur: sed & in Achaia & apud Medos quoq̃ prouenit, in Arcadia largissime: nec Cretica deterior, aspectu tamen prelata. Lachrymam non incitura sed sponte manando spissefecere, Theophrastus existimat. Pretium Creticæ in libris tredecim apud quam uidelicet & dignatio remanet.

E R Y N G I O N. CCCCXLVIII.

ERYNGION clarin primis aculeatarum herba est. Genera eius duo, albicans & nigricans: priorem Græci hecatoccephalon, nostri centumcapita uocant: omnes caule & radice in cibos Græcorum receptæ, utroque modo, siue coquere libeat, siue cruda uesci. Radicem eius alterutius sexus similitudinem referre prædicant. Raram inueniunt: & si uiris contigerit mas: etiam amabiles fieri: ob hoc Phaothem Lesbium dilectum à Sappho. Ipsa dura, fruticosa, caule geniculato, cubitali, maiore aliquando & satia quidem est: sed & sponte nascitur in asperis & saxosis, & in litoribus maris, durior nigriorq̃ folio apij. Sub solstitio colligi eam iussere quidam. Sunt qui & acanon eryngion ascribant, sicut & gly-

cythizam falsò Asclepiades, ut meminit Aëtius. Eryngion cui⁹ hoc est montani cognomen est, folijs describit paruis & angustioribus, flore aureo & oculi figura. Ex eryngij radice Gallia cisalpine confectionem cum saccharo aut melle condit, eryngiatum uocatam.

A L O E.

CCCCXLVIII.

ALOE laudatissima ex India, post ex Syria Cœle, ut Galeno placet & Arabia. Improbatur & Syria quasi multo dilutior & languida. Serit eam Asia in turbinibus cadorum, ut sedum maius. Caulis eius tener rubet medijs. Inuenitur & per se la chryma adhærens, ob id pauimentandum ubi sata sit, præcipiunt: ne lachryma quæ manat, absorbeatur. In Iudæa super Hierosolyma fossilem gigni & metallicam, fuisse qui traderent omnium detergum, humidissimam, nigerrimam. Negat id huius operis præfatione Dioscorides. Familiarem tonstrinis aloën nemo ignorat, uirentem semper, propterea semperuium marinum appellacum uulgo. Aloidarium uero medicina dicitur ex aloë, ad uentrem soluendum, in Oribasio, Philagrio, Aëtio.

A B S I N T H I V M.

CCCC.

ABSINTHIUM frigidis prouenit. Latinarum ferè certant in Capitolio quadrigæ, uictorq̃ absinthium bibeat: sanitate interpretantibus in eo præmio maioribus. Poëtæ Græci sunt qui apinthium quandoque dixerint. Hippocrates absinthium Cyprum commendat.

ABSINTHYM SERIPHIVM. CCCC.

CCCC.

ABSINTHYM seriphion siue seriphon, angustius priore minusq̃ amarum. Absinthij genera plura: uulgare siue Ponticum, de quo diximus: seriphium, id est, marinum, de quo hic agitur. Ponticum à Ponto ueniens, ubi pecora pinguescit illo, & propterea sine selle reperiuntur, neque aliud præstantius, multumq̃e Italico amarius, sed medulla dulci. Tertium Santonicum à Gallicæ ciuitate appellatum, à Columella uero Santonica herba dicitur.

ABSINTHYM SANTONICVM. CCCC.

CCCC.

DE Santonico proxime dictum est. Illud notandum dignum arbitror, Santonicum absinthio similis describi, quàm seriphium, aut quod idem est, marinum: quoniam marinum abrotoni potius, quàm absinthij figura demonstratur ab Dioscoride ac Plinio, ut prædixi. Recentiores contrarium decernunt: & sanè uidentur haud falsa dicere: marinum, siue seriphium docentes, absinthio quàm abrotono simili⁹: Santonicum abrotono quàm absinthio. Marinum certe id quod passim in litoribus, & secus mare nascitur, sapore salso, & folio albicante, notum omnibus, nihil ferè commune cum abrotono. Galenus quoque: Seriphium, inquit, & conspectu & gustu absinthio simile est, præterquam q̃ minus linguam atstringit quàm absinthium, sed plus exalfacit, & cum quodam salis gustu, amarum sentitur.

A B R O T O N V M. CCCC.

CCCC.

ABROTONUM campestre, ac montanum: hoc sceminam intelligunt, illud marem. Amaritudo absinthij in utroque. Vacuum sponte prouenit, cacumine suo se propagans. Seritur quoque, sed melius semine quam surculo aut radice. Numerosum eius semen, Radix una quæ alte

h s descen

descendit, cæteris in summo terræ leuiter hærentib⁹. Floret cū fraxino. Siculum laudatissimum, dein Galaticum. Pamphilus abrotonum à Romanis Santonicum appellari credidit, à Galeno reprehensus. Græcum uulgus à contrariio meliciteum uocat abrotonū, sicut semenacrius, & ab interitu tinearum helminthobotanon. Dioscorides à quibusdam thelyphthoron, & thelythamnon & glycyn ancona dicit appellari. Saneq^{ue} uidentur ij ad historiam & uetus prouerbium respicere. Ea est huiusmodi: Lydi gens in libidinem effusissima, sceminas ingenuas constuprare in hortis, ad hoc flagitium quæ sitis amenitatibus exculcis, aliquādiu impune solita est; demū Omphale mulier, dominatione haud magno negotio effocminat & luxu diffuuentibus excussa, imperitare coepit ipsa, ubi eos cruciatibus uarijs affectos ulta est, in uxores eorum descendit: inclusas enim eas eisdem seipis prostituit seruitijs: inde uiridario nomen glycyn ancon quod & thelyphthori & thelythamni uocabulo significatur, ceu abrotono consitus fortasse locuseffectis.

HYSSOPVM.

CCCCLIII.

348 **H**ysopum, siue hyssopus. Præfertur Hippocrati Cilicium, sed è Tauro monte, dein Pamphilum & Smyrnæum.

STICHAS.

CCCCLV.

349 **S**tichas odorata herba, hyssopi aut thymi comæ. Confudere quiddā recentiorē stichaden cum stichæ: Item cum Santonico, abinthium.

ORIGANVM.

CCCCLVI.

350 **O**rganum nigrum & candidum. Priori nullū semen, candido per quam minutum: id autē cui odor est, Creticum uocatur. Negant in Arcadia erumpere, quod flatu à mari non accedit. A sacro non ante trigessimū diem emicat. Folia ei cadunt à cacuminibus. Acemulus thymbræ, hoc est cunilæ uocatæ, sapor. Nunq^{ue} utrunq^{ue} additur, quippe si milis effectus. Origanum ei tamen duntaxat Aegyptiū præfertur. De cunilæ tribus generibus in thymbræ disputabitur, sicut de cunilaginīs quatuor in conyza. Origanum tam pertinaci cum brassica dissentit odio, ut arefaciat fugatq^{ue} aduersum. Origanum multa sunt nomina. Heracleoticum quod à nostris cunilæ, siue quod magis probò, cunilæ gallinacæ uocatur, ab Heraclea Ponti dictum, uel Plauto teste in Trinumo: In Ponto, inquit, ubi abinthum fit & cunilæ gallinacæ. Sub qua tam Creticum quam Aegyptium intelligunt, de qua præsens mentio. Deinde est organum onitis, de quo proxime differendum est. Tertium Heracleoticum syluestre: Quartum tragorganum, cuius duæ species à Dioscoride redduntur, quæ à Plinio tribuæ sunt Heradio. Non est autem omnino idem Heracleoticum & Heracium. Prius inter cunilās accipitur à nostris: posterius pro tragorigano sumptum uidetur à Dioscoride. Origanum & organus dicitur productæ quæ ante ultimam est syllaba: de syluestri & tragorigano statim prodetur.

ORGANVM IONITIS.

CCCCLVII.

Organum onitis siue prasion. Quidam & ornithis quasi gallinacæum dixerit, sed genus illud Heracleoticum uocati cerno, quemadmodū proxime indicatum est.

ORIGANVM SYLVESTRE DE

MONSTATVM EST, CCCC LVIII.

In primo genere quod Heracleoticū uocatur, Galenus origanū syluestrem, panaces Heracion, & cunilam quoq^{ue} dici solum affirmat.

TRAGORIGANVM.

CCCCLIX.

De Tragorigano dictum est in origano Heracleotico.

PVLEGIVM.

CCCC LX.

Pvlegiū ipso brumali die germinat in carnarijs, refloresq^{ue}, ramulis etiam à parente abiunctis, ut scilla. Nascitur hoc etiam non satum: senel uero satum diutina ætate durat. Magna cum nepeta & menta pulegio societas: Formina in eo efficiat. Florem habet purpureum: mas candidum. Vtriusq^{ue} incensus pulices necat, unde nomē pulegio. Habetur & pulegium syluestre origano simile, folijs minoribus q^{ue} satium, & à quibusdam uocatur dictamnū, occasione hinc ortū dictamnū Creticam pulegium syluestre nominatū. Pulegium Græci glecona, & Actice blechona, sed & blechro quoq^{ue} uocant, ut inquit Dioscorides. Ego blechro Hippocrati pro legumine quodam accipio uideo apud Galenum. Pulegium, ut dixi, brumalis herba dici potest, quemadmodum & solstitialis aliquæ dicuntur. Plinius: Cōdurdon, inquit, solstitialis herba, flore rubro, suspensa in collo comprimit strumas. Plautus quoq^{ue} in Pseudulo: Quasi solstitialis, inquit, herba paulisper fui. Repente exortus sum, repentino occidi.

DICTAMNV S.

CCCC LXI.

Dictamnū non dictamnū ex Theophrasto & Vergilij quodam uersu lego. Ramis hoc prætenue, pulegio etiam gustu simile. Caulis nullus, radix gracilis & superuacua, & in Creta quoque non spatiose nascitur: nec nisi in asperis quæ uera dictamnū sit: minimo pondere, accendens os, quo argumento à falsa protinus discernitur. Qui legere eam, manipulos in ferula uel harundine condentes præligant, ne potentia euaneſcat. Mire à capris expetit. Dictamnū legitimam in Felicis orto Patarij uidisse credere, folijs inter punctis, quemadmodum & pingitur: nisi q^{ue} non alibi q^{ue} in Creta prouenire scribunt. Proinde pseudodictamnū potius eam fuisse q^{ue} dictamnū arbitror.

PSEVDODICTAMNV M.

CCCC LXII.

Pseudodictamnū folio simili, ramulis minoribus, à quibusdam chondris uocatum, in pinguis agris nascitur.

DICTAMNV ALIVD.

CCCC LXIII.

Dictamnū hoc neque facie, neque effectū simile uero est.

ELELISPHACOS

CCCC LXIII.

Elelispachos, ut Theophrastus inquit, differt à sphacelo, q^{ue} altera mitior est, altera syluestrior. Sphacelo folium breuius & leuius: elelispachos squalidius & scabrior. Sed alter fere Plinius: Syluestris, inquit, lens est elelispachos à Græcis dicta, faciu lente leuior, & folio minore atq^{ue} ficiore & odoratiore. Est & alterum genus eius syluestris odore graui, hæc mitior: nostri qui nunc, inquit, sunt herbarij, saluiam appellant, mentæ similem, canam, odoratā. Elelispachon sunt qui *ij sylv. Heradio*, hoc est, sacram herbam cognominent, ut Agrippa, salutarem ad multa, præsertim ad fecunditatem, ut inde salua fortasse à nostris dicta esse uideri possit. In Aegypti Copto multis pestilentia sublati, coactæ sunt mulieres huius herbæ succo ad conceptum uit.

MEN

MENTA. CCCCLXV.

Menta ætate uret, hyme flauescit, humido minus gaudet, semel fata pluribus annis restibili fertilitate durat. Mentæ nomē suauitatis odoris apud Græcos mutauit (hoc enim significat *ἡδύσμος*) cum aliqui *ῥιόν* uocaretur, unde ueteres nostri mentā appellauerunt, aut fortasse quoniam odore mentem excitat. Theodoros hedyosmon in Theophrasto mentastrū interpretatur, ut à mintha in eodē autore separet. De mentastro statim prodetur, Galenus porro minthæ quæ sit odorata, hedyosmon, id est, mentam uocari tradidit: mintham uero quæ sine odore sit, syluestrem esse mintham, & proprie calamintham appellari uoluit. Strabo in Achaia montē esse iuxta Pylum scribit Mintham nomine, à Plutonis pellice in hanc herbam cōuersa, Proserpinæ inuidia, quæ uocatur, inquit, à quibusdam Hedyosmos. Ouidius: Fœmineos hortos in olentes uertere mentas Persephonæ licuit.

Querit Aristoteles in problematis, quāobrē dicatur mentā in bello nec edendā, nec ferendā. Solut: Quoniam, inquit, refrigeret, absfumedo generatur: sed cum alij oēs ex calfactoriā uim mentæ ascribāt, fieri potest, ut per se calfaciat, per accidens refrigeret: quod & in alijs pleuriscōspicitur. MENTASTRVM. CCCCLXVI.

Mentastrū, hoc est syluestris hedyosmos aliter à Plinio describitur, folijs specie à sariua differēs, quasi figura oimi, colore pulegij: propter quod quidā syluestre pulegij uocant. Dioscorides hoc nō mentastrū, sed calaminthæ genus unum, ut arbitror, existimat.

CALAMINTHA. CCCCLXVII.

Calaminthā nostri ferē nepetam appellāt, etiā si Dioscorides speciem eius unā priuatiū nepetā uocari tradat. Proflus tanta inter mentā, mētastrum & nepetam societas est, ut misg nō sit misceri quicquid ab autorib⁹ ear⁹ species & noia: alioqui & quid modo pulegij officinis & ruribus uocatur, haud plane scias calaminthæ genus sit, an uerum pulegij. Nepetā etiā nō fata nascitur. Calaminthā Græce cætam quædictā fuisse, testis est Strabo, qui nōnullos scribit existimare Lacedæmonē ab Homero nō *ἡδύσμον* à magnitudine, sed *ῥιόν* à calaminthæ copia uocari.

THYMVM. CCCCLXVIII.

Thymū siue thyma pluratio numero, siue thymus, in mari quoque nasci traditur extra Herculis colinas, quod eiectū in pumice durescat. In Heroo sinu color etiamnū floris in eo est, ceu nondū absoluti pars: quæ aquis extat duricia lapidis aspicit, similis tamē uiuenti. Sero floret thymū, per solstitia ferē, cum & apes decerpūt, & auguriū mellis est. Seritur flore, in quo semē intelligit, etiā oculis deprehēdē nō potest. Cōalescere quidā thymū negāt, nisi in aslatu maris seratur: ideo quod translaci ex Attica, nō durasse in Arcadia. Nunc provincia, inquit, Narbonensi Plinius, lapidei campi thymo scatēt. Flos thymi periclymbribus. Duo autē sunt genera eius, candidiora dices lignosa, in collib⁹ nascēs, quod & præter: altera nigricans, florib⁹ nigri. Colligit in flore thymū, & in umbra siccant, epithymū quidē pluribus uidet flos eius thymi esse, & durus sit, & similitudinē cunilgenostri ac habeat: sed de epithymo posterius. Thymū ē Thyna laudat ab Hippocrate. Eust autē, ut inquit Galenus, Thyna in terra Thracia locust.

THYMBRA. CCCCLXVIII.

Thymbra post trigessimū diem nascitur, in maris afflatu fata, nec ut quidā putant aliter. Hæc apud nos & cunila uocatur, & ut arbitror, transmarina cunila est. Apud Columellā thymbra condimentarij generis. Satureia quoque à nonnullis thymbra dicitur. Columella thymbram à satureia diuisit, & cunilam nostratē esse docuit, quā rusticū satureiam nominant, colore floris purpureo, ut thymbræ herbaceo. Quintus Serenus speciem thymbræ satureiam intelligit, ut satureia sit non thymbra simpliciter, sed thymbra *ῥιόν*, quā Plinius cunilam capitatam semel tantū, quod meminerim, opere toto nūcupat, intra hæc quæ in cunilagine dicentur. Cæterū cunilæ præter satuiam plura sunt in medicina generata: fortasse hanc Hippocrates intelligi uoluit, ubi organū *ῥιόν* appellat. Bubulā appellant semine pulegij, organū ab Aristotele puratū, cuius pastu te studines cum serpentibus pugnaturæ uires suas creant, quod in hunc usum nonnulli panacēa uocant: quidā falsū siliquitiū interpretati eam sunt. Corrupta est in L. Columella dictio, ubi cuniculabula & inter cunilabula, pro eo quod est cunila bubula, inter pecoris medicinas legitur. Plinius organū multis locis non aliter quā cunila bubulam cōuertit. Est & cunila gallinacea, de qua in organo Heracleotico dictū est. Non omittendū a uerba dicere hoc loco Dioscoridem & Plinium: Omnia, inquit, syluestria ferē sunt, & folijs minora, & caulibus succo acriora, sicut cunila, organum, ruta. Dioscorides contrā hic prodiit de thymbra. Sunt & Græcis utroque recentioribus, qui non thymbram, sed thymbra neutro genere plurali numero pronuntiant: & nos quodque seruamus in satureia. Ouidius: Sunt qui præcipiant herbas satureia nocentes, Sumere. In thymbra Paulus & epithymbrū uocari tradidit quod in thymo & epithymū. Ridentur merito grammatici ferē omēs in herbæ exponendis iudicandisq; nominibus, in quo & Seruius Honorat⁹ sapissime decipitur, & in hac ipsa Thymbra Placid⁹ Lactanti⁹ is, qui Papinij Thebaida interpretatus est, thymbram à qua Thymbræ Apollo cognomina tus sit, Latine dici polium affirmans.

SERPILLVM. CCCCLXX.

Serpillo radix multifida, sublimis, retortida, Crescit in altitudine quamcumque, adminiculo aut sepius appositum. Aqua ei modica satisfacit. Fimo præcipue iumentorū gaudet. Sed & demissum in puteos & circa piscinas stagna latissimū prouenit, obnoxii squalori. Translatū uehementer iuuat: autumno ferē seritur. In montibus pleriq; copiosissimum, ut Thracia. Seritur autem Sicione. Athenis quoque ex Hymetto deferentibus aululis ex ijs ramis aquis. In montibus natum satureiæ odorem habet, uehementissimum illum quidem, sed gratum atq; mollem. Satuium non serpit Plinio, sed ad palmi altitudinem increscit. Voluntarium, id est syluestre, serpit in petris maxime: hoc & pinguis & candidioribus folijs atque ramis: Dioscoridi contrā serpit satuium, non syluestre.

SAMPVSCHVS. CCCCLXXI.

Sampschus in Syria & Aegypto dicitur: amaranthus uero & amara & à Siculis: itē à Theophrasto. Semē ei copiosum, odor molliter iucundus. Radix arida, cellure summa habere ens, multifida. Floret ætate nō ois, sed quā Phærgij cognominat. Semine & aululione prouenit. Transferri & plantæ solent.

h 4 MELL.

MELILOTOS. CCCCLXXII.

362 **M**elilotos, alijs ferturam Campanā, Cato fertā Campanicam, quia folijs eius coronamentis sit dicatum, in Campania Italiae cōmendatissima, ut nostri uolunt, odoratiorq; & candida: deinde Attica in Junio, mox Chalcidica: ubi cunq; uero asperis & syluestribus nata, recens nec candicans & croco q̄ simillima. Melilotos arida diutius odorē continet, qui & croco uicinus est, quemadmodū & flos. Ipsa cana placet maxime, folijs breuissimis atq; pinguisissimis. Inter aromata quibus defrutum condiri solet, L. Columella crispam pampanicam nominat. Deprauatū esse locum arbitror, & fertam Campanicam nō crispam pampanicā legendū: nec ignoro & crepin & crepulam habeti herbas, sed quibus ad unguentum & aromata nihil sit opus,

M A R V M.

CCCCLXXIII.

363 **D**e maro Plinius inter odoramenta sic loquitur: In Aegypto, inquit, nascitur marum, peius q̄ Lydiū, maioribus folijs ac uatijis: illa breuia, minuta, odorata. Lydiū marum Plinio fortasse fuit, quod Diofcoridi Magnesiū, cum fit Magnesia Lydiae ciuitas penes Sipylum, cui uicina Caria ē, in qua Tralles, ubi matum quoq; nascitur. Est & Magnesia penes Mæandrum, & Tralles in Caria: nō tamen ut Lydiū propterea decernam idem esse qd Carium gentis suae, ut Plinius ait, appellatū nomine, culinistq; principale, ut in caro demonstrabitur. Habēt & Arabes suum marum siue marū, sed penitus diuersum, & magnis ambagibus impeditū: inter quas illā sit satis indicauisse, q̄ species eius sunt melissophyllon, marubium & buglosia, quae nihil dici poterat ineptius.

A C I N O S.

CCCCLXXIII.

Differt acinos ab acono, q̄ acinos ocimastrum est, siue ocimi syluestris genus: aconos spinosa, breuis & lata herba, etyngio à quibusdā contributa, spinis latioribus. Acinos familiaris Aegyptio herba, coronarum & ciborum gratia obferitur: sponte uero nascitur aequinoctio. Hanc & acinoē & acinean Plinius appellat, & epipetron, nunquam florentem. Aequinoctio, inquit, nascitur aphace, achine quam epipetron uocant: ut nesciam tamen legendum ita sit, an illo modo potius: Aequinoctio nascitur aphace, acinos, & quam epipetron uocant, quae nunquam floret, ut duo genera faciamus, acinoē & epipetron: alioqui Theophrastus, unde Plinius ea mutuatus est, epimetron quidem (ita em̄ ipse nominat) nunquam florere scitabit: de acino mentionem nullam habet. Hippocrates epipetron ad tumores & inflammationes commendat, illius folijs eius decoctis & impositis. Hanc ipsam proprietatem acino Diofcorides ascripsit, ut coniectari liceat, Plinij uerba quae praetexui, legenda esse in hunc modum: Aequinoctio nascuntur aphace & acinos quae m̄ epipetron uocant. Mitum grauiissimos auctores Plinium & Diofcoridem in huius herbae medicinis contraria praecipere alterum cleri ea posse menses & utinas, altero contineri. Nec illud mihi abierit indicium, primo & uigesimo libro priorē mentione, (his enim loquitur ibi Plinius de acino,) in uetustis aliquot codicibus nō acino siue acinoē, sed chenopus legi, quo nomen anferi in pedi similis herba significatur: sed corruptum locum suspicor, etiam si chenopus quoque celebratur herba,

BACCHARIS

CCCCLXXV.

364 **B**accharis quae & bacchat dicitur, quia fascinū depellitur, radicis duntaxat floristq; odorati est, à quibusdā uocata nardum rusticum falso, cum nardus rustica sit asarum. Oleum & unguenta ex ea radice fieri solita Hippocrates & Cephisiodorus, & Aristophanes poetae testes sunt: unde quidam errore ducti, barbaricam eam uocabant. Addit Cephisiodorus & pedes eo lini confueuisse, ut Aegyptio, manus: sisybrino, brachium: malas & papillas, palmeo: amatacino, comam & cilia: serpyllino, ceruicem & genua, quod & in comedia cecinit Antiphanes. Baccharis inquit Galenus, Hippocrati unguentum quoddam Lydium significat, simillimum bacchari combretum, sed procerius, & foliorum exilitate usque in fila extenuatum. Baccharem Plinius asarum, Diofcorides à nostris appellari uolunt perpenfam: Aretē & in Illyrico nascentem commendatissimam ad calculos: si modo eadem est cum petrefacta, utroque enim modo legitur, & alterutram lectionem deprauatam esse ducit. Sunt exemplana in quibus nec perpenfa nec petrefacta, sed isperfa siue sparsa scriptum sit. Non delere qui baccharem genus esse floris existimarent, quem modo caryophyllon uocamus, sed syluestris: nunc atcalesq; spectantur, ab odore ita cognominati, tanta uarietate, amplitudine, pulchritudine, ut rosae pares non inferiores uideri possint, cum ea q̄ de principatu ceteris: quando nec colore superatur purpureo, uermiculato, candido: nec odore, nisi q̄ à longinquo plus olet recens rosa. Iam nihil rosa fugacius: longissima nāq; deceptis mora, dies. Caryophyllo in triduum & amplius uita uigorq; durat. Aliquis tanta magnitudo, Patauinax praecipue matronarū cura, ut orbem utraq; manu completi fere nequeas. Folia quaternis quinaq; nonnullis, rosae modo numerosa, mirabili quorundam alabastrorum cultura ratione, qui dehiscē ipso staminū loco, alabastrū ostendit alium pendentem se paulo post in florem, caliculo priore consenscente. Scio putare aliquos caryophyllon ueteribus fuisse caltham: sed cum Vergilius nobis eam luteolo cecinerit colore tinctā, nec Plinius à Vergilio dissentiat, nondū uideo qui possit ita statui. A caltha porro calthulae uestis genus dicitur, ut à cto ci similitudine crocorula. Quae sit alit barbarica, cuius mentionē supra modo fecimus, nō constat: nam sylua barbarica, id est cōfeminea, omnino aliud est: quippe quae ager sit glandibus, & quae sunt ijs similia, manu confusus: nam & uineae cōfeminales dicuntur, in quibusdi uersa uitij genera cōfuerint: auctor Columella. Nam sylua Ciminia, cuius omēs fere mentionē habēt, Strabo, Plinius, poeta Vergilius & Silius, in Ethuria monstratur inter colonā Russellanā & Vitebiū, & ubi nūc Vici lacus dicitur. In ea sylua loca sunt, in quibus depacta in terrā nō extrahitur. Fuisse quidē inter Romanū Sabinū & agrū quae sylua diceretur, scio auctore Stephano. De sylua quoq; populi Roma propria, seu hac, seu alia, Cicero in actionibus suis cōtra Rululum Tr. Pl. meminit. RVTA. CCCCLXXV.

Rutam ut alia quoq; olera, quae diu uiuēt, unitas caudicis & praegrades rami, quos acromonas & cremonas quādoq; Graeci uocāt, arborem uideri faciunt. Latiore sua uia folia, rami fructiflores: Cicuta rutae aduersa, probabili argumento: qm̄ colligentes rutam, manus cicutae succo muniūt, Sculpto

Sculptores pictoresq; ruta in cibo utuntur propter uisum. Mustella cum serpente dimicatura, in muriū uenatu rutam prius edit. Pythagoras matrem minoris & latoribus folijs, & coloris herbacei, disceuit a femina & odore. Humorem, fimum, hyemem ruta adit: apicis gaudet & siccaneis. Terra q̄ maxime lateritia & cinerea, qui & miscetur sementi, ut careat erucis. Mustū rutatū populo Romano dari solitū, nō ignotum est.

RYTA SYLVESTRIS. CCCCLXXVII.

Ruta sylvestris propriū genus est: mōtana hec & uulgaris. Sed & hypericon nōnulli ad rutā sylvestrem referunt, de quo inferius.

RYTA GALATICA. CCCCLXXVIII.

Ruta Galatica hæc est, quam Plinius intelligit præcipuū in antidotis.

M O L Y. CCCCLXXIX.

Moly Homericū Phineo & Cyllene Arcadie pternaculū, radice nigra, cepæ magnitudine, rotunda, folio cillare. Negat Theophrastus uerum esse quod Homerus cecinit, difficulter effodi: as firmat Plinius. Hanc uates ille ad dys uocari putat moly. Mercurium inuentorem fuisse: Vlixē contra Circes ueneficia monstratam, Ouidius xliij. Metamor.

Pacifer huic florem dederat Cyllenius album,

Moly uocant superi, nigra radice retentum.

Aliqui florem eius non candidū ut Homerus, sed luteum pinxere. Plinius in Campania effosam ægre inter difficultates saxear, & allatam sibi meminit, radi cis triginta pedes longæ, ac ne sic quidem solidæ, sed abruptæ. Tale uerū est moly. Dicitur & moly ruta Galatiæ, de qua diximus: q̄ solum ætate nostra medici nouere, har melam uocātes: quæmadmodum & Dioforides & Galenus à Syris dici eam testatur. Differt ab hac molon, quā & syron dici tradit Plinius, etiamsi œstron non syron in exemplaribus quibusdā legitur, scapo striato, folijs paruis, mollibus, radice quatuor digitos, in qua extrema allij caput est: anthe lantibus & stomacho prodesse credita.

PANACES HERACLION. CCCCLXXX.

Panaces genetibus continetur pluribus. Syriū nascitur unguentis, quod & in Psophide Arcadiæ, circa q̄ Erymanthi fontes gignitur. Ferula sui generis quinque cubitos, folijs quaternis, mox semis, humi stratis, ampla magnitudine, rotundis in cacumen, oleagineis. Radix autumnō, caulibus mēsisibus inciditur. Pretiū succo in libras bini asses erant cā dido: laudatur enim in primis candor eius coacti, se quens pallido statera. Niger colos & mollitia improbat: id quod ex Macedonia affertur, bucolicon uocant: quoniam armentarij succū excipiant erumpentē spōte. Hoc celerrime euanescit. Secundū genus Asclepion, tertium Heraclion, quartū Chironion, quintū Centaurion & Pharnaceon. Theophrastus primū genus Heraclion uocauit, folio magno & lato, undique sesquipede. Radice digitū crassa, bifida trifidaq; sub falsa, odore thuris. Idem autor & panaceam nominat circa Clitiorum nascentē in Arcadia: nec constat an hæc idem sit habenda, quod panaces Arcadicum, de quo per huius capituli initia disserui. Panaces ipso nomine morborū omnium remedia promittit, ob id & medicamentum ad uina quæ corrumpi nolunt, panaceæ nomen dedere scriptores Græci. Radice huius euulsa, religio erat impleri scrobem eius uario frugū placentarij genere: in mercede uidelicet & piamē-

tum terræ. Panaces & panax, Galeno teste, dici soliti.

PANACES ASCLEPION. CCCCLXXXI.

Panaces Asclepion dictum a iunt quoniam si filiā Panaciam uocauerim. Huiusradicem Theophrastus multi & falsi corticis haberi dixit, quod quidem priori generi à Dioscoride tribuitur. Est & Heraclion appellatum, Herculi ascriptum inuentori, quod ab alij origanum Heracleoticum syluestre accipitur. Quidam Heraclion intelligū genus id, quod mentione proxima descripsimus.

PANACES CHIRONION. CCCCLXXXII.

Panaces Chironion & hoc ab inuentore. Folium rumicis Theophrastus & Plinius ei reddūt, maris tamen & hirsutius, radice parua. Nascitur locis pinguibus: cuius flos efficacissimus, eoq; amplius q̄ supradicta prodest. Est & genus aliud panacis ab eodem Chirone inuentum, & Centaurion cognominatum. Sed & Pharnaceon in controuersa inuentionis à rege Pharnace deductum. Seritur hoc longioribus q̄ cætera folijs & ferratis. Radix odorata in umbra siccat, & gratiam uino adiicit. Huius duo genera fecere: alterj leuioris folij, alterum tenuioris.

LIGYSTIVM. CCCCLXXXIII.

Ligusticum syluestre est in Liguria: suæ montibus, sed seritur ubiq; quod & suauius est: q̄q; sine uiribus. Crateias apud Græcos cunilam bulbulam eo nomine intelligit falsā. Cæteri ferē canizaminem cunilaginemq; Ligusticum Galenus unius inuersione literæ, libyiticon appellat.

STAPHYLINOS AGRIOS. CCCCLXXXIII.

Pastinaca sylvestris, siue quod idem est erraticæ & pratensis, ad differentiam siatue dicitur. Præsertur siatue sylvestris in medicina, magisq; in petrosis nata. Pastinacæ omni radicibus calens natura, sapor uehemens: ob id Venerem ciere creditur, & propterea philtron uocari. Cartilaginei omnis generis. Satiua in cibum utilis esse incipit annicula. Bima utilis, gratior autumnō, patinisq; maxime: & sic quoq; uirus intractabile illi q̄, ut inquit Plinius. De his bisco & dauco, quæ simillima existimantur pastinacæ, dicemus suis locis. Diximus & de silece, cui cum pastinaca uicinitas eadem est. Pastinacam Dioscorides medicus non staphylinum, ut cæteri, sed astaphylinum uocauit: duodecim cubitorum in Mauritania magnitudo caulibus, crassiusculo palmarū generatū.

SESELI MASSILIENSE. CCCCLXXXV.

Seseli Massiliense optimum: lato enim grano & fusulo est, quo & uultures uescantur, & ceruæ paritæ. Seseli & sili dicitur, & sili apud Hippocratem, unde orta confusio, siler pro seseli uocatum. Arborecū porro siler, ut baculos rustici ex eo quoque faciant, in aquaticis nascens. Molle siler, à poetā dictum neutro genere, quod perq̄ tarum sili arboribus Latina lingua. Refugiunt hoc serpentes. At seseli frutex non est aquaticus, quod quidem aliquoq; distinguere putantes, non siler sed montanum siler appellauerunt, id quod Massiliense est seseli.

SESELI AETHYOPICVM. CCCCLXXXVI.

Seseli Aethyopico dignitas secunda. Hoc & nigri us est, & nascitur hodieq; apud nos, sed frustra, medicis officinisq; in cognitum.

SESELI PELOPONESIACVM CCCCLXXXVII.

TORDYLO. CCCCLXXXVIII.

Tordylon & gordylon & tordylon & tordyle dicitur, & seseli cognomento Creticum, inter omnia ge-

omnia genera odoratissimum. Tordylon potro aliq
femen sefelis dixerunt, aliq herbam perse, quam &
syreon uocauerunt: de qua nihil aliud proditum in
uenisse Plinius faretur, q̄ in mōtibz nascitur. Pau
lus non tordylon, sed gordylon appellauit.

S I S O N.

CCCCXXXIX.

378 **S**ison siue sinon, & senon Hippocrati, & quandoq;
silion uocatur, quaternis constare ramis scrip
tum reperio. A N I S V M. CCCCXC.

Anifum culinis gignitur: crudum, decoctum,
uiuens, aridum, panis etiā crustis inferioribz
subditū, faccis quoq; laudat additū cū ama
ris nucibus, commendando uino. Anicetum & hoc
uocatur ateri modo, quoniam appetentiam præstet
ciborum. Aegyptium ligustici uicem præbet in con
dimentis. Efficacius semper recens & nigerrimum:
stomacho tamen inutile est, præterq; inflaro.

C A R O S.

CCCCXCI.

Caros arbitror hoc esse, quod Plinius carium
siue careum gentis suæ nomine appellatum
dixit, ab aliquibus careofemen & caroum, cu
linis principale, in quacunq; terra ferendum ratione
qua olus atrum. Laudatissimum in Caria, proximū
Phrygia. Caros Græci ut pathos neutro genere pro
nuntiant & insciscunt. Dicitur & caro ultima produ
cta. Caron Athenæus pastinacam maiorem esse pu
tat, & multo præstantiorem sapore q̄ pastinacā uul
garem. Est & radix cara de qua in rebus gestis à Cæ
sare mentionem facit Hirtius. Hac læti admixta mul
tum leuasse dicitur inopiam, similitudine representa
ta panis. Meminit & Plutarchus, sed nomen herbæ
nos reddidit. A N E T H V M. CCCCXCII.

Anethum culinis anisi modo gratum. Corona
bantur hoc & in conuiuio recenti, atq; prosci
do, ad conciliandū, ut uidet Galenus, fonnū.

C V M I N V M S A T I V V M. CCCCXCIII.

379 **C**umino semen angustum, nudum, canalicu
lū m̄bz, facile inarscens frumenti modo, ubi
plane accreuit, defluum atq; lubricum. Peculi
ares cumino morbi, facies & salislag. Nascitur in
summa tellure, uix hærens, & in sublimē tendens, in
putribus & calidis, medio ferendū uere. In Carpeta
nia maxime laudatur: alioqui Aethiopico Africoq;
palma. Quidam huic Aegyptium prætulere. Hippo
crates: In fegetibus, inquit, triticis, præsertimq; in Ae
gypto nascitur semen Aethiopico simile cumino, ue
hementis acrimoniæ, ad conceptus foeminarum uti
le, si uuluis apponatur. Hoc ego cuminum Aegypti
um interpretor. Basilicum & Aethiopicum apud Hip
pocratem pleriq; interpretantur ammi.

C V M I N V M S Y L V E S T R E CCCCXCIII.

380 **C**umino sylvestre est, quod & rusticū & Theba
icum appellat. Aëtius: Cumini, inquit, sylvestre
hoc est, quod modo Aethiopici uocari cœpir.

A L I V D C V M I N V M S Y L V E S T R E. CCCCXCV.

A M M I.

CCCCXCVI.

381 **E**st cumino simillimū quod Græci uocant ammi,
tū candidus & exilius cumino. Similis autē &
huic usus: nam & panibus Alexandrinis subigi
tur, & alimentis interponit. Herbā quoq; ipsam Græ
ci uocant ammi.

C O R I A N D R V M CCCCXCVII.

382 **C**oriantrum conon & à Theophrasto coriannon
uidetur appellatū, siue ut magis probo, coriannon:
ita uocari solitū à ueteribus testis est Galenus & Dio
scorides. Seritur Maio, & contumax prouentu scribi
tur. Radice breuiuscula, nec admodum fibrata, cauli
bus ramisq; multis, nudo semine, ac firmo & duri
no. Sub canis ortū salefcit. Inter syluestria coriandru
nō est. Huic subito cū acetō uis tanta, ut carnem in
corruptā feruet scilicet. Xenocrates tradit mēstrua cō
rineri uno die, si unū granū biberint foeminae: biduo,
si duo: & totidē diebus, quorū grana sumperint.

H I E R A C I O N M A I V S. CCCCXCVIII.

383 **D**e hieracio inter lactucae syluestres memini
mus: qm̄ Romani lactuca folio toruho &
breui hieracion intelligebant. Dicta est ex
eo q̄ accipitres scalpendo eam, & oculis succo tin
ctis, obscuritatem cum sensere, discutiunt.

H I E R A C I O N M I N V S. CCCCXCIX.

Hieraciū & hoc superius etiā hieracia dicitur
Aëtio atq; Horo: cuius succo palpebræ reglu
tinantur. Idem autor eodē loco: Anacollia inquit
appellatur, quorū lachryma in cōmodāres pilos cor
rigit. Quid autem sint anacollia nō comperi, nec sint
plexan composita sit facultas, scio.

A P I V M.

D.

384 **A**pium & apius Græci selinon uocant. Durat
biennio. Prouenit crispus, pedibus aut cylin
dro pilis uel pulsatur: quinquagesimo alatu
die, quadragesimo cū ocysime. Apū aliud folio ipis
so, hirsuto, crispo: aliud raro, expanso, caule item ma
iore. Item aliud caule albo, aliud purpureo, aliud uer
sicolore. Syluestriora hæc, ut Theophrastus inquit.
Propriū apio, q̄ colorem mutat. Rami eius per iura
quoq; uulgo innatant, & in condimentis peculiarem
uoluptatē præbent. Pisces quoq; si ægrotant in pisci
nis, apio uiridi recreantur. Honos ei in Achæia corona
re uictores sacri certaminis Nemeæ. Apud eruditos
nō aliud erutum terra in maiore sententia: autorita
te est. Distinguitur sexu. Foemina ut sit crispioribus
folijs atq; duris, crasso caule, sapore acri & seruido:
mas folijs nigrioribus, breuioris radicis, uermicu
losq; gignens. Neutrū ad cibos admittēbā, nephastū
existimantes: qm̄ defunctorū sit epulis feralibus dica
tum: & ut Plutarchus inquit, coronentur apio sepul
chra: unde uerus illud indignare apio: de ijs qui proli
gara ualitudine utuntur. Vermiculos & foemina cau
libus innasci: propterea eos qui ederint, sterilecere
utroq; sexu. In puerperis uero ab eo cibo comitiales
fieri, qui uubera infantes hauserint. Innocentiorē ramē
esse marem, ea q̄ causa est, ne inter nephastos fruti
ces damnet.

E L E O S E L I N O N. DI.

Eleoselinon paludapiū ficto, ut solet, noie The
odoros appellauit, quia in paludibus nascatur,
secundūq; aque ductus, folio raro, nec hirsuto,
simile apio sapore, fig uia, odore. Homerus apū eleo
threpton uocauit, hoc est palustre.

O R E O S E L I N O N. DI.

385 **O**reoselinon à quibusdā orthoselinō, quia frut
tice recto nascitur, caule anethi exiliore tm̄,
folio ut Theophrastus inquit cicutæ: nisi q̄
deprauatū in eo locū putet. καὶ τὰ φύλλα ἔχει κατὰ τὸν ἄνθος
αὐτοῦ, pro eo quod est, καὶ τὸν αὐτὸν ἔχει κατὰ τὸν ἄνθος, hoc ē, ca
pitula papaueris similia, ut Dioscorides uerba sunt.

P E T R O S E L I N V M. DI.

Petroselinon, hoc est apū in faxis natū. Addide
re quidam bucelinon differens breuiorē cau
lis à sariuo, & radicis colore ruffo. Galenus pe
troselinon in Cilicia Amanō monte natū Smyrniō
potius

potius ꝑ petroselinon uideri sibi tradidit.

HIPPOSELINON. DIII.

Hipposelinon Theodorus ab equis dictū, equum uocare maluit, cum Latine olusariꝝ & olus pulum dicatur. Viret ei foliū cacumine perpetuum, palustri simile sed pilosum, caule grandi, radice crassa modo raphani sed nigra, fructu rasi maiore, atro. Nascitur ubiqꝛe lachryma sua, quam ni hil differte à myrtha dicunt. Autiqꝛ est Theophrastus, myrtha facta natum. Scribit & radice.

S MYRNIVM. DV.

SMyrnum caulem habet qui ætate incipiente arescit. Cortex radice intus & pallet cortice arido. Ad opsonia utuntur cum mulsio & oleo & garo, maxime in elixis carnibus. Radix sapore pipere simillima. Odor herbæ myrthæ, unde nomen. Hoc & petroselinon syluestre uocari scribit Galenus.

ELAPHOBOSCON. DVI.

Elaphoboscon ferulaceum est, geniculatū, digiti crassitudine. Semen in corymbis dependentibus similibus effigie, sed non amaris. Folia olis acri.

FOENICVLVS. DVII.

Foeniculum in Hiberis Hispaniæ laudatissimū, condimentis propè omnibus inferitur: quin & crustis in panificio apertissime subijcitur.

HIPPOMARATHVM. DVIII.

Hippomarathum à magnitudine uidetur appellatū, quod aliqui Mysineum uocant, folijs maioribus, gustu acriore, procerius, crassitudine brachiali, radice candida. Nascitur in calidis sed saxosis, tantæ amplitudinis in Mauritania, ut caulis duodecim cubitis assurgat, crassitudine palmorum quatuor.

HIPPOMARATHVM ALIVD. DIX.

Hippomarathum aliud hoc est quod tradidit Dioscorus: folium habet angulosum atqꝛ longū.

DAVCVS. DX.

Daucus quæ à nostris Callica pastinaca dicit, specie lauri, colore croci, radice nigra Theophrasto. Dauci quatuor nonnulli fecere genera. Dioscorides & Plinius tria persequuntur: Probacissima in Creta, mox in Achaia, Patrensi & Spartano agro, & ubiqꝛ in siccis. Priori generi folia etiam hirsuta, caulis rectus, radice suauissimi gustꝝ & odoris. Reliqua genera passim nascuntur terrenis collibus limitibusqꝛ, nec nisi pingui solo, folijs coriandri, caule cubitali, capitulis orbiculatis, sæpe plurimis q̃ ternis, radice lignosa & cum inanuerit superuacua. Semen cumino simile, prioris milio. Albū acre, odoratum omnibus & feruens. Secundū priore uehemētius est, eoqꝛ parce sumi debet. Tertium genus simile staphylino, semine oblongo, radice dulci. Omnia hæc & hyme & ætate quæ adrupedi sunt incacta, nisi post abortus. Quidam ut Paulus & Galenus prior eo meminit, daucū nihil aliud esse uoluerunt, q̃ staphylinum syluestrem, q̃ uidetur à dauco aliud genus esse daucos herba cognominata apud Galenū, duas daucos seorsum indicantem: nisi quis librarios accuset, q̃ quæ Galeni non sunt, adiecerint. Hippocrates daucum Aethiopicam laudat.

DELPHINIVM MAIVS. DXI.

DELPHINIVM MINVS. DXII.

PYRETHRVM. DXIII.

Pyrethrum depictum coloribus umbraculū, purpureo, cæ

pureo, candido, luteo, porraceo, ut scribere quidam. Sunt qui hanc interpretentur quàm uulgo rutici & olitores draconem acetariū uocant, ut aliubi notauimus, omnino dissimilem eius quā Dioscorides hoc capite demonstrat. Sed æstimanda res tota diligētius.

LIBANOTIS. DXIII.

Libanotidis uocabulo multa genera feruntur. Vnum inter cunilaginea à nobis dicendū, alterum de quo hic, in species ternas diuisum: tertium coronariæ, quæ rosmarinum proprie uocari Dioscorides existimat. Libanotis porro de quo præsens caput loquitur, radicem habet olusari, locis putridis, macris, saxosis & roscidis provenit: feritur femine, quod quidē fertili rosmarino, scabrum & oblongum à Theophrasto redditur: folio palustri apꝑ, m note multo, sterili, foliū lactucae syluestris & amare, candidius & asperius, radice breui. Vestibus interposita libanotis abigit tineas. Carpitur per mensem fertilis. Caulis quoqꝛ nō modo semen resinaceus. Folijs & radici odor thuris, unde nomen. Libanotidem cum erice lætissimā nasci Theophrastus inquit. Theodorus locum non ubi erice, sed ubi dictū est, conuertit, pro eo quod est ὄρου ἰσχυρῆ, legens ὄρου ἐπὶ πύλῃ, libanotis Græcorum sanè culpa.

LIBANOTIS CORONARIA. DXV.

Libanotis coronaria differt quidē folio à prioribus, sed comprehensā forte à Plinio est inter fertiles, nisi quis hanc pro cunilagine accipiat. Ea quæ libanotis uocatur, & in coronas admittitur. Paulus & Galenus Dioscoridem secuti quatuor libanotidis genera connumerāt: unam sterilem, secundas duas: Quartam generis coronamētari, quæ à Romanis priuatiu rosmarinum dici uolunt, etiam si pri ora quoqꝛ genera Plinius ita uocari prodāt.

SPHONDYLION. DXVI.

Sphondyli succus qui exprimitur, mire appetit à mulsis, & quæ sunt ijs similia. Sphondyli ferula est, differens à panace folijs, quia sunt trinora & platani diuisura. Non nisi in opacis gignitur, in palustribus Patauini agri fæpe usum. Huius semē eodem nomine, medicinæ tantum utile.

FERVILA. DXVII.

Ascribitur arborū generi ferula: quoniam tenero eius processu transit in lignū. Propterea Clearchus inter questiones luforias quas nostri scirpos, Græci gryphos & ænigmata uocant. Ferulam dicit esse lignū non lignum, sicut pumicem, lapidem nō lapidem & noctuam, uolūtē non uolūtē. Calidis ferula nascitur locis, atqꝛ trans maria, geniculatis per uices nodata scapis. Duo ei genera: narthecem Græci uocant & surgentē alte. Nartheciā uero semper humilem: quæ ab aliquibus ferulago dicitur: q̃q̃ & Thapsia ferulago appellari solet. Est & instrumentū medicinalē ferula, siue narthex. A genibus folia exeunt grandia, mollia, multifida, maxima, ut quæqꝛ terræ sunt proxima, caulem amplectētia ut harundines, sed magis scinditur in coliculos, quibus flores lutei & semen anethi paulo maius insertet: sed quæ ab uno caule diuiditur in cacumine, semina putatur. Germinat uere primū folio, tum caule, qui annuus ei est. Radice singulari, profunda. Ferula lignum omne corticis loco habent, hoc est, forinsecus: ligni autē uice fungosam intus medullam, ut sambuci. Nonnullæ inanitate, ut harundines. Nulli fruticum leuēta maior, ob id fenestulibaculus. Semen feru.

men ferula Thapsiam uocauere aliqui falso. Hoc in Italia cibis est: conditur quippe, duratq; anni spatio in urce. Caulis quoq; de coctis eduntur: commendaturq; musto & melle. Corymbiam nominant: sicut racemos eius quos item coniunt, corymbos, quibus & in coronis urebantur. Ignem ferulis optime seruari certum est, easq; in Aegy pro præcellere. Natura ferularum murens infestissima: moriuntur ea tactæ. Afinis gratissimæ sunt in pabulo, ceteris iumentis presentaneo ueneno: qua de causa id animal Libeto patri assignat, cui & ferula. Ferulam non minus à feruēdo, q̃ à ferendo dictam uideri facit Hippocrates, qui eam plectinga uocauit. Inter fortunatas insulas Norion uocatur, in qua ferulæ tanta crescunt amplitudine, ut arbores fiant. Earum nigre succo amarissimo damnantur: candidæ probantur, adeo ut poculentus quoq; sit.

PEUCEDANVM. DXVIII.

Peuucedanum siue peucedanum, nomen à pinu inuenit, ut myrtidani à myrto: q̃q̃ & amaritudinem uocabulum id significat apud poetas, celebrata inter primas herba. Laudatissimum in Arcadia Plinius existimat. Foditur exiit autumnii. Placent tenerrimæ & altissimæ radices. Hæ concidiuntur in digitos quarernos offeiss culcellis, funduntq; succum: Probatur hic & crassitudine melle, & odore suauiter graui. Peucedanum officinæ ostendunt quale Dioscorides in cætera tantum radice non succosa, sed lignosa: nec graui odore, sed iucundo: quod nos admonitionis causa dictum uolumus.

MELANTHION. DXIX.

Melanthion quod & melanthermon & melanthion inter ab Hippocrate uocatur, & à theophrasto, ut Theodocus existimat, anthemion sine anthemion, nigellam interpretatus: q̃q̃ anthemion omnino alia species est q̃ melanthion siue gith, siue ut Palladius, giddi: nam & melanthemō *χαμαίριον* est. Melanion uero nigra uiola. Optimum gith q̃ excitatissimi odoris & q̃nigerimū. Culices iussit necat & muscas. Succū eius largius sumenti uenenum esse, mirari licet: cum semen ipsum inferiorem crustam panis cereali sapore cōdiat gratissime. Aliud omnino genus uidetur esse gith: quod in segetibus passim nasci cernitur, & pseudomelanthion uocari potest & githago, folijs ferè porri oblongis, flore purpureo, semine ac toto frutice maius q̃ melanthium, nec odoratum. At uerum gith de quo presens Dioscoridi mentio est, foliū habet fœniculi senecionis uel florem ceruleum. Odor semini iocundus, nec ubiq; prouenit. Hippocrates Cyprum commendat. Alia est herba melandryum, in segete pratisq; nascentis, albo flore, odorata, cuius cauliculum iocineri tritum ex uiuere probant.

SILPHION. DXX.

Silphio, id est, laserpicio radix crassa multaq; Caulis ænuus, altitudine & crassitudine quasi ferulæ, folium simile apio, quod inuente uere proficit deciduumq; est, eximīū purgando & saginando pecori, carne mirabilem in modū iocūda. Folio amissio caulis emicat: qui omnibus modis paratus igni mādatur, hominēq; diebus quadraginta purgat omni uitio. Semen ei latum, foliaceum. Succus du plex & scapum, cauillas uocatus. E radice rizias, uilior ac putrescens. Radici cortex niger, qui & detrahatur ad meretricis adulteria, Præparatur uero succus admixto surfu

reaut farina, subinde concutiendo uas, quatenus ad maturitatē perducat, id est, quatenus succare desinat, & colorem suum capiat: ita inueteratū à situ ueniant dicant & carie, laser uocantes. Perucidior hic & purior à radice, dilutior à caule: ob id farina inditur ut coeat. Natum ferunt silphii imbre crasso & piceo, te pente madesacta tellure circa Hesperidū hortos, Syrtinq; maiorem, septem annis ante oppidum Cyrenarum conditum: uim aut illam quatuor stadiorum spacio in Aphrica ualuisse, rem feram & contumacē, atq; si coleretur, in deserta fugientem. Quidā radicē laserpicio maiorem fuisse cubitali perhibent, & cuius medio caput sublime conspiciendumq; tuber, unde primum succus ceu lacteus erumpat. Supremā caulem magydarin uocatū: q̃q̃ & semen eius quoq; magydaris ab aliquibus dicitur, ut Galenus scribit, folio aurei coloris, quo seminis uice austrinis flabibus decussio, à canis ortu laserpiciū nascitur: eodēq; anno & scapum & radicē aboleri, solum circumfodi subactum, glutumq; fieri. Radices eius recens præfectas ex aceto mandit. Pecora non purgari eo, sed si ægrotant, aut sanari protinus, quod ferè consequitur, aut emori. Prior opinio uidetur Persico silphio congruere, multo infra Cyrenaicum nascenti. E Syria quoq; importari maxime solebat, Partico siue Persico deterius, Medico præstantius. Actius laser à Cyrenaico lacte separauit, siue quia laser succus ipse silphij non lac esset: siue quia laseris appellatō Persicum aut Medicum ut cognobiliora, non Cyrenaicum ueniret: quippe quod ad pondus argenti denarij pendebatur, multisq; iam annis, ut Plinius ait non inuenitur. Cum comedit omis caulem protinus dormit, capra stenuat, tauros inflammant nariibus illitis, serpentes audivissimas uini admixtum rumpit. Præcipit aut se quidā ex alto, cum in dentium dolore cauis addidisset indusum cera. Laser Græci opum uocant: & q̃q̃ opos manantem herba cuiusq; succū ex uulnere significet, Cyrenaicum tamē absolute pronuntiatu indicat, ut Varroni placeat, qui coagulati lac eo tradit. Post Cyrenaicum auctoritas deinde Medico & Syriaco, ut Galen⁹ inquit. Hippocrates phyllon Libyon & Aethiopicum uocādo, ipsum silphij semen significat Galeno: ut quod præ sua latitudine foliaceum sit: Interim phyllon uocat hoc, nec adijcit Libycum. Radicem huius proprie silphion appellat, *καυλόν* uero & *σκαπύμμη* scapum, id est, coleum, ut Hierodotus. Solini quoq; uerba de silphio subiiciam: Apud Cyrenenses, inquit, syrpe gignitur, odoratis radicibus, uirgulto herbedo magis q̃ arbusco: cuius & culmo exudat æstatis tempore pingue roscidum: idq; pascentium hircorum inhaeret barbulis: ubi cū arefactum inoleuit, guttis steriacis legitur ad usum medicinarum, uel medelæ potius. Dicitum est primū, inquit, syrpicum, quia manat in modum lactis: deinde uisū deriuante, laser nominatū: Paulō post: Asbyæ inquit, uiuunt laser: hoc aluntur: hoc illis dulce est. Ex his uerbis Solinus satis indicat se de silphio loqui uoluisse quidem, sed parū nouisse quid diceret: ita salebrosus & defertus in eo genere sermo eius est, Plautus in Rudente:

Speras, inquit, tibi multum hoc anno futurum syrpe & laserpiciū.

Sed cur Varro draconon appellari dicit ipsum lac Cyrenaicum: an non draconon, sed diatonon legi potest: quia odorem intentum & uehementē habet aut

et dracanone à colore rubro, talis enim præfetur: nam et herba rubia, quandoq; apud Græcos cinnabaris et dracanone uocata est, autore Dioscoride.

MAGYDARIS.

DXXI.

Magydaris siue magudaris, à laserpitio differt ténertudine. In Syria et Parnasso montes plurima. Theophrastus et Plinius in Libya eam nasci pernegant. Sunt qui et hanc laserpitii appellent perici uero facile discernunt uel aspectu.

SAGAPENVM.

DXXII.

Sagapenū medicinz tantū scriitur in hortis: dicitur et sacopenium: quod sacopenium quod apud nos gignitur, in totum transmarino alienatur: illud enim ammoniaci lacrymæ simile sagapenon uocant, fruticis sui nomine, ut Galenus inquit, per abusionem.

EUPHORBIVM.

DXXIII.

Euphorbium et Euphorbia tuba Ptolomei patet in Atlante gigni herbā scribit, dicato priuatim uolumine, folijs acanthinis, appellatā nomine in uentoris eius medici sunt et fratris Musæ. Scribitur lac non omni uentriculo, sed hœdino. Qui colligunt clarius uident. Siccatur conto, ut effigiem thuris habeat. Adulteratur hœdino lacte, sed discernitur igni: quod enim syncerum non est, fastidiendi odorem habet. Multū infra hunc succum est qui in Callia fit ex herba chamælea granum coci, ut Plinius inquit ferente. Fractus ammoniaci similis est. Accendit os semel gustatū, et magis ex interuallo, donec fauces quoq; assiccet. Galenus et Paulus phorbion, siue phormion herbam quandā nominant, longe ab Euphorbio diuersam, cuius folio et semine ad albugines utantur cum melle: spicula quoq; corporibus extrahi persuasum sit. Græci codices Euphobion pro Euphorbio ferē scribunt.

GALBANVM.

DXXIII.

Galbanum γαλβανόν Græci uocant, et serulam et lachrymam: item stagonitin et metopion. Laudatur simile ammoniaci, adulteratur sagapeno. Permutatur in libras quinque. Medicinæ hoc tantum galbanon à colore dictum candido existimant: à quo et uestis nomen galbanū Iuuenali. Vulgo quoque nautica operimenta sic uocamus: nam galbē ut Tranquillus ait, remedia sunt lanis inuoluta.

AMMONIACVM.

DXXV.

Ammoniacum dicitur, quoniam stillat in harenis iuxta Iouis Ammonis oraculū resine modo, aut gummi: ipsum thrausma siue thraustum thuris habet masculi similitudinem: phryama uero pingue resinosumq; adulteratur harenis uelut nascēdo apprehensis: igitur quoniam minimis glebis probatur, et quoniam purissimis. Pretium optimi in libras asses quadraginta. Metopion arbor ipsa dicitur, ut galbani à solino metops.

SARCOCOLLA.

DXXVI.

Sarcocolla uerustate nigrescit maxime: melior, quod candidior. Et spina reddi putat, cum quadam acrimonia dulcem.

GLAUCION.

DXXVII.

Glaucion et in Parthia nascitur, folijs densis, minoribusq; papaueris, sordidioribusq; gustu amarum quodā astrictione. Granū habet crocei coloris. Hinc temperatur collyriū, quod medici diaglaucion uocant, in quod recentiores papauere cornuto utuntur, aut etiam chelidonio maiore: ut ni

hil profecerit Dioscoridis attestatio, in mentione papaueris illius, cum aliqui magno periculo hac parte hallucinentur, quod chelidoniū et papaueris eius naru ra erodendo sit, glauciū multo mitior et refrigeratō ferē: propterea collyriū ex illo inuentorū oculis adhiberi solet: ex glaucio, humanis.

GLUTINVM.

DXXVIII.

Glutinum siue gluten Græce colla, præstantissimum fit ex aurbus taurorū et genitalibus: sed adulteratur nihil æque quibuscumq; pellibus in ueteraris, calceamentisq; eū decoctis. Rhodiacum uero fidelissimū, eoq; et pictores et medici utuntur. Lignosum improbatum. Contexti par est et reliqua glutinū genera. Auro glutinū est lanterna: ferto, argilla: xris maffis, cadmia: laminis, alumen: stannum, æramētis: stanno, argentū: marmori et plumbo resina: plumbum nigrū, albo: album ipsum sibi, oleo. Est et glutinum auricum inducitur. Lignum, leucoporon siue leucophaeon uocatum, ex pluribus compositum, Sinopidis Ponticæ sibra. Silis lucidi pondus x. et melini Græcienfis duobus mixtis, tritisq; unā per duodecim dies. Est et lithocolla glutinū ex lapidibus, sicut ichthyocolla ex piscibus. Habetur et gluten librarium ex simila et polline: nam gluten Atticum pro gummi ex amygdala quandoq; accipitur à chymicis.

ICHTHYOCOLLA.

DXXIX.

Ichthyocolla appellatur piscis, cui glutinosum est corium. Idemq; nomen glutino eius, quod alij ex corio, alij ex uentre putant fieri. Ichthyocolla inuentum Dgedali. Laudatur carens uenis squamisq;. Madesce debet concisa in aqua, uel aceto nocte et die: mox tunc marinis lapidib; ut facilius liqueat.

VISCVM.

DXXX.

Viscum Græce ixos, et ixiā frutex ipse ut Athegeus ait. Porro uiscum illud quod inter uenena ponitur à Dioscoride, Galeno, Plinio, ixiā Græci uocant et ulochon siue ulophonon: quibus nominibus chamæleonem quoq; dici constat: radicemq; affirmant esse hoc genus uisci, quod interficat: unde orta dubitatio est, uiscum hoc pro chamæleonem, an pro sui generis, aut per fruticis ipsius radicem capiamus, ex quo uiscum conficitur. Paulus et Aëtius in uenenis ixiā à chamæleonte separant, alias et notas et medicinas reddendo. In quercu, ilice, pruno syluestri, therebintho, nec alijs arborib; adnascitur. Dioscorides addit malo et pyro. Copiosissimum in quercu. Perijci putant quod dryos hyphear uocant, Ion poeta sudorē quercus: namq; quod in abiete et larice fit, stelim Eubœa dicit, hyphear Arcadia, non uiscum. Visci porro genera bina uel terna faciunt, et in omni arbore excepta ilice et quercu. Differentiā constituit odor uirustis et foliū, non locundi odoris. Viscum coloris, ut poeta inquit, aurei: amara et lentum, et robore præcipuū: hyphear uero ad saginanda pecora utilius, quia et alimēti plus et pinguius in larice et abiete fit. Vicia purgat primum, dein pinguefacit quæ sufficere purgationi, ut silphium. Quibus sit aliqua tabes intus negant durare. Edēdi ratio ætatis quadragenis diebus. Adiciunt aliqui discrimē in ijs quibus folia decidunt, et uisco decidere: contra in hærere nato in æterno fronde. Omnino autem fatū nullo modo prouenit: unde Maroni dictum: Quod non sua seminat arbor: nec nisi per alium fimo redditum maxime palumbis et turdis: siue ut quidam ex

i Theo

Theophrasto, picis, *alvav* pro *alvav* legentes: cum aliquot Plautus, autore Servio grammatico, de turdellis intellexerit: cum inquit: Ipsa sibi avis mortē creat. Est autem turdella turdi genus atrox, quod in Venetia provincia drexanos vulgo nominant, in Liguria priscum nomen tenent: maiores turdo sunt, penna subtus varia. Græci cossyphos modo appellant, ut quibusdā videtur. Drexanos porro quasi dryxanos, hoc est quercus ardentis uocatos existimāt. Cossyphos certe Aristoteles merulas intelligit, item corythos. Palumbos Græci phartas, siue phasias vocāt: sed genus eorum unum, cuius simo viscum nascatur, Athenæus cenadem appellari tradit, quā Theodorus noster in Aristotele uaginam interpretatus est. Altitudo eius non excedit cubitalē, semper fruticosi ac uirentis. Mas fertilis, femina sterilis. Aliquando non fert. Viscum fit ex acinis immaturis, hoc est uiridibus, nondū cādidis, quod eis per maturitatē contingit. Hi per menses collecti, siccati atq; tuss, deinde putrefacti aqua duodenis ferē diebus, mox in profuente, rursus malleo cunduntur, amissis corticibus, interiore carne lentescētes. Quidam decoquunt in aqua tustum, donec innaret: nōnulli cōmanducātes acinos, expuunt cortices. Optimū est quod sine cortice est, quodq; leuissimū. Quidā efficacius futurum promittunt, detractum prima luna ē robore sine ferro. Viscū nihil est glutinosius, pennis maxime uoluerum ligandis, iuglandium oleo subactum, cum libeat infidas moliri. Drydies in Gallia nihil habent visco & arbore in quagignatur, si modo sit robur, sacratius: nec ulla sacra sine ea fronde faciunt. Quicquid ijs adnascitur, ē coelo missum putant. Inuētū rarum, magna religione petitur, & ante omnia sexta luna. Post sacrificium & epulas sub arbore sacerdos ueste candida, salce aurea id demerit, candido excipiente sago, tā urosq; duos coloris candidi, tum primū coruinus uinctos immolat, precantes ut suum donum deus prosperē faciat. Fecunditatē eo potō dari, cuius animalium sterili arbitrantur, contraq; uenena omnia esse remediū. Fit & ex alijs quoq; rebus viscū in Syria, ex acinis quos ab Augusti honore ut consilio, sebastos appellauerūt. Hæc myxa ueteribus suis se interpretor, quæ per diminutiōē quodq; myxaria dicunt. Arbuti eius ligno cortex albus, ramis uirēs, folio rotundo, amplo, fructus in racemo dulcis, candido lentore plenus, cum interiore nucleo quasi oliua siccat. Hic in medicina uentrem soluit, distillationesq; comprimit, & rosiones uesciæ, & intestinos animalia Damascenū inde viscum paratur, cōmendatissimū aucupijs, præterq; aquatiliū uolucrū. Finigitur & ex radice quadā viscum lantanæ dicti fruticis, quæ ueteribus incogniti, folio hirsuto, molli, flore candido, odorato, quem sustinet umbella, uimini bus lentis ad nexum acinis, ut uua primo rubentibus, post nigrañtibz.

A P A R I N E.

DXXXI.

A Parine, quā nostri & lappam uocant, Hippocrates phlission & phileterion quoq; ut Galenus putat. Non euident, sed occultus in ea flos maturefcit, & intra se germinat semen, uelut animalia quæ in se pariunt, ut uiperæ. Nascitur in frumētario agro inter lentem præcipue: item pratis horisq;. Ramosa hæc & hirsuta, quinis senisq; in orbem circa ramos folijs per interualla. Semen subdulce,

omphacocarpon à Plinio, Galeno, & Paulo Aegineta dicitur: nisi quis omphalocarpon ex Dioscoride legi malit, ab umbilici similitudine, quam semē præfert. Philanthropos uero dicta est hæc: à nonnullis herba: quia uelut amici solent, commēcantium lacinijs obhæreat. Aliud floris genus est, quod in Parthis nasci scribit Apollodorus, philadelphum appellatum, ex argumento, q; rami eius ex interuallo sponte coeant ceumantes: post digrediantur, concipiunt, atq; pariant. Huius tenuissimis uirgis reticulatim compositis argita conficis, hortorum septa impetrabili compage fieri.

A L Y S S O N.

DXXXII.

A Lysson distat à rubia, folijs tantum ramisq; minoribus: ita dictum q; rabiem canum defendat. Saniem conspecto eo siccari tradit. Autor est Aëtius, quosdam existimare hanc herbam nihil differre ab sideriti Heraclæa, quæ tertia est inter siderites à Dioscoride mōstratas. Sed & Photion grammaticus folio eam sub purpureo describit, quod & si derites habet tertia, ut Dioscorides est autor. Ego alysson ab hac sideriti plurimum differre nihil dubito. Alysson & poculi genus est, uerum scriptura separata, q; per simplex s. & per a. scribitur: ut per herba caprum, per y. & per duplex ff. Sunt qui crucialem herbam uulgo dictam, pro alyssio demonstrant. Sed iuter est q; alysson quinis per interualla folijs ostendens, crucialem quatenus, unde nomen, & minus hirsutis. Exilius & huic semen alyssio est, minus est annuum anguloso caule. Flos alyssio candidus, cruciati uero luteus. Cæterum impudentius falluntur, qui alysson pro ea capiunt, quæ liliago siue liliaca & Martegonia rustice uocatur, folio quadatenus & flore lilij purpureo.

A T R A C T Y L I S.

DXXXIII.

A Tractylis aculeata est, sed & acanacea, hoc est & conceptu & floris sede, aut etiam semine fructuq; spinoso: laboratibus Græcis uno uerbo tres affectus & qualitates includere: idem erat quod acotna, siue acarna, nisi candidior esset, & nisi decerpta, cuteq; adhibita sanguineum succum funderet. Qua de causa Theophrasto phonos, & androsæmon quoq; uocatur ab Aëtio, odore grauis, pestemq; denuntians, sero maturefcēte semine, nec ante autumnum: q; hoc de omnibus spinosis dici potest. Acorne spina pro folio, ut Theophrastus inquit, cneco urbano similis, colore tantum rubro, pingui succo. Atractylis cnecum & syluestre. De satiuo dicitur in mentione sua. Syluestre iterum secatur, una mitior & satiuo similior: caule rectiore ac rigido exilis: itaq; pro colu antiquæ mulieres utebantur, ex eoq; hanc proprie atractylida nominabant, semine candido, grandi, amaro. Altera hirsutior, corosiore caule quasi fonchi, & qui penē humi serpat, semine minuto, amaro, frequēti, piloso.

A S C L E P I A S.

DXXXIII.

P O L Y C N E M O N. DXXXV.
Polycnemum & cunila bubulæ, similis appingit: odoratis corymbis, acri & dulci odore.

C L I N O P O D I O N.

DXXXVI.

C Linopodium non desunt quibus herba orbiculata uulgo dicta steryllo similis, etiam si non sit

non serpiat aut eadem, aut propinqua esse uideatur: quoniam orbiculato florum ambitu à Plinio tradatur. Dubitationem facit Dioscoridis adiectio, dicentis ex intervallo marubij similitudine flores in ea cerni: quod quidem in ea, quæ orbiculata dicitur, non est: sed continua florum series subalbertium, acinis in summo remis quaternis uel, radice fibris multiplici.

LEONTOPETALON.

DXXXVII.

Leontopetalon radice grandi uocatur & dorypetron à Plinio.

TEUCRION.

DXXXVIII.

414 **T**eucrion hoc, ut puto, & ramis hyfopi describit à Plinio: furculosa, folio fabæ. Colligi florentem adhuc iubent, adeo florere non dubitant, maximeq; ex Cilicijs & Pifidijs montibus commendat. Dicitur eadem Teucria. Quidam & aliam Teucrion uocant, de qua in hemionitide scribendum nobis est.

CHAMAEDRYS.

DXXXIX.

415 **C**hamædrys quæ & serrata dicitur, quæ ab ea feram inuentam putent, folia habet magnitudinis mentæ. Fit & uinum ex ea medicis.

LEUCAS.

DXL.

Leucas eadem fortasse fuerit cum leuce ut Plinius uerba usurpem: Verum leucadis, inquit, speciem auctores non tradunt. De leuce uero: Mercuriali herbæ similem dicunt, nomenq; ex causa accepisse, per medium foliū candida transcurrente linea: quare mesoleucon quidā uocant. Leuce dicitur & ipsa radix armoracia, itemq; androsaces, Est & arboris nomen leuce, hoc est albae populi.

LYCHNIS CORONARIA.

DXLI.

416 **L**ychnis æstate floret. Lucernulam Theodoros conuertit. Plinius quoddā loco flammeæ cognominat, alibi rosam Græcam. Non nisi in humidis locis provenit, nunq; excedens quinque folia, uiolæ magnitudine, odore nullo. Et hæc ab altera Græcula uocata differt, de qua diximus inter rosas. Differt & à lychnitide, de qua in phlomidibus. Amerias rhizoto mælychnin & Veneris labro natam putauit, cum à Vulcano compressa lauit se: præstantissimamq; haberi in insulis Cypro, Lemno, Strongyle, Herice, Cytheris. Lychnin hanc & taurion dicit scribunt: alia tamen est quæ taura uulgo nominatur, siue tora, flore cœruleo, folio rotundo, radice polypodij hirsuta, & uermis nigri effigie. Venenosa herba: cui per antipathiam natura alia occurrit herba, antitaura & antitora cognomine, folio rotundo.

LYCHNIS RVSTICA.

DXLII.

Lychnidis syluestris radicem Asiāni bolitem uocant. Hanc à nostris accipitrum pedē appellari scribit Dioscorides: quanq; accipitrus pes apud nostrum uulgo ferit, quæ corneola quoq; dicitur, folio falicis fere pusillo, flore subulneo, cum filijs ciceri similibus, & in ipsi semen inficere capillos dicitur, colore rubro. Qualis autem sit pes milui, siue pes miluinus, dicta Columellæ inter herbas, quæ in usum colligi & reponi oportet, ipse non explicauit.

LILIVM.

DXLIII.

417 **L**ilium Græci crinon: sed fruticem eius crinonā quasi liliariū, ut uiolarium & rosarium appellant: nam lilieta, roseta, uioletta aliud sunt, ut constat. Lilium ē lunonis lacte natum Græci perhibent, resperſa terra, dum Hercule dormientis uberiſus admoto, mox poſt ſuctum digreſſo, late fluxit:

ob id lilium à nostris lunonia rosa dictum uideri potest. Philinus à quibusdā non uocari, quod sit lilium, existimat. Ambrosiam Cotinchi, Nicander & Aphrodites charma, hoc est quasi Veneris uolupiam cognominari à quibusdā cecinit. In Co insula ex Alexandri statua enatam in capite Ambrosiam Carystius, quæ nihil aliud sit q̃ lilium, memoria proditum reliquit. Nascitur & lachryma sua lilium inarescente cum defluxit uelut olusarum. Lilij quadruplex genus in Theophrasto: primi flos uere cum uiola sæpe alba, paulo uel postea erumpit: hoc ab eo proprie crinon, hoc est lilium uocatur. Alter genus liriū appellat, uere quidē omnino florens, uerum serius cum Narcisso: forteq; hoc sit quod à Plinio lilium transmaria nuncupari est. Tertium æstate floret, & cerinthum priuatim uocari putō: q̃q; alias res cerinthus significat, ut inferius liquebit. Quartū genus quod item liriū Græci nominant, autumno floret, emicatq; primis imbrisbus. Est & rubens lilium differens, ut arbitror, à purpureo, uisum à nobis Patauī in Fœlicis herito. Probatissimum in Antiochia & Laodicea Syriæ, mox Phaselide, quartū locum obtinente quod in Italia nascitur. Hoc genus proprie crinon à Græcis uocari, & florem eius cynorhodon, autor est Plinius. Hoc & Hippocrates acceperit cum rubentia cynorhoda fœminarū purgationibus commendat in uino. Lilia purpurea & arte sunt, maceratis in fece uini scapis, anteq̃ serantur mense Martio & in scrobe circumfusa eadem feces: in quem usum scapos arecentes colligunt Iulio mense, lilia in fumo suspendentes. Caule gemino purpurea uisuntur aliquando, carnosiore tamen radice, maiorisq; bulbi, calix herbaceus. Post ætūrum & æquinoctium autumnī florent purpurea: quorum genus unum uocant Narcissum: cui uidelicet in radice sunt folia. Purpureis, calices, ut diximus herbacei, cætera eadem quæ candidis. Albo nihil est fecundius, una radice quinquagenos sæpe nutriendos bulbos. Lilium rosæ nobilitate proximum. Ideoq; lunonis rosa dicitur. Nulli florum proceritas maior, interim cubitos trium, languido semper collo, & oneri suo impar: candor eximius, folijs eius foris striatis, & ab angustijs in latitudine paulatim relaxantibus calathi effigie, resupinis per ambitum labris, tenuiq; filo & semine, stantibus in medio croceis: ita odor colorq; duplex alius calicis, alius staminis. Differentia angusta. Raro duplex caulis in lilio. Singulis caulibus lilia modo singula, modo plura suntinentur: quod & rarius est. Pandit se uel detractū parenti, etiam si tristius & exilius. Lilio simile in Aegypti palustribus gignitur, sed folijs copiosis, colore admodū uirentibus dispersis, & quasi uno utroq; conditis ad mulierū profluuiā & fracturas, medicis quæsitum. Cerinthus de qua scribere distulimus & rhitacem, siue ut Aristoteles crithacem significat, quæ & sandaracha appellatur, & à Dioscori de cerathamoli bro quinto, ex arboris succo, gummi modo genita, & uerno rore: unde uernignis quoq; uulgo nomen. De hac & in propole non nihil diximus. Africi statu minor, austri nigrior, aquilonibus melior & rubens. Plurimū in Græcis nucibus apud cibo aptissimā dū operantur: qui sæpe inuenitur in fauos: inanitatibus sepositus, amari saporis, & humore plenus. Menecrates, sed nemo præter eum, ut inquit Plinius, auctor est, erithacem aut cerinthū florem esse futurū mellatis indicium. Est & cerinthe quæ uocatur herba, propter

apes ferēda, folio candido, incuruo, cubitalis, capite concauo, mellis succū habente: cuius gramē Vergilius esse dixit ignobile: quæ nominū uicinitas fortasse Menecrateo fefellit: nam & Aristoteles cerinthi florem ad hunc uisum citat in libro de animalibus: quæ in eo nō cerinthus, sed mēdofo scribitur calythrū.

BALLOTE.

Ballote fruticosa est herba nec uideo qui possum tueri Plinij, qui ait Græci porri nigrū uocant. Et infra: Ballote, inquit, folijs est porri maioribus nigrioribus. At Græci nō porrum nigrum, sed marubij nigrum ballotem sine ulla controuersia cognomināt. Nec folia ei sunt portacea, sed marubij & citraginis. Deceptum affinitate nominū constat, prason melan pro prasion legentē. Est autē prason porrum, prasion marubium. Idem error à Plinio committitur in herba stachys.

MELISSOPHYLLON. DXLV.

Melissophyllon siue melinon, apiastrū ab Higinio uocari cœpit, eruditissimo aliqui uidero, sed quē omnes hac in parte damnent: & quod magis mirere, sequatur tamen: nam & Dioscorides & Varro ita eam uocant. In coronamenta folio & hac uenit. Adeo aut nullo magis flore apes gaudent: ut si perungatur aluearia eo, non fugiant & in copia eius examina facillime contineantur. Citraginē à nostris uocari & hanc Dioscorides affū mat, ab odoris similitudine. Palladius uero quæ recte nescio melissophyllon aliud à citragine, siue quod idem est, citre agine uidetur intellexisse, in mentione apum.

MARRUBIUM. DXLVI.

Marrubium duplex, folio herbaceo & incisuris altioribus serrato, unguetarijs ut Theophrastus ait, quæ sitio ad quædam: hoc & candidū appellauerim. Alterum folio rotundius, uehemēter squalido ut salua & obscuris serrato, quod quidem ego, aut ballotem ipsam de qua diximus, aut ei ualde similem interpretor: nam & medicinæ congruunt in Plinio.

STACHYS. DXLVII.

Stachys folijs colore in luteū inclinātē, nec porri, ut Plinio placet, sed ut Dioscoridi, quod & nos uidimus, marubij similibus: quod & in ballotem idem autor peccauit. Vidim⁹ eam Romanæ ubi & nauiculam & alij coronatam herbam uocant.

PHYLLITIS. DXLVIII.

Aliud uidetur genus phyllitis esse, quæ phyllanthion. Est aut phyllanthion cognomēto dyti con apud Democritū, ad purpurā tingendā satis celebre, nec præterea quale id sit monstratur. In Theophrasto ac Plinio legitur & phyllanthes herba inter spinosas, sed mitior aculeis, & ab radice tantum foliata.

PHALANGION. DXLIX.

Phalangion & leucanthemon & leucacantham uocant. Flos lilio rubro similis.

TRIFOLIUM. DL.

Trifolium tribus generibus. Minyanthes, siue asphaktion, siue asphaltis ut Archigenes, maiore folio, quo utuntur coronari, atque acuto, oxytriphyllo cognomine: tertij ex omnibus minutissimum. Herba optima in prato trifolij est. Prælagia rempestacū habet: in horrescit enim, & subrigitur cōtra eas. Sophocles poeta ueneratū id existimat. Serpentes in trifolio nunquā spectantur. Columella trifolij

simoniamū & acutū quoque dici hoc tradit, fragosis locis inueniri, longis hirsutis, folijs uirere, caulemque robustiorem facere, quæ trifolium pratense.

POLIUM. DLI.

Polium carnosum, ut alia multa, folio, uestibus interpositū, arceat animalij nocentia. Culices ab eo caprisi modo generari Theophrastus scribit. Herba inclyta Hesiody & Musæi laudibus, ad oia uilem prædantiū: & ad samā quoque dignitatis perungi, tractari, colij iubentij. Folia eius mane candida, meridie purpurea, sole occidente cœrulea spectant: quod quidē à Dioscoride tripolij floribus ascribit. Theophrastus certe modo poliij, modo tripolij eandem uocat ut herba mēdofo: à tripolio differre quidam negarunt. Folia poliij canis hominis similia, à ra dice protinus, nunquā palmo altiora Plinius existimat. Quidā folia thymi reddunt: nisi & molliora sunt, & latiore canitie. Nulla magis herba cōuenit medicamento quod alexipharmacum uocant, in quod minor ut Galenus ait, utimur.

SCORDION. DLI.

Scordion item scordotis Mithridati ascripta est: cuius depictam manu Cræteas medicus uidit, magnitudine cubitali, ramosam, folijs lanuginosis. Reperitur in Ponto, campis humidis, pinguibus. Est & alterius generis latioribus folijs, mentastromis. Alia est à Mithridate similiter inuenta, quā Mithridation uocant. Huic folia, inquit Plinius, duo à radice, acantho similia: caulis inter utraq; sustinens roseum florem. Hanc ipsam putō esse quā idem Plinius chamæropa uocat libro sexto & uigesimo ijs uerbis: Eisdem, inquit, effectus habet lateris doloribus chamærops, myrtis circa caulem geminis folijs, capitibus Crecule rosæ.

BECHION. DLI.

Bechion, siue bechicon duo habet genera Syluestris ubi nascitur, subese aquas credūt: & hoc habent signū aequilegi. Describitur hanc Plinius aliter quæ Dioscorides, folia eius trā dēdo su perne pallida, subalbida, à terra sine caule, sine flore, sine semine. Altera à quibusdā salua dicitur, similis uerbasco. Hanc à Dioscoride uerbascum syluestre dici putō, ita scribente: Habetur, inquit, & uerbasculū syluestre altū, uirgis arboreis, folio saluæ, orbibus uirgis cingentibus, ut marubij, floribus luteis, fulgore auri. Quidā priorem arcion, & alio nomine chamæleucem putāt. Est aut chamæleuce, quā nostri farfugij uocant, folio populi, sed ampliori, nascens iuxta fluuios, unde populus dicta sit à nostris. Hanc & farfariā uocari Dioscorides testis est, à fluuiio farfasse Farfaro, quæ Vergili⁹ Fabarim appellat, in Sabinis. Plaut⁹: Disipabo, inquit, te ut folia farfari. Itemq; in Pœnulo: Prosternebam, inquit, eos ut folia farfari.

ARTEMISIA. DLI.

Artemisia & lachanō basilicon, hoc est olusregiū nōnulli uocāt. Dictā putant ab Artemisia uxore Maui folij, quæ sibi hanc herbā adoptauerit, cū antea parthenis uocaretur. Sūt q ab Artemide cognominatā putēt: quā priuatim medicatæ feminarū malis, quibus Artemis, hoc est Diana prestat. Secundo generi teneritudinem tribuit, non nisi in maritimis nascenti. Tertio minima folia, florenti cum uia maturefcit: quod quidam botryon, alij ambrosiam uocant tradūt, qualis in Cappadocia proveniat.

ARTE

ARTEMISIA ALIA. DLV.

IN quibuldam exemplaribus Artemisiam hanc multis nominibus inuenias, toxiteiam, Ephesi-
am, parthenicon, hypolysson, anaetorion, sozu-
san, iam, leucophrya, prophete sanguine hominis,
Romani ualentiam, nonnulli persepollentē, alij her-
bam regiam, Galli ponem, Dacizonusten.

AMBROSIA. DLVI.

AMBROSIA uagij herba nominis, & circa alias
quog; fluctuans. Athenienses in dedicatione
Iouis Ctesii ambrosiam in cado ferendā iube-
bant: non herbam intelligentes eo nomine, sed ut A-
thenæus inquit, fruges omniugas, & oleū, & latices.

BOTRYS. DLVII.

OTRYN Cappadoces & ambrosiam uocant,
alij Artemisiam.

GERANION. DLVIII.

GERANION & myrtidon uocatur genus primū.
Geranion uera creditur à quibulda, sed & secū-
dum utiq;, si descriptionem Græcorū sequare,
non Latinoꝝ, ut mox docemus.

ALTERA GERANION. DLVIII.

GERANION secundū medicis inutile, aliter à græ-
cis, aliter à Latinis describitur. Dioscorides &
omnino Græci, folijs paulo candidioribus q̃
maluæ, ramofum ex intervalis. Hanc ego autem-
dem, aut omnino similem esse uideo cum ea, quam
galliæ transalpinæ uulneribus & fistulis in potum
commendant, & herbam Robertsoniam cognomi-
nāt, coliculis rubentibus, flore paruo subpurpureoq;,
ac cæteris notis omnibus, quæ hoc loco à Dioscori-
de geranio redduntur: etiamsi ab eo medicinæ alie-
na existimetur. Quid enim prohibet ignoratas eius
uires fuisse olim? Nostri, ut inquit Plinius, geranion
ostendunt cicutæ folijs minutioribus, & caule breui
us rotundo, saporis & odoris iocundi: uerū hæc pro
prie geranion non est, sed myrthis, de qua post age-
mus: confusione orta quod geranion à quibuldam
myrthis etiam dicatur: unde natum & illud sit, ut ge-
ranion in Latino cicutaria nomē habeat: cum alio-
qui cicutaria proprie myrthis esse uideatur.

GNAPHALION. DLX.

GNAPHALION alij chamæzelon uocant, gnapha-
lion porro dicitur quasi herba fullonia, siue to-
menticia: quemadmodū & pikis quidam gna-
pheus hoc est fullo dictus est: quoniam omnes maculas
decoctum eius eluat. Hanc puto esse quæ ab Alcæo
poëta gnaphos appellatur, aut eam quæ hippophae-
æ nomen habet, nam & illa fullonibus est propria.
Est apud Aristotelem & aus dicta gnaphalus, quam
miror à Theodoro prætermisissā, immo uero cū al-
tera quæ uocatur helea, confusam ab ipso. Tomentū
à nostris dici quidā purant gnaphalion, lomentum
certe in Plinij codicibus impressis legitur, tomentū
in scriptis manu: qui tamē non lomentū dici, sed pro
lomento esse scribit, quod & Dioscorides quoq; affir-
mat. Etenim creta quæ fullones in albandis & polien-
dis uestibus utuntur, lomentū à nostris, gnaphalion
& gnaphalis Græce dicitur, ut in ceruleo notauim⁹
ex Plinij sententia. Sed & fabacea farina lomentum
est, quod Aëtius fabam nominat quādoq;. Ego comē
tum potius q̃ lomentū dixerim hoc loco: ut tamen
sciamus gnaphalion utrumq; uideri significare, tam
lomentū q̃ tomentum. Adducor eo q̃ Dioscorides
centunculum uocari hanc Romæ prodāt, Est autē

centonibus cum tomento maxima cognatio: nam
& folia dictamni q̃ mollia esse uideantur, tomentitia,
& lanæ dicuntur à Dioscoride, hoc est gnaphalide.
Sed & pars cucurbitæ interior quæ semen comple-
ctitur, ab Aëtio gnaphalides esse dicitur, ob candore-
m cum mollitia.

TYPHA.

DLXI.

DIFFERRE typham à tiphā, quæ frumenti genū
est, & per litteram iota scribitur, existimo: sine
geniculis scirpi modo nascens, radicibus mul-
tis, ut triticum hordeumq;, folliculo multiplici, cul-
mo simplici: leuissima frumentorū, solo etiam gracili
facile proueniens, tritico per similes ut zea. Pistam se-
runt, qui mutari uolunt in triticum: id q̃ anno demū
tertio procedit. Theophrastus sine folio gigni tiphē
uocatam prodidit, Orchomenium circalacum, parte
radici proxima, eū præcipue pueris tenera: idem
an diuersum genus faciat cum prædictis, æstimandū
relinquo.

CIRCAEA.

DLXII.

CIRCAEAM à Circe dictam nonnulli uerisimile pu-
tant. Quæstum est autem à nobis, quid esset
apud Columellam cirrea: nūquid pro Circea
deprauatus esset locus? respondi, non cirream, sed
cymam legendum.

OENANTHE.

DLXIII.

OENANTHE à Theodoro uiciflora dicitur: post
Narcissum uere floret. Plurimū durat, si diuul-
sa crebro prohibeatur semetescere. Flos ei
candidus in racemis ut labrusca, odore germinantis
uuae, unde nomen. Nascitur locis tepidis, obicitur se-
mine. Habetur & altera oenanthe inter uites dicenda.

CONYZA.

DLXIII.

CONYZA, quæ à nostris cunilago dicitur, & Plin-
io cunila quandoq; libro decimo, & à Theo-
doro pulicaris, quia pulices necat: folio coros-
nat & maior & minor appellata. Maior dicitur esse
macula, folio aspero, pinguiore, q̃ minoris & imbric-
cato. Torosiore caule magisq; ramoso: radice ligno-
sa, quæ à quibuldam ut herba quoq; ipsa, libanotis
dicitur autore Plinio. Manipulo eius abiecto, omnes
etiam à tota domo blatte cōueniunt ad eam. Vtrūq;
genus serotinū, ut quod post arcturum germen flo-
remq; mittat. In summa, cunilaginis appellatiōe qua
tuor herbæ veniunt, macula & fecmina: & quæ ter-
tio loco ponitur scēdissimi inter omnes odoris. Quar-
tam reddit Plinius, quā appellat fatium serpillo si-
milem & cunilagine montana factam. Est & quinta
eius species Hippocrati, ut dicitur paulo post. Cunila
go dicitur & ipsum ligusticum ab aliquibus, sed fal-
so. At cunilæ tria sunt genera siue nomina: capitata
& nostratē, quæ satureia sit, uocamus: gallinacē,
quæ origanum Heracleoticum: bubulam, quæ quē-
admodum à Græcis dicitur, aliud non comperi q̃
eam Plinius pro origano accipere multis locis uide-
tur, in qua significatiōe uocabulo eo & nos uti sum⁹.

CONYZA MINOR. DLXV.

CONYZA minor eadem fecmina. Hippocrati cu-
nilago semper mollis uocatur. Folia huius tri-
ta mellis odorem habent, digitis tactu cohæ-
rentibus. Hanc Dioscorides libanotidem appellat, cū
Plinius maculam ita nōminet. Pilosiora minori folia
& rami, qui & aculeati sunt: flos squalidior, odore a-
criore, qui tamen grauior sit masculus.

CONYZAE TERTIVM GENVS DLXVI.

i Hippo-

Hippocrates cunilagine, siue conyzam præter supradictas aliam describit, apio crispo similem, in maritimis fabulosisq; nascentem, odoris teterrimi & maxime fastidendi: quâ cû melle atque uino forminare locis, quæ secuti nō recipiāt, admodum ueri præcipit, libro de muliebribus causis secundo.

HEMEROCALES. DLXVII.

Hemerocales elium à Theodorodicitur, quod in Dioscoridis exemplaribus deprauatis elium marinum dicit à nostris eum florem, legisset. Ego lilium marinū non elium in Dioscoride legendū arbitror: nam & Græce crinon à quibusdam, & à nostris lilium idem auctor uocari tradit. Coronamenti folio tantum dicata hæc est. Pallidum hoc è uiridi & molle habet, radicem odoratam. Seritur semine. Antiquus grammaticus Theodorus cognomine Parasges, hemerocales Athenis dici prodictum non florem, sed uellus aut lemniscum puniceum & uersicolore, quo in sacris utebantur. Dioscorides & hanc & lilium à ueteribus crinanthemon uocari tradit. Hippocrates quoque crinanthemon duplex haberi significat, cum alterum inquit esse in adibus nostris proueniens,

LEUCOION. DLXVIII.

Leucoion & si candidam uiolam ipso nomine significat, tamen & pro lutea, & cœrulea, & purpurea sæpe capitur: hinc apud Columellam cā dida leucoia, quasi & nigra quædam sint. Hippocrates certe: Nigra inquit, leucoia querantur. Paulus Iton inquit oleum hoc est uioleaceum, modo ex purpureis, modo ex candidis, modo ex croceis confici solere uiolis. Sciendum & illud est, Dioscoridem hoc loco scribere uiolam, quæ Græce leucoion dicitur, à Romanis ligustrum quandoque nominari etiam si codices sunt, in quibus non ligustrum, sed Augustia legitur, ut fortasse Columella in hortu suo intelligat de uiola cum cecinit: Nigro commista ligistro. Nam ligustrum candidū pro cypri flore capitur. Cæterum de purpurea siue nigra, seorsum post dicitur. Cœrulea quæ sit non constat, nisi quis cyanum hanc intelligat. Est autem cyanus flos, rosam excipiens, cuius color honorem nomenq; dedit cœruleo. Cyanum amaranthus excipit. Trivialis ut quidam existimauerit flos est cyanus, in frumetario nascens agro, & hortis quoque rusticis & puellarum corollis, calice rosarum sed squarroso atq; tristi, sine odore, uerum summa colorigratia, qui & baptisecula ruribus dicitur: quoniam fecantibus & metentibus officiat, retusa in occursum eius falcem: nam & seculam ueteres dixere falcem. Florum porro prima se ostendit alba uiola, necdum exacta hyeme. Sub idem seret tempus exit & uiola cognomen totam meam, quæ phlogion uocatur: syluestris tantū ab aliquibus phlox: ut errare putem, qui phlogion eandem esse cum lutea uiola scripsere, quod quidem ex sequentibus aperitissime liquebit. Theodorus flammā uocauit, colore cōmendabili, odore nullo, semine proueniens coronis. Non est hæc autem lous flos, aut quod idem est, lousis flamma, hoc est Diosanthos, id est nequit dubitem, facit q; lous flos, licet sine odore sit, & coronarius, & obseruat semine, tamen ætate floret: non per hyemem, ut flammæa. Plinius quoque: lous inquit flos colore tantum commendatur, odor abest, sicut & illi qui à Græcis inquit phlox uocatur. Diximus & lychnin uocari quādoque

flammæam, sed inter rosas potius quæ uiolas. Aliud est apud Græcos phlogis: nam & uestis genus significat, quod nos flammæam & flammæarios opifices in Plauto uocamus, & carnem tostam, ut est apud Stratum. Violatum ergo alba & flammæa plerumque durat: sed fatiuis maxima autoritas luteolis: qui colos in nuptialibus flammæis quæritus, ritu antiquissimo & feminis totus concessus traditur: ideoque fortasse non numeratur inter principales, hoc est communis maribus & feminis: quoniam coloribus societas principatum dabat. Genera lutearum Tusculana, & quæ appellant marina, folio aliquanto latiore, sed minus odorato, in totum uero sine odore, ac minuto folio. Calathiana munus autumnii, cæteræ ueris. Proxima ei caltha est, concolori amplitudine: uincit numero foliorum marinam, quoniam folia non excedentem. Eadem odore superatur: est enim grauius caltha, non leuior ei, quam scopam regiam appellant, quanquam folia eius oleant non flos, ut inquit Plinius: quod autem genus ei sit inter uiolas scopam regiam, partum liquet. Dioscorides scopam regiam naporum generi connumerat. Plinius alio loco fiderit, quæ latissimo folio sit, scopam regiam à nostris dici uult. Viola odor è longinquo suauior: propinquus hebetatur. Vita longissima candidæ triennium: ab eo tempore degenerat & minuitur, floresque assidue candidiores affert. Minor uis est recentibus: ideoque aridis utitur post annum. Honor uiolis apud antiquos post rosam & lilium. Violam idcirco dictam ion Græci putant, quod cum lo in uicam à loue conuersa esset, terra florem illum pabulo bouis eius fuderit. Nostris quoque uiolam quasi uitulam, imitatione Græca uideri possunt appellasse.

CRATÆGONOS. DLXIX.

Est & alia cratægon, siue cratægonos siue cratægonos, quæ thelygonos uocatur: differentia intelligitur lenitate gustus. Hippocrates polycriton appellat, quod am cratægonon cæteri. Plinius cratægonon spicæ tritici similem demonstrat, Dioscorides melampyro, Theophrastus lino tritico, id est αἰὲς πυρρός, fortasse hoc intelligens quod Plinius culmum siue spicam tritici. Theodorus nescio quid diligenter limi modo ruffina uertit, quia πυρρὸν non πυρρὸν in Theophrasto legitur. In Theophrasto ab orbis etiam genus est cratægos siue cratægona, quam Italia uocata quifolium: neque magna ualde, neque crassa, ligno robusto, uersicolore, flauo, cortice leuius mespilo: folijs ite mespili, hoc est promissis, uerū latitudinem ac longitudinem maioribus, nec ad eundem modum serratis, fructu plurimū rotundo, q; maturefcēs ficcatur, nigrescitq; gustu & succo mespili: fereq; mespilus syluestris fuerit, ut Theophrastus uerbius utar. Aquifolium porro siue aquifolium ipse nihil aliud ueteribus fuisse uideo quæ illicem, flex porro duo habet genera, minus & prolixius.

PHYLLON. DLXX.

Phyllon radice parua. Differt ab hac phyllitis, de qua diximus. Differt & phyllandron siue ut alij scribunt, phellandron: de quo nihil aliud proditum inuenio, quæm q; in paludibus nascitur, folio apij, quodque semen eius propter calculos & incommoda uesicæ bibitur. Ab hoc sunt qui phellandron eandem esse cum helioselino, id est apio palustri censent. Herbæ quæ à Plinio silaus appellari tradit in glareosis ac perennibus riuis, apij folio nata, quam

quam ad uesicæ incommoda coquendam præcipit: sunt qui pro phellandrio eleoselinisq; accipi putent. De hoc in similia diximus & lauere, nō silium scribi posse, cum inibi tū in Apologia quoq; nostra ostendimus.

ORCHIS.

DLXXI.

Orchis qui priuatim cynosorchis, id est testiculus canis dicitur, inueniri solet ferē in uincis, folijs ternis, paruis, semipedalib, radice ad formam testium hominis, alternis annis intumescēte, acrescente: atq; hic mas est & femina eiusdem nominis, quæ distinguitur internodijs & ramulose frutice, radice fascini. Nascit ferē iuxta mare cynosorchis & satyrion uocat min⁹ proprie: aliud enim gen⁹ est quod proprie satyrion appellant, ut paulopost monstrabitur. Est & orchis cognomine Serapias, de qua modo prodendum.

ORCHIS SERAPIAS.

DLXXII.

Orchis Serapias quam triorchin cognominat Aëtius, folium habet scillæ, ut Theophrastus & Plinius testantur, non silphij siue laseris, ut Theodorus cōuertit, silphiodes pro scilloides in eo legens: enim silphio folium est apij, non scillaceum aut portaceum ut Serapiadi. Spinosis huic herbæ caulibus, & apio id est raphano syluestri, non ut Theodorus inquit piro similis.

SATYRION.

DLXXIII.

Satyrj primū genus caule leui, radice gemina hoc est duplici ordine à Plinio describitur.

ALTERVM SATYRIVM.

DLXXIII.

Satyrion hoc notum pastoribus, quoniam arietibus & hircis segnioribus in potu datur. Et in Samaria equis ob assiduum laborem pigrioribus in coitu, quod uitium profedamum uocat. In totum quidē Græci concitationē hanc uolētes significari, satyrion et satyrismum & satyrasin appellat: ideo & aristolochiæ genus unū, qd polymrhizon cognominat, satyrion ex facto uocari censeo. Herbam quoq; illam satyrion Indam appellauerunt Theophrasto allatam ex India, cuius contactu libidinem durare septuagesimo coitu meminerit, nec speciem eius aut nomen aliud reddiderit. Habēt hodieq; Syri herbam simili effectu, bucheidentis nominat & Indicam satyrion, propterea cum ea cuius mentionem Theophrastus fecit se diximus, eandem, radice candida & dura, commēdatore quo crassior & rugosior, & albiore, podagris utili. Est & alia satyrismi significatio Hippocrati, pro tuberculis prælongis, qualia satyrorum pinguntur sub ipsas aures, quæ à quibusdam & theres & pheres appellantur, ut inquit galenus.

ORMINON.

DLXXV.

Orminon amarum nigrumq; nec cumino penitus ab simile, dodrantali Plinio altitudine: medicamentis annumerandum potius quam inter fruges, dictum ita, quia Venerem extimulet. Seritur cū sesama & irione, omninoq; cum æstiuis, hoc est cum ijs q; æstate ante uergiliatū exortū feruntur. Est & orminū siue ormenion, et ormenion, sed illud corruerit intelligitur. Plinius huic foliū porri tradidit, ceteri marubio simile fecerit: qui error fatalis ferē Plinio est, ut in ballote & flachye.

HEDYSARON.

DLXXVI.

Hedysaron quoniam pelecina à Græcis dicitur, à nostris securidaca nomē habuit, fruticosa cauliculis, semen siliquis ternis quaternisq;

quale gich nouimus amarum. Nascitur in segetibus. Hac lentem necari Plinius & Græcis aliqui recetioribus existimant. Theophrastus aphacen. Lētem uero ab aparina quæ lappa sit, irregulari cōplexu scribit: ita sæpe fallit uocabuli similitudo: nam Græci lentem phacon uocant non aphacen. Sciebant & hoc discrimen illi, quis dubitat? sed librariorum culpā, ut sæpe uero contingit, hallucinando suam fecere: qd quidem & nobis accidisse aliquibus locis hoc opere non dubitamus: hoc enim est hominem esse.

ONOSMA.

CLXXVII.

Onosma & cenoma, & onoma, & onomis, & ononis, et phloitis phlomis potius, & hypbatō uocat. Folia ei⁹ nō ad quor sed ad tres digitos lōga Plin⁹ scribit, strata i terra tria incisaq;. Quid sit Hippocrati oxosma quo lichenis tolluntur, haud comperi: nisi quis acetariam compositionem in eo uocabulo contineri censet: acetum sanē contra lichenas polere nemo dubitat.

NYMPHAEA.

DLXXVIII.

Nymphææ radix dulcis, quam & in sole siccāt. Nata fertur à nymphæ erga Herculem zelotyia, propterea q; mortua: quare Heracleon uocant aliqui. Alij rhyphalon à radice clauæ simili, laudatissima in Orchomeno & Marathone, sed & in Creta quoq; ut Theophrastus putat. Boetij manodion siue madon, ut idem Theophrastus indicat, appellant, edētes semen.

NYMPHAEA ALIA.

DLXXIX.

Nymphæa alia caput habet rosæ magnitudinis.

ANDROSACES.

DLXXX.

ASPLENON.

DLXXXI.

Asplenon folijs trientalibus, radice limosa, cauumosa sicut filicis, candida, hirsuta. Gaudet humidis. Laudatissima in Creta, ubi & reperiunt Vitruuius affirmat circa Poterum amnem, qui duas urbes Gnofon & Cortynam interlabitur, parte quæ ad Cortynam spectat, pecoribus sine lie ne inuentis, quia herbam eam roderent: ex altera parte quæ ad Gnofum est, lienem habentibus: quia ibi herba illa non appareret. Theophrastus hemionon hanc appellat. Theodorus mulam uertit, folio scolopendrij, radice multiplici, montosas petrosasq; planities amantem, delectari cibo eius mulas, & ob id datum ei nomen. Fœminas sterile scire, quæ hanc herbam in cibos sumperint, admixta mulæ ungula & corio aut semine, prout aliqui non derma, sed sperma in Theophrasto legunt. Quod aut scolopendrij folio describit eam, uidetur aliud genus quam scolopendrij, siue qd idem est asplenon haberi uoluisse Theophrastus: nisi quis ab eo scolopendrium & scolopendra sumptum intelligat.

HEMIONITIS.

DLXXXII.

Hemionitis uidetur esse quam Plinius Hermion & Teucron ab inuentore Teucro uocatū phibet, uigesimo quinto historię naturalis uolumine, natam in asperis, austero gustu, nec florem ferentem neque semen, lienibus medentem, quæ omnia & hemionitidi à Dioscoride tributa sunt. Nam quod Plinius iuncos tenues spargentem describit, Dioscorides radice multiplici & exili demonstrauit: quod ille folijs paruis, hic folijs dracuntij lunæ modo incuruis delineat, id est, *μυρροδία*: proinde q; non

i 4 folijs

folijs paruis, sed folijs curuis, in Plinio scribendū cen-
seo locum eum. Inuentam sic affirmant, cum exta su-
per eam proiecta essent, adhæsissetq; fleni, eumq; ex-
nanisset, propterea & splenion uocatam. Sues quoq;
qui radicem eius ederint, sine illo uiscere cōpertos.

ANTHYLLIS. DLXXXIII.

443 **A**nthyllis & anthyllion & anthycellion uoca-
tur. Genus eius primū in sabulosis, alterū na-
scitur in laxosis. Est & in Aegypto fructuosū
quidem anthyllion sed anthalion, uocatum a Theo-
phrasto malum anthali, magnitudine & rotunditate
mespili, sine nucleo, sine cortice, folijs cyperi: haud
procul Nilo, etiam si Plinius scribat, longius a flumi-
ne. Decoquunt ibi hæc in bryto hordaceo, uehemen-
ter iocunda & dulcia, & quæ bellioris uicem in se-
cundis mensis impleant.

ANTHEMIS. DLXXXIII.

443 **A**nthemis quæ & leucanthemis uocatur, pro-
ea quæ *χρυσάνθος* uulgo dicitur, magnis est
ab Asclepiade celebrata laudibz. Theopha-
stus anthemem & anthemion appellat, quā Diosco-
rides anthemida, & Hippocrates, ut arbitror, euan-
themem, duo genera constituens: unum eius quæ
ab radice duntaxat foliata fitalter, quæ caule tantū.
Desflorere incipit utrumq; cacuminibus, cum cæterę
ab imo incipiant flore candido, in orbem medijs her-
bacoe. Semini colos qui flori. Decidere hoc sicut &
spinosis conceptaculo inani relicto. Theodorus an-
themion pro melanthio uidetur intellexisse, ut qui
nigellam interpretatus sit. Reponunt anthemidis
flores in coronamenta, sed collecti uere. Est & salta-
tionis apud Athenæum cuiusdam popularis nomen
antheima, cum illo ioculari numero:
Vbi rosa? ubi uiola? ubi florens apium?
Vbi hæc rosa? ubi hæc uiola? ubi hoc florens apium?

PARTHENIVM. DLXXXV.

444 **P**arthenij flos odorem habet mali. Nascitur in se-
pibus matricariam dici cum multi putant. Sūt
qui cotulam appellant: nam & ipse Dioscorides
testatur ab ethrusci uocari cautam, unde cautula
deducitur, ac deinde cotula. Sed & leucanthem & ta-
mna cū Plinius hanc appellat: nisi librariorū menda
sit tamnacum pro amaraco scribentium. Nam & ama-
racus a Dioscoride uocatur: nec aliter a Galeno atq;
Paulo. Celsus apud nos pallecium & muralium ap-
pellat, ut Plinius intelligit. Ego Celsum de alia par-
thenio murali dixisse autumo, quæ non in sepibus,
sed in muris parietibusq; nascitur, ob id & parietana
uulgo nominata, ut in helxine docuimus. Est & par-
thenis pro Artemisia: q̄q; sunt qui Artemin legant, nō
parthenin, castigando protinus errore medicorum,
qui parthenion de qua modo loquimur, Artemisiā
esse uoluerunt. Apud Hippocratem quæ sit herba par-
thenion cognomento microphyllon hoc est parui-
folia, dubitatur a Galeno, qui Dioscoridem pro helxi-
ne aut etiam Mercurialis capiendū existimasse scri-
bit. Sed quid si eam pro Artemisiā secundo genere
Hippocrates intelligit, cuius minuta folia traduntur?
aut etiam pro matricaria de qua hic agitur, quæ fo-
lijs coriandri describitur?

BUPHTHALMOS. DLXXXVI.

445 **B**uphtalmos, siue buphtthalmos, siue ut Hip-
pocrates buanthemion, fruticosā caulibus, qui
& manduntur decocti. Flores huius maiores
multo acriorēs splentuntur q̄ anthemidis. Differt a

butumo frutice palustri, Orchoemenio lacu plurimo,
caule inoffensissimo, peculiari quodā leuore, folio
harundinis angulari, fructu nigro, mali amplitudi-
ne, sexu duplici. Mas fecundus, femina uictium ad
nexus utili. Pars ab radice tenera manditur, puerorū
cibo grata. Buphtthalmos uero eandem esse cum
chrysanthemō uocata puto, de qua sequenti libro
Dioscorides hæc ipsa repetit. Facitq; qd Alcan poë-
ta chalcam siue cachelan, hoc est buphtthalmos, ita
nominat, ut aureum torquem ex huius constare flo-
ribus ostēdat, *χρυσόφορος ἢ χρυσόδοξον πτόλαιον, ὑδράχνην*.
Nicolaus Damascenus lacum sub alpes esse scribit,
multorū stadiorū circuitu, ubi toto ferē anno florea
suauissimi odoris & coloris præstantissimi per ambi-
tum uisuntur similes buphtthalmo. Non uidetur hæc
buphtthalmos esse, quā rustici bouis oculum & cotu-
lam cognomento foridam ab odore appellant:
pratēsem herbā, q̄ eius cādi flores sunt, bupht-
almi uero lutei, ut Dioscorides & alij testantur: edi-
am si cætero satis eum ea congruant. Est & alia bu-
phtthalmos de qua in cucumere syluestri dixim⁹. Bu-
phtalmō Dioscorides & æluro dici meminit. Ego &
ælorion uocari quandam stirpem lego apud Photio-
nem: diuersa nec ne sit, haud constat. Potrō æluros
animal est, quod nos selem appellamus, uulgo ut
quidam interpretantur, caturs: quod & ægluros q̄q;
dicitur a poëtis. Inuenio & chalcam uocari purpurā,
& herbæ genus quo purpura tingitur, apud Photio-
nem grammaticum.

PAEONIA. DLXXXVII.

Vestitissima inuenta Pæonia est, auctoris igno-
men retinet. Theodorus apud nos dulcissimā
uocat, quia glycyfiden Græci quorū dice-
rent. Nascitur opacis syluosisq; montibus, caule pal-
morum dūm. Inuenio & digitos quatuor ab eodē
Plinio descriptam, cute lauri subrutila, agnascen-
tibus duobus aut tribus, ferente in cacumine uelut a-
mygdalis quatuor aut quinque, folio nucis pinguiore
rotundiorēq; ac minore. Inhærent & radicibus ma-
ris glandulæ, sed plures q̄ octo: quoniam non una radi-
ce nituntur. Femine folia myrrham redolent, & de-
siora sunt. Radices fructumq; legi noctibus præci-
piunt: quia picus Martius interdiu facere dicatur im-
petum in oculos, alioqui effodientibus radicē Pæo-
niæ sedes procidit, si Theophrasto credimus. Confi-
ctum id ad uenditationē rei Plinius existimat. Hanc
& ephialtion uocant antiqui, utpote contra sup-
pressiones incuborum faunorumq; nocturnas ualē-
tem. Sekucus glycyfiden pomi genus, specie fici tra-
dit, quod mulieres maxime deuiant, infaturationis
metu: ita enim *μυρσάνθημιν* interpretor. Glycyfida por-
ro dicta est Pæonia, q̄ acinos malipunci similes ha-
bere uideatur: nam sidan malum punicum a poëtis
uocari supra docuimus.

LITHOSPERMON. DLXXXVIII.

Lithospermon herba quincūcialis ferē, folijs du-
plo maioribus q̄ rutæ. Gerit iuxta folia singu-
la ueluti barbulas: & in eorum cacuminibus
lapillos uelut aurificum arte inter folia eius altemos,
candore & rotunditate margaritarū: ipsi quā pedicu-
lis adhæreant, cauernulas habent: & intus semen. Na-
scitur & in Italia, sed laudatissimū in Creta. Iacere æ-
que humi serpere auctores tradunt. Plinius uulgam,
non hærentem uidisse meminit. Hanc a Theopha-
sto Diospyron quasi Iouis triticum appellatam arbi-
tror, ut

tror, ut in ceraso cōmonui. Lithospermon & atonychon nonnulli dixerunt. Est & alia lithospermon nihil à supradicta differens, nisi magnitudine, ut quæ non serpat, sed arbuti modo fructuet.

PHALARIS.

DLXXXIX

Phalaris caulem habet longū in summo flore, q̄ spicaceus à nobis uisus est, inclinatum: semen si mile sēsām.

ERYTHRODANVM.

DXC.

Erythrodanū & erythrodanum dicitur, folium hederæ sed rotundius: serpit humi ut gramen, locis umbrosis cōspicienda, quibus per geniculum caulū folijs. Laudatissima italica, & maxime suburbana, & oēs penè provincie scaten eam: radice amara & anchusæ modo rubicida, uelleribus tingedis & pellibus perficiendis utili, præferim italica, ut Democrito placuisse dicunt: ob id à quibusdā appellata byssos. Cæteræ byssos proprie lini genus est, de quo Plinius: Honor, inquit, proximus byssino, mulier, maxime delicijs circa Elin in Achaia genito, quaternis denarijs stipula eius permutata quondā, ut auri. Pausanias: Byssos, inquit, non alia Græciæ parte nascitur q̄ in Elide, tanta tenuitate, ut ne Iudaicæ quidē byssos cedat: etia nisi colore minus ruffet, q̄ Iudaica. De byssos Iudaica pleni sunt sacrag literarum codices.

LONCHITIS.

DXCI.

Lonchitis non ut perlegi existimauerunt eadem est quæ xiphion & phaganion, q̄q̄ semine cuspidaceo, radicibus prælongis.

LONCHITIS TRACHEA.

DXCII.

ALTHEA.

DXCIII.

Medici althæam uocando, ut Theophrastus inquit, maluum syluestre intelligunt, ab excellentia effectus: à quibusdā aristalthæa dicitur, anaden dromalache à Galeno: item ebificus siue bifiscus: q̄q̄ Plinius althæam ab ibisco separat, in medicina uisibilis, inquit, à pastinaca graclitate tantum distat, damnatus in cibis, & medicina duntaxat utilis, quā Græci malachen, inquit, agriam uocent, & aliqui pistolochiam. Althæa solum malua à Theophrasto redditur, sed grandius & pilosius, cauliculi molles, flosculi teus, radix alba neruosa q̄, semē malugustū quoq̄ cauū, ut malua.

ALCEA.

DXCIII.

Alcea caulibus folijs, nascitur in pingui solo nec siccō, quā & peristereon cognominat, à similitudine folijs, ut contigio. Ipsam q̄q̄ leonis caudam, quia multū pollet animal id Homero, Catullo & Plinio testibus, appellant Græci alceam. Different in eo ut quibusdā placet, q̄ herba diphtongū non habet in penultima. Dicitur & cercis cauda eius: q̄q̄ & herba quædam cercis est, & qua radij fiant textorios, unde & nomen.

CANNABIS SYLVATICA.

DXCV.

CANNABIS SATIVA.

DXCVI.

Fvnes cannabini præferuntur in siccō, ferulacei generis. Hæc herba optima Alabandica plagarum usibus præcipue. Tria ibi eius discrimina. Improbatur cortici proximū aut medullæ. Laudatissimum est & medio qd & mēsa uocant: secunda com mēdatio milares: nam quod ad proceritatem attinet, rosea agri sabini arbore altitudine æquat. Seritur à fauonio ubiq̄: quod densior eodē semē eius, cum est maturum, ab æquinoctio autumnū defringitur, & sole aut uento aut fumo siccatur. Ipsa canabis post uinde

miam carpitur, & lucubratiōibus decorata purgatur. Varro, Gellius & Palladius cannabum nō cannabim appellant: sanè canabus Græce lignum illud gracile significat, in quod pileum uicibus aut centonibus intextitur, ob id Samyrionem poetam Stratis cannabum uocabat, propter macilentiam, ut inquit Pollux.

ANAGYRIS.

DXCVII.

Anagyris odore tetto, prouerbū peperit contra eos, qui offutura sibi cōmouent. Dicitur & anagynos. Hanc sunt qui à Plauro nauteā uocari putent in Asinaria, sed autorem non habent. Nauteā porro herbā grauem esse scribit Festus, quacoriarij utantur, à nauti dictam quasi nauis eam.

CEPAEA.

DXCVIII.

Cepæa quasi hortensianā uoces, radice nigriorē q̄ portulacæ, inutili. Nascitur in litoribus arenosis, gustu amara, ut inquit Plinius, etiam si deprauata in eo lectio non monstrauimus.

ALISMA.

DXCIX.

Alismatis siue Damascentij huius folia magis laciniosa q̄ plantaginis uidentur: alioqui simili uenosa, radicibus densis. Alter gen? eiusdem in syluis nigrius, & maioribus folijs, Plinius hæc herbam uidetur quodā loco appellasse caucalin, sed mendosam in eo lectionem monstrauimus.

ONOBRYCHIS.

DC.

Onobrychis radice gracili, nascit? circa fontes: hypericon.

455

Hypericon frutex est oleraceus & tenuis, acridore, cubitali, nigro semine, cū hordeo mature scēte, ut Plinius demonstrat. Caput hoc ad uerbū in syluestri ruta superius à Dioscoride repetit.

ASCYRON.

DCII.

Ascyron & ascyroides similia inter se sunt, ut inquit Plinius, sed ascyron maiores habet ramos: ascyroides uero ferulaceos omninoq̄ rubentes. Semē utriq̄ in calculis nigri, pusilli. Comæ ascyri trita uel ut cruentata apparent.

456

ANDROSÆMON.

DCIII.

Androsæmon nō absimile hyperico est, cauliculis maioribus densioribusq̄: ac magis rubentibus, folia alba. Gignitur in uicis, fere medio autumno effoditur suspēditurq̄. Galenus: Androsæmon duplex, inquit, est: ascyron siue ascyroides, de quo supra uidelicet locuti sumus: alter? Dionysias priuatum appellatum ab aliquibus: utriq̄ par effectus.

CORIS.

DCIII.

Coris sub tamarice nasci dicitur, folijs min? rubentibus leniter aculeatū. Hippocrates coren hanc uocauit, ut Galenus inquit, argumēto se minis, q̄ pupulæ similitudinē præsentat: q̄q̄ sunt recentiores, qui pupulam siue pupillā dicendo, herbā à Dioscoride sumā appellatam significant.

457

CHAMÆPITYS.

DCV.

Chamæpitys & aiuga siue abiga dicitur à Latinis, propter abortus. Inuenio & ibigam uocari: quod nomē fere seruant hodieq̄ illyrici, nostrū uulgus uiam: est ubi appelles, ut inquit Plinius, etiam topi terræ, tria eius discrimina reddendo: unū sesquipedalibus furculis, flore pinus & odore: alterū breuius & incuruū, de tertio dicemus paulo post suam mentione. Recentiores alia chamæpityn nouerunt, eiusdem, ut ipsi arbitrantur, effectus, folio saluæ timoso,

COROLLARIJ,

vimoso, angustiore tantum, & ad radicem maiore, flore subcandido ac luteo, & folliculis scissis, id est, cristæ gallinacæ similibus, sapore pinus, in maritimis montibus nascens, nigro semine, quæ non serpit. Chamæpityn Athenis alij Dionysiam, alij Didoniam, alij (quod uerius existimo) Ioniam uocant scribit, ut Apollodorus & Athenæus; Item alij holocteron ut Dioscorides, & quos modo nominauimus: alij holocleron ut Paulus: credo libratorum culpa uariatum fuisse in uocabulo: sed res constat, satis est. Nicander

Ionida quandam herbam nominat, fortasse chamæpityn significare uoluit, pumilam & humilem eam dicendo.

CHAMÆPITYS SECUNDA. DCVI.

DE chamæpitye secunda dictum est in prima. 458
CHAMÆPITYS TERTIA DCVII.
Chamæpitys tertia, folijs scabris, caule digitali, crassitudine aspicitur.

TERTII LIBRI COROLLARIJ FINIS.

HERMOLAI BAR-

BARI PATRIJ VENETI, ET AQVILEIENSIS PATRIAR-

CHÆ, in Quartum Corollarij librum, PRÆFATIO.



SUPEREST ADHVC NOBIS MAXIMA NATVRÆ PARS EXPLICANDA, plantarum scilicet ac stirpium uis & potentia: In quibus accuratissime perscrutandis cum antiqua olim Græcia plurimum laudis ac gloriæ sibi uendicasset, nostri quoque eiusdem industriæ emuli contemni iure non possint. Atque ut alios taceam, quis non Plinium toti Græciæ tuto opponat? Aut quis hunc tantæ ingenuorum fecunditati, tantæ librorum copię, tantæ industriæ non æquet? Atqui mea sententia, uel hic unus dubiam illis studiorum hanc palmam facit, uel cedendum est illis in hoc genere. Nos uero nec cedimus, & tanto illos antestamus hac parte Plinio duce, quantum armorum gloria ac militari disciplina, ne cum nostris quidem conferri possunt. Nam de moribus atque institutis, & rebus domesticæ ac publicæ ratione nec illi unquam contenderunt, & rerum euentus facile ostendit, quanto nos illa melius tueremur ac lautius. De Mauritanis uero scriptoribus, quos uulgo Arabes appellat, sileri melius hac in parte puto, quicerte de Græcis ueteribus multa uale in suam linguam uertentes, obfuisse uerius uideat & profuisse uideri possunt. Tamò etiam nocentius, quantum nostrates homines, dum uel Græcos ueteres negligunt, uel Plinium auersantur, hosce duces nati, magno mortalitatis detrimento, ex eorum præscriptis morborum remedia profecti sunt: digni aliqui qui progeniorum felicitate latque animi sui propensione meliores præceptores adepti, de nobis melius promereri potuissent. Verum hæc alias nunc cepta deo iuuante prosequamur.

HERMOLAI BARBARI PA-

TRITII VENETI, ET AQVILEIENSIS PATRIAR-

CHÆ, COROLLARIJ LIBER QVARTVS.

BETONICA.

DCVIII.



BESTRON à Vetonibus inuentam in Hispania, Betonica in Gallia nominari ceptam putat. Alij Chironem, alij comiten, prophetæ hieraca, Thuscia in dicem, alij pèdouiam, Syri periponion, alij fidericū alij theriopauon, alij βῆτον, hoc est radicem diuinam. In Italia ferratula uocatur. Caulem habet interim cubitorum duum à radice spargens folia ferè lapathi, ut Plinius inquit, serrata, semine purpureo, ut idem autor est, seu stamine purpureo, ut Dioscorides, qui hoc dicit in altera mentione Betonicæ. Fit uinum ex ea & acetum medicis. Multum differt specie non affectu alia Betonica, ut Paulo Aeginetæ placet, unicaulis, ramulos habens pulgri, tenuiores & gustu fatuos, in petrosis ferè proueniens.

BRITANICA.

DCIX.

Britanica in insulis oceani aut in confini Britanniæ oceanoreperta est, folia habens oblonga, nigra, & radicem nigram, succus quævis exprimitur & ex radice. Florem Vibones uocant: qui collecti ante quam tonitrua audiantur & deuoratus, securos in totum reddebat milites Cæsar Germanici à morbis quos medici stomachacem & scelotyrben dicebāt. Siquidem in Germania trans Rhenum castris ab eo promoris maritimo tractu, fons erat aque dulcis solus: qua pota, dentes intra biennium deciderent, compagesque in genibus soluerentur: quibus incommodis in Arabia quoque Romanas legiones tentatas fuisse Augusti Cæsar principatu, Helij Galli ductu Strabo refert. Sed quærunt nonnulli quamobrem Vibones dicantur huius herbe flores. Diuinare non ausim: cæterum Strabo autor est, apud Vibonem in Brutis repertum coronis flores necesse, in eum quoque locum propter flores & Sicilia migrasse Prosperinam. Propinqua est Viboni Petilia: quæ nomen Petilio flori dedit in Lucanis, autumnali & circa uepres nascenti: tunc colore commendatur qui est rose syluestris, mirumque in eo flore insecti cacumen, nec nisi intorto folia nati, paruoque

lice ac uersicolore, luteum semen includente. Hunc di-
xi ab oppido Lucania uideri appellatū, nisi quis à Pe-
tilio Romanæ luco, itemq; Petilino altero existimet: ali-
oqui peritius pro exili capitur Lucillio. De hac itaq;
Britanica Dioscorides in præsentī loquitur. Est &
Cantabrica in Hispania, per eiusdem Augusti tempo-
ra à Cantabris inuenta, nascens ubiq;, caule iunceo,
pedali, in quo sunt flosculi oblongi uelut calathi, &
in his semen perq; minutum.

BETONICAE MENTIO TERTIA. DCX.

C Apud hoc nō in omnibus codicibus inuenias,
Illud misq; quibuscūq;, q; Plinius Betonice folia
tumesci scribit similia: hoc Britanica Dioscori-
des assignat, cum Betonica querna porius uisuntur.
Nec illud minus licet mirari, quamobrem mentiones
duas Betonica meruerit: nisi quis duo quoq; genera
Betonice demonstrata nobis à Dioscoride contende-
rit. Duas & Paulus Aegineta Betonice facies intelli-
git, effectū parit, ut prædicimus.

LYSIMACHION. DCXI.

Lysimachion & Lysimachios & Lysimachia
uocatur. Inuenit hanc Lysimachus. Folia eius
uiridia, ramuli erecti, odore graui, flos purpu-
reus fruticosus, ut Plinij uerbis utar. Vis huius her-
bæ tanta, ut iumentis discor dantibus iugo imposita
asperitatem cohibeat. Patatū demonstrata nobis est.

POLYGONON MAS. DCXII.

Polygonon & calligonon appellatū uidetur à
multitudine feminis, propterea seminalis in La-
tino dicit: q̄q; & sanguinalis & sanguinaria uo-
catur. Alij à densitate fruticis, alij à frequentia genicū-
lorum arbitrantur: quidā & halmāda nomināt. Inue-
niuntur qui feminam esse hanc contēdant, marem
autem maiore minusq; nigrum, & geniculis densio-
rem. Herbarij nullam magis aridam q̄ polygonon
seruant. Dioscorides polygonon quibuscūq; locis
uocari tradit pedaliū. Plautus quidem ita in Cur-
gulione appellat odoratē genus herbæ:

Tu rosa, tu crocus & casia es, tu pedaliū.

Aut certe unguenti nomē est in ea fabula pedalion.
Forasse uero non pedaliū sed bellū in poeta eo le-
geris. Polygonon Aëtius & huius *Prodrōm* hoc est solis
herbā dici meminit, uulgo centinodia & cotrigiola.
Proserpinacā in Plinio sunt qui polygonon accipi-
ant, dicente uulgarē herbā esse proserpinacā, eximij
aduersus scorpiōnes remediū, & lassitudinē si linguæ
subiungatur: si deuoretur, uomitionē sequi salutarē, ut
corrupte legatur in Dioscoride hoc loco stopinaca
pro scorpinaca siue Proserpinaca: q̄n utrumq; nomē
polygonon tributū uideas in eo libro qui L. Apuleij
fuisse creditur à multis. Illud mirari subit, q; Plinius
eodem capite Proserpinacā & polygonon quasi di-
uerfas herbas demonstrat, & utraq; ad anginas
commendat, xxvij. uolumine.

POLYGONON FOEMINA. DCXIII.

Polygoni quatuor genera Plinius existimat, ma-
rem & feminam: tertium *q̄q;* hoc est monta-
num, quod & describit eadem forma qua Dio-
scorides hic feminam. Quantum genus polygonon
pruatiū appellatur, de quo protinus indicandū
nobis est.

POLYGONATON. DCXIII.

Polygonaton Dioscorides montanum polygo-
non, syluestre Plinius intelligit, etiam si descri-
ptio fortasse dissonat in plerisq; Arboris, inquit

penē modo fruticat, radice lignosa, stirpe cedri rubi-
cundo, ramis sparti, binum palmoq;, nigris geniculo-
rum ternis quaternisq; articulis, odore quodam sine
gusto fastidioso: qui ne explicari quidē recte possit,
ut Paulus Aegineta scribit, & eo prior Galenus.

CLEMATIS.

DCXV.

Clematis hæc siue clematidis Aegyptia cogno-
minatur, quoniam Aegyptus hanc maxime gi-
gnat, prælonga tenuisq;, in prouerbij usq; ces-
sit *καμάρη* *αἰνιτῶν* ita nominādo eos, qui procerō &
nigro sunt corpore, ut est apud Phalerū Demetriū.

CLEMATIS ALTERA. DCXVI.

Clematis secunda siue clematidis, similaci
hoc hedere Ciliciæ similis effingitur, genicula-
ta & ipsa repensq; per arbores. Hanc aut non
dissimile, ut puto, Plinius est ubi echiten & laginen
uocat, & tenuē scammoneā, quia pedales, foliosos,
nō dissimiles scammoneæ ramos habeat, nisi q; mi-
nora nigrioraq; sunt folia. Inuenitur in uincis aruisq;
paratur cibis, ut olus cum oleo & sale. Sit hic frutex
qui cōuoluolus à nostris dicitur, cuius flos liliū rudio-
ris figurā præbet, ob id & liliastrī quoq; nomē habes,
& uulgo etiam ligustrī (q̄q; ligustrū proprie cyprius
est) æstimatur, argente: nam & folij ei pinnatū est,
ut scammoneæ, nec similici dissimile, uolubilis maio-
ris nomine: Semen nigrū, triangulū, in folliculis aci-
nosæ specie, qui numero tres habētur, in uinctis artus-
q;. De hoc Plinij uerba subiungimus: Est, inquit, flos nō
dissimilis lilio in herba quā conuoluolū uocat, nascēs
per fruticē, nullo odore, nec crocis intus, candorem
tantum referens, & ueluti rudimentū naturæ lilia fa-
cere condiscitis. Inuenio qui periclymenon uocē
conuoluolum, atq; circa pictam in Græcis codicibus ui-
disse uera periclymenos alia est, ut post liquebit. Ha-
betur & clematis tertia, centunculus à nostris appel-
lata, rostratis folijs, ad similitudinē capitis penulæ
iacens in aruis. Dioscorides & gnaphalion herbam,
centunculū à Latinis dici meminit: q̄q; non habeo cō-
pertum eadem sit an diuersa gnaphalion à tertia cle-
matide: quandoquidem & medicinæ congruunt, &
apud nos utraq; centunculi nomen habet. Sciendū
Galeno teste, Dioscoridem hoc loco de prima tantū
clematide locutū, quæ nō simpliciter clematidis, sed
clematidis daphnoides, aut myrsinoides, aut polygo-
noides appellanda esse uidet. Defecunda uero cle-
matide, quā & absolute clematidin uocari tradit, in
quarti huius libri sine scriptū esse, non hic existimat.
Addidere tamen librarij utroq; loco eam, quod & in
alijs herbis fecere. Pamphilus duas clematides in
unū confudit, à Galenoq; ob id inecessit iure. Idē ui-
detur & Plinius fecisse, medicinas aliquot prioris se-
cundæ tribuendo. POLEMONION. DCXVII.

Polemonij, siue polemoniā, alijs philætenā à cer-
tamine regū inuentionis appellauerūt, radice
crassa, nigro semine. In Plinio & mdeimonium
uocari herbā quandā inuenias, uomituris utilis tamē
haud cer⁹ sum eequid corrupta fit in ea uoce lectio.

SYMPHYTON PETRAEVM. DCXVIII.

Symphyton petræum nos alium Gallicie uoca-
mus, folijs paruis, ramis tribus aut quatuor à ra-
dice. Nascitur in petris, ideoq; petræum cognō-
minant. Symphyto autem Græcinomen imposue-
re, quoniam consolidet. Hanc Veneti coroneam ap-
pellant, ut inquit Plinius, rosæ radicis, alibi albæ, ali-
bi nigra.

SYM.

SYMPHYTON ALTERNVM. DCXIX.

466 **H**oc Galenus symphyton *μύα* id est magnū cognominat, nec gustu dulce, nec odoratum ut superius. Herbarij recentiores tria symphyti seu consolidæ genera constitunt præter petræū, quod ne cognoscunt quidē. Magnum, de quo hic agitur: minus, sed radice intus & foris alba, fere bulbi est: figie rotunda: minimū, flore in spicam purpureo, ac folio quidem organo ut petræum, sed in humidis genitum, radice lignosa, superius alba, nec odorata nec dulci, nec saluā ciente: quæ sunt in petræo omnia.

HOLOSTEVM. DCXX.

Holosteuum sine duritia est herba, etiamsi ab osse nomen habuit, per antistrophen uidelicet, hoc est ex aduerso à Græcis appellata, sicut fel dulce, folijs angustis. Nasct̃ in collib⁹ terrenis.

STOEBAE. DCXXI.

467 **S**toeben Theophrastus & Plinius phleon quoq; dici tradidere, Pollux phlon, cuius lanugine mulieres ad lixiuuium utantur. Molle inquit Theophrastus & placentaceum est phleon, colore subrubido. Meminit & Aristoteles, sed à Theodoro flauis vertitur. Foeminā in eo accipi quæ sit sterilis & ad ne xus utilis, unde phoinas uestes in Herodoto quis legat & Paulania: quibus aues in Arabia symphalides, ut uisco cæteræ capiantur, cum alia materia nō resistat earum rostris: nam & in Aethiopia Arabiæ aduersa nasci phleon testis est Strabo, flumine præsertim q; cinnamo femina determinat. Orchomenio lacu numerosum id haberi: à quo & nomen phleos: etenim Græci *φλώγ* pro eo q; est fecundū esse, capi unichin & Bacchum ueteres Phleona cognominabant, auctor Helianus. Partem huius herbæ teneram ab radice pueris in cibo gratā esse. Radicem ipsam pecudum pabulo uelli copiosam: nec in profundum actam, folio & caule aculeatis. Stipam à Latinis dici auctor est Dioscorides. Illud nota uerim, si Stœba idē sit q; phleos, errare qui Stœbam pro ea herba capiūt, quæ uulgo scabiosa dicitur, folio eruce hirsuto, non tamen aculeis horrente, cœrulei floris, ex qua & scopæ fiunt. Sit autem scabiosa quæ ab Aëtio plora dicitur, cuius usq; fumo arboris eruce moriantur, non habeo compertū. Photion lini genus tradit stypon uocatum: alioqui stypos, inquit, picæ caudex est, itemq; prædurū & solidum lignū quocunq; interdū & humilis stipes ita dicitur poëtis. Est & subion & stibe de qua diximus in hypophæ: nam stion calculus est marinus Hippocriati. Festus linum impolitum Dorice stuppam dici meminit.

CLYMENOS. DCXXII.

Clymenos appellata à rege dicitur, describi aliter à nostris q; à Græcis Plinius affirmat, hoc est hederæ folijs ramofam, caule inani, articulis præcinctam, odore graui & semine hederæ, sylue stribus montosisq; nascens. Sterile scire pota ea etiā uiros sextario eius in triginta dies diuiso, Theophrastus auctor est, quod quidē Dioscorides periclymeno uocat tribuit nam & descriptio nostrorū de clymeno quā prætexui, periclymeno fere conuenit.

PERICLYMENOS. DCXXIII.

468 **P**ericlymeno dictū est in Clymeno: nunc caprifolium & matersylua dicitur uulgo: q; Dioscorides matrem syluā pro hederā capit, cui periclymenon simile est.

TRIEVLVM. DCXXIII.

469 **T**ribulus siue tribulum in segetibus madidus & palustribus nascitur, non excedente quina fere cubita gurgitum altitudine, ut in Strymone amne. Capillamenta in eo quædam inter se contraria, eō breuiora, quō propius ad radicē sunt: adeo ut in ea quasi desinant ac procumbant: à lateribus terna & quaternis germina, ut amplissimū sit quod minus ab radice distat, & reliqua pro suo cuiusq; numero. Exit à parente foboles, omnino similis folio fructuq; sed gracilior: semen nigrum, prædurū, quo cadente ipsum se propagat. Folij habet secundum spinam: in femine quoq; geritur aculeus. Radicem eius alij annuam, alij diuturniorē esse putant. Duo genera eius: uni cicerculæ folium, alteri aculeatum. Vere germinant, serius tamen cui in folio aculei, magisq; hoc septa uillæ obsidet, semen habens rotundius & nigrum in siliqua: quod alteri hoc est præcoci arenaceum & selsamæ figura cernitur. Nihil cicere insectus tribulo est, Nasctur & in hortis tribulus. Dira res alibi, sed iuxta Nilum & Strymonem amnes in cibos recipitur. Panis ex eo fit prædulcis, & comprimit uentrem. Hippocrates genus tribuli *ἄγρ. βλακας* hoc est maritimum appellat idem cum terrestri, quod & minus est aquatico. Ex aquatico sane panes fiunt: ob id & Fettiariensem castaneam Galliā Padana tribulum uocat.

SAXIFRAGA. DCXXV.

470 **S**axifragum, & saxifraga Latine dicitur, item calcifraga (si modo hæc est) quam & Plinius & Dioscorides alio loco empetron appellat. Paulus saxiphages. Empetrum, inquit Plinius, fere in saxo nascitur: recenti uires sunt, utustate perdit eas. Lapillos qui suffruescant, unārumpi affirmant. Habetur & saxifragi genus alterū, in adjanto nobis explicandum. Corrosi & ambugi sunt hac parte Græci codices: nec quale sit huius herbæ foliū, animaduerti ullo modo potest, & in ipso uerborū textu spatiosū inane uacat. Porro ueterem in Dioscoride picturam huius herbæ uidi, non plus folijs q; citris minutis per ramos ex intervallo conditis, nec frequentibus, in cacumine surculorū flocci ceu arantes potius q; flosculi, subrubida radice, non sine fibris. Romæ talis ostenditur in maritimis ac montosis tantum, non rubida radice, sed candida: flosculis quoq; candidis. Recentioribus de hac herba parum conuenit: alij triticifolium figuram, alij marigbati similem dixere, alij tormentillæ uulgo dictæ. Est autem ut uolunt tormentilla quinque folio herbæ similis, nisi q; sepiem fere habet folia, non quinque. Quarta herbā, quæ flore meariophyllon uocatum ferat, de quo alibi dictū est. Quinti saxifragam candē esse, aut proximam ei, quæ pampinula, pimpinella, & bipennula, & sanguisorba ruri dicitur: quoniam uulnibus iniecta ferrum & spicula facile ac citra sensum doloris exigit: folio paruo, orbiculato, & extremitatibus serrato: quod & mandī solet paratum oleo, sale, aceto, surculis ab eadem radice plurimis atq; densis rubentibus cum radice, ut ferunt. Quibusdam locis uermiculis eruitur: qui curatus sericis præcipue tingendis, purpuram facit incomparabilem: cæteros colores splendore quodam & hilaritate superans. Inuentus ut alia quoq; multa casu, excrements gallinaceorū ita coloratis: nam & usus purpurg, ut est apud Iulium Pollucem, ab Hercule uidetur institutus, conspecto canis rostris, qui purpuram deuocasset, infecto. Igitur purpurissimum ex hoc

ex hoc uermiculo, carbafinū à præftanti amphitheatralium uelox, ut arbitror, colore dicitur. Quidā carbafinū appellant colore, quoniam uermiculus is Punica lingua carmes appetetur, quemadmodū & coccus potest & ab urbe Charmi, quæ Sardibus est, nomen accepisse coloris, quod lanas inficere Sardibus coepit fit, ut inquit Plinius. Nam carbatinis in Aristotelis secundo de animalibus uolumine legendum, non carbafinis est. Sunt autem carbating quās Catullus carpatinas crepidas uocauit, calceamenti genus ē Caria translatum, quod hodieq; uulgo sic uocatur, detractis utiq; posterioribus syllabis, & si litera principio adiecta, ut affolet. Nam & carpsiculus calceamenti genus est, ut Flautus Vopiscus ait in Aureliani Cæsaris uita. Quidā tamen carbafa etiamnū uocant boum coria, quæ Cæsar alutas appellauit: nā, ut Suidas scribit, ubi defecissent calcei, carbatinis utebantur, ex crudis boum tergoribus recens de tractis, ut illud Vergilianum:

Vestigia nuda sinistra

Instituere pedis, crūdus tegit altera perō.

De hoc uermiculo nihil apud ueteres inuenias: nam fandix Indica, de qua in Aureliani Cæsaris uita legi, pretiosas purpuras fecisse aliud tincturę genū puto. Hieronymus in sacris literis uermiculus & uermiculus uestes nominat, granum, ut opinor, aquifolij significans, quod autore Plinio quibusdā locis uermiculi similitudine conspicitur. Hinc deriuatū arbitror, ut coccinea uestis, scolecidata, hoc est uermiculata uulgo diceretur, siue quasi quinquillata (Etenim granum cocci etiam quinquillū uocatur Plinio) à quinquillīs, opinor: Sunt enim quinquillæ, ut Festus ait, quicquid ex arboribus minutū cadit. De uermiculo purpureo Democritus quoq; meminit tincturis utili, sed ē purpūris ac murice, ut consilio: nam & de uermiculo Galatæ hoc est iligno * meminit. Pampinule similis est, folio tantum minore, ac magis serrato & lenti usculo, quā nostri herbarij eufragiam appellant, minus fruticosa, flore luteolo, præcipue claritatis ad omnia uiria oculorū ueteribus incomptam existimant, quemadmodū & illam, quæ cartosilago dicitur à uulnerarijs, nos ceratophylaceti uocandā putamus: quia partem oculorū ceratoiden hoc est corneam defendat, salutiq; percussam restituat, folijs seriphij, uel potius roris marini, aut lini quoq; capitulis arenibus, citris sublateis.

LIMONIVM. DCXXVI.

471 **L**imonium beta est syluestris, densioribus folijs: aqua ē radice cocta maculas uestiū, & membranarū eluit. Aliud genus est à limonio limonia, ut in scolymo notauimus. Limoniū Aëtius etiam cynoglosson, hoc est linguam canis uocari scribit.

LAGOPVS. DCXXVII.

Lagopus, quasi pes leporis dicitur: sanē & similis ei est aspectu. Proinde haud probarim eorū sententiam, qui caryophyllatam uulgo dictā rentur, in opacis montanis gigni solitam, non in segetibus, ut lagopus. Hippocrates nominat & lagopyron; quasi leporis tritum intelligas, fursuribus cum inaruit simillimā, folio paruo quasi oleagineo, longiore tantum, cruentis uulneribus imponēs. Hāc Galenus leporarium inquit herbam esse.

ME D I O N. DCXXVIII.

Medion, exemplaria sunt in quibus folia ei nō feridis, sed iridis reddātur: Plinius quoq; in-

dis satiuā scripsit, sed eum satiuā adiecit, non de iride, quā nemo legit satiuā esse, quando, ut inquit Theophrastus, iris cultum nullū desiderat: sed de feride uidetur intellexisse, cuius constat duodecim genera, satiuū & syluestre.

EPIMEDION. DCXXX.

XIPHION. DCXXX.

474 **X**iphion à Theodoro dicitur pugio. Floret uere cum uiola nigra. Falso pleriq; arbitrantur xiphion eandē esse q̃ & lonchitis: sed illa in sic cancis, hæc in humidis nascitur. Sunt & alia discrimina, quæ notari possint uolentibus. Habet hæc & radicem ad nucis a uellane similitudinē fimbriatā, quam effodi ante messes oportet, & in umbra sicari. Videtur hæc & phagabon, & machæronion hoc est ensis uocari: radice, ut Theophrastus inquit dulci, decocta, & cōmendata panificijs, si trita farinæ admisceatur: unde machæronij pastilli forasse ortū habuere, quos tertio kalendas Octobres uulgus esciat. Item rotunda & sine cortice capillata fibris, ut gethyum. Scolopendræ in herbæcram frequētes conueniūt. Est & compositiois cuiusdā in medicina uiridis nomen machæron, ad morbos articulares, & ischiada. Habetur & xiphias piscis, quē gladiolū interpretantur, duo, ut inquit Aristot., habens rostra fed dentib; carēs.

SPARGANION. DCXXXI.

X Y R I S. DCXXXII.

473 **X**yris & xeris aut xyrida Galeno teste dicitur. Scelus herbariorū quorundā aperit hoc loco Plini, partē eius seruantiū, & quarundā aliarū herbarum, & plantaginis & iridis substituentium, si parum mercedis tolisse arbitrat, rursusq; ut plus operis acquirat, partem eam quā seruauerit, eodem loco infodiunt: credo inquit, ut uicia, quæ sanauerint, faciant rebellare.

ANCHVSA. DCXXXIII.

475 **A**nchusa caulis, non ut aculeatq; multifidus, sed stans: funditur papyri modo. Radix infundendo ligno cerisq; apta, præparans & lanas pretiosis coloribus, Laodicea maxime. Vt De moerito placet liquari non potest in aqua ad medicinas: oleo resoluatur, idq; syncere experimentū est. Habetur & alia similis pseudanchusa ob id appellata, à quibusdā enchusa aut doris, & multis alijs nominibus, lanuginosior & minus pinguis, tenuioribus folijs & languidioribus, radice oleum nō fundente, sed rubentē succum, & hoc ab anchusa discernitur. Anchusæ primū genus onoclea cognomē habet, & chærospelethos in Paulo, secundū onochelos, siue Alcibiadios: tertium pusilla fereq; innominata: quartum lycopos. Anchusam poetæ sunt qui & enchusam uocant: q̃q̃ enchusa pro pseudanchusa potius, q̃ pro anchusa capitur à nonnullis, ut prædixi. Hippocrates Anchusam uidetur intellexisse, cum schelida nominat uicū Galeno placet.

ANCHVSA ONOCHELOS. DCXXXIII.

476 **A**nchusa onochelos, alij thexiam, & archeuion, multi enchryson: paruo frutice, radice præterq; mellibus nigra: tunc em sanguinea est, uiresq; habet. Folijs tritis, odor cucumeris.

ANCHVSA TERTIA SINE

NOMINE. DCXXXV.

LYCOPSOS VEL LYCOPSIS ANCHV.

SAE GENVS IIII. DCXXXVI.

ECHION. DCXXXVII.

l Echios

479

Echios etiam doria à Paulo vocatur. Plinius: Echios, inquit, utriusque generis pulegio similis est, coronata folijs; altera lanugine distinguitur spinosa, cuius capitula sunt uiperæ. Quidam echion pro personata, inquit coepere. Dioscorides hoc loco unum facit genus echij, non geminum. Sed Nicandrum uidetur sequutus esse Plinius in Theriacis dicentem echios duas esse, contra bestiarum ictus utiles: alteram humilem folio anchuſa, spinis horrida, sed exili: alteram altiore, maiore folio, flore pauco, per ambitum purpureo, capitulis uiperæ, cacumine aspero alſtrictis lanugine. Idem poëta paulo supra quasi tertiam eiusdem nominis reddendo: Echios, inquit, cognomine Alcibios, herba est spinosa, comina sustinente flores, radice alta & exili, quam ad serpentes & insidij uulneribus & commanducari quoque præcipit. Folia quoque ipsa non multo post eiusdem Alcibij commendat, quum manu comprehendipot sit. Plinius xxvii, uolumine: Alcibios, inquit, herba qualis esset apud autores non comperi, sed radicem eius & folia trita ad serpentis morſus bibi & imponi iubent: folia quum manus capiat, trita cum uini meri cyathis tribus, radicem drachmarum trium pondere cum uini eadem mensura. Ideo autem qualis esset Alcibios apud autores comperisse negat: quoniam præter Nicandri uerba illa & pauca & alijs cõmunia quæ prætexui, non legitur qui descriperit. Altera uero esse Alcibion Nicandro quod duas illas priores, echios scilicet ostenditur & quod echis hæc non echios ab ipso dicitur: & eandem herbam uno loco bis depingi opus non erat.

OCIMOIDES. DCXXXVIII.

ERINOS. DCXXXIX.

478

Erinos herba cognominis arbori caprifisco est, ob id à Plinio inter ficos caprificosque reddita: non naturæ, sed gentilitatis respectu. Lac eius dulcis. Galenus hanc non erinon, sed echinon uocare maluit. Vetusſti quoque Dioscoridis sunt codices, in quibus non erinos, sed echinos scriptum sit. Est & apud Hippocratem echini herbe mentio.

GRAMEN. DCXL.

479

Gramini ab internodijs ramorum & cacuminibus radices nouæ pullulant. Sunt qui & aculeatum gramen inuehant trium generum, dactyli cognomine: unum cuius in cacumine aculei sunt plurimum quini: alterum aizoo simile, dactylō priuatiu uocatum quoniam digitis medeatur: tertium genus tenue: nascitur in parietinis aut tegulis. Nulla herba gravior iumentis gramine, siue uiridis, siue inſecno siccata. Tunditur aspersa aqua. Radix adhuc tenera mandendo est. Gramen Marti consecrauit antiquitas, quod ex humano cruore procreatum crediderit: quod & omnis herba gramen abusione dicitur. Quidam Saturno dicant, quod ab eo satum primo perhibent. Glaucum uero immortalitatem huius herbe cibo consecutum Athenæus ex Aeschionis poëtæ uersibus existimat.

CALAMAGROSTIS. DCXLI.

Calamagrostis à Plinio gramen simpliciter uocatur, inſectum camelis. Quidam Babylonij gramen cognominant.

GRAMEN PARNASION. DCXLII.

Gramen Parnasio monte folium habet hederæ, densius quam ulquam fruticans, cum in reliquo orbe folia in exilitatem fastigiantur. Succum huius excipiunt propter ubertatem, qui & dulcis est.

GRAMEN CILICIVM. DCXLIII.

Gramen Cilicium hoc est cinna. Sunt qui & medon uocent: nec amburi eius recentis pastu boues, sed pingueſcere contendunt: nato alterutris herbes, quod alij *πικρανον* & *βίβιν* legebant, alij *πικρανον*.

SIDERITIS PRIMA. DCXLIII.

Sideritis primam aliqui ueram Achilleum cognominant, alij sideriten. Odoris fecdi cum teritur, tradunt: nostri sideritiu cam, quæ est laetissimo folio, scopam regiam appellant, medentem anginis suum peculiariter.

SIDERITIS SECUNDA. DCXLV.

Sideritis secunda ramulos habet triangulos.

SIDERITIS

TERTIA. DCXLVI.

Sideritis tertia similis Achilleo est, mox prodehæ, sed candidioribus folijs & pinguioribus, tenuioribus cauliculis.

SIDERITIS QVARTA. DCXLVII.

Sideritis Achilleos dicitur, quoniam inuenit eam Achilles, discipulus Chironis, qua uulneribus medetur, & Thelephū sanauerit. Alij primum æruginem inuenisse tradunt, uulsiſſimam emplastris: idemque pingitur ex culpidè decutiens eam gladio in uulnus Telepho. Alij utroque usum medicamento uolunt. Hanc nonnulli panaces Heracleon appellauere: nostri proprie millefoliam, cubitali scapo ramosam, minutioribus quam feniculi folijs, uesitam ab imo. Alij ueram Achilleon esse dicunt scapo cœruleo, pedali, sine ramis, ex omni parte singulis folijs rotundis, elegantet circumdatam. Alij primum genus sideritis Achilleon ueram, ut diximus, acceperunt. Ethruria millefoliam uocat herbam in pratis tenuem, à lateribus capillamenti modo foliosam, eximijus ad uulnera. Boum neruos abſcissos uomere solidari ea rursusque iungi addita axungia affirmans. Achillios, & Achillion uocatur quarta sideritis, ut dictū est, & à Latinis quibusdā lumbi Veneris. Dioscorides superciliū Veneris non lumbi dici uoluit, alterutro errore orto, quod Græci *ἄρπον* lumbum, *ἄρπον* supercilium appellat.

RUBUS. DDXLVIII.

Rubi multa genera, sed quæ magno separantur discrimine. Chamaebaton uocant humilem rubum: qui protinus quam paulo accreuit, retro uergit in terram, atque ita radicitur, & humirubus à Theodoro dicitur. At rubus inter arbores aquaticas statuitur. Rubi unum genus ferbora, quæ & manduntur. Huius radice spongiolæ duriciæ lapidis uisuntur: alterum rosas, de quo incynosbato dictum est. Flos mori candidus per menses colligitur. Locus rubis confectus, quem nos feticentum & dumetum uocamus, Græci *βέναν* & *βέναν* appellant.

RUBUS IDAEVS. DCXLIX.

Rubus Idæus in Ida non aliis nascitur, sub arborum umbra rarioribus aculeis, & minus aduncis.

HELIX

HELXINE.

DCL.

Helxine duplex Dioscoridi & omnino auctoribus: altera parthenion, altera cissanthemos ab hederæ folijs uocata. Plinio item duplex, sed aliter: altera de qua hic agitur parthenij & perdicij, siue perdicia discognomine: qm perdicces hac præcipue uescantur, folia tamen ei nō Mercurialis, ut Dioscorides, sed mixta: similiditernis plantaginij & marubio tribuit, cauliculis densis lanas infestis: femina in capitibus lappaceis adhærescentia uestibus: à quo & helxinem dictā uolunt. Hanc Aecolix gætes, & Aegyptij edidit. Crassas plurimasq; habet radices, ut inquit Plinius. Altera idē auctor inquit uerior est helxine, cui radix foliosa: ex qua similis malo carduus feminis plenus extuberat, scimnalis acanus à Theophrasto dictus: cuius incisio summo uertice lachryma erumpit iocundi saporis, acanthica mastiche uocata, propter eaq; adulterij ea fit, ut dixim: germinat atq; floret gætare folio & caule, lanugines spinosas habes. hæc Plinius. Nos hanc nō helxinem, sed ixinē uocari credimus, ut in chamæleote candido dictū est, q̄q; porto prior helxine perdicion & parthenion dicat. Aliud nō intelligo Pliniū secus perdicion, quæ à nostris herba urceolaris uocatur, ab alijs astericū, folio similis ocimo nigrior tū, nascens in tegulis parietinis q; ob id & parietaria, & muraliū, & muralis uulgo dicta & uineago, & parthemion: qm à Minerua in somno cōtra præcipitula lapsusq; mōstrata est Pericli Archenisū principij, cum uernula ei charus ex altitudine cecidisset & plachnoptes appellatus. Turtures, columbæ, gallinacæ annuū fastidiū deducere dicunt helxinā pastū: auctor est Plinius. Triplex digito inuenio parthenium: unū folio coriandri, quæ amaracus à Galeo, partheniū à Dioscoride nominatur, uulgo matriaria: alteræ folio Mercurialis, ut Dioscorides hoc loco, siue plantaginij & marubij, ut Plinius, quæ dicitur helxine, ac de ipsa hic agitur. Tertiū folio ocimi quæ parietaria & muralis uocetur: de qua mirū est Dioscoride nihil præcipere quod sciam, nisi quies cum dicat sub helxine hanc quoq; accipisse, quoniam hirsutula sit & adhærescat uestibus, nec à Mercurialis herbe folijs omnino multū distet, præter q̄q; Mercurialis serrata leuiter ea sunt, parietariæ nō sunt. Sunt qui & Mercurialem ipsam parthenion quoq; dicant helxinem, ut Dioscorides in myosotide scriptū reliquit: etiam pastū dicta est, q̄q; corrupte in Theophrasto legitur asine, ubi Theophrastus uoluerum interpretatur arbores amplexu hederæ modo strangulantem.

E L A T I N E.

DCL.

Elatine folio cassiæ à Plinio describit: cætera cū Dioscoride cōueniunt: corrupta in Plinio lectiōnem esse haud sum dubius, librarijs cassiam p̄ helxinā substitit uestibus: quandoquidē elatina modo uisitur helxinæ similis, hoc est folio hederæ propinquum, non cassiæ: cuius id oleaceū est, ut in chamæleā dicitur.

E V P A T O R I V M.

DCLII.

Evpatorium & eupatoria q̄q; dicitur. Regiā & hæc auctoritatem habet, folijs plumosis, modo & caulis, flore candido, radice superuacua, Mauritani aliud eupatoriū de monstrat officinis penitus diuersum figura, sed effectū par, scapo exiguo, fere cubitali folio, centaurij minoris. frutice odorato, sed florem magis qui luteus ei est, radice superuacua: passim nascitur.

P E N T A P H Y L L O N.

DCLIII.

Pentaphyllon & pentapteron in Theophrasto Theodorus quinq; folium & quinq; pennā conuertit. Aëtius hanc *spuū Boraculu* hoc est Metcurij herbā uocari tradit. Aegyptij etiam dissyphe cognominat. Daci, drocila: Itali pfillium, solotam & thebeotin, q̄q; corrupta puto nomina: nam & therubros & theonestron quoq; dictā inuenio, radice cum recens est rubente: nigra cum inarescit, quadrangula, folio uitis pusillo: augetur definitq; cum uite: caulibus tenuibus, crebris geniculis: nomē à numero foliorum. Quidam Græci chamæzeleōn quasi frutice terre uocant. Commendari quinq; foliū traga terre strigendo, Plinius existimat. Ego id qui uerū esse possit nō intelligo. Nam herba ea, quæ traga gignit, trifolia est, nō quinq; folia: flore candido, non luteo: in Rhæcis & Vindeliciis alpibus etiānum frequēs seculis uis. Hippocrates duo uidetur nōuisse quinq; folia: cā dididū, quod & herbaecum, & procerius est à terra: nigrum, quod humilius. Est & quæ tormentilla uulgo dicitur, quinq; folio similima, nisi q̄ septem non quinq; habet folia. Potest à nobis heptaphyllon uocari, hoc est septem folia: ex cuius radice pastillos cheriacos (si dijs placeat) officinæ pro uiperæ carne substitiunt: quoniam uiperæ modo ut ipsi putant, nunquam uisuntur.

P H O E N I X H E R B A.

DCLIII.

Phoenix à Plinio dicitur herba phœnicea inter fruges ab eo posita: quoniam à nostris hordeū murinum uocetur.

I D A E A R A D I X.

DCLV.

Idæa radix acerba gustu, miseri solita lactante in palsestra pulueri ad ea, quæ repercutere tantū oporteat, ut Paulus Aegineta scribit.

R A D I X R H O D I A.

DCLVI.

Habetur & radicis Cynthiæ mentio Hippocrati fouendis fœminarū locis: inuenio & rhodiō uocari coloris genus Democrito, Italicū præferente in uellerum tinctura: fortasse id quod nos uulgarī nomine rosaceum uocam^{us}. Galenus rhizam, hoc est radicem ab eo dici genus quoddā ita scribit sine caule, sine flore, sine semine, tribus duntaxat folijs, sed proceris & in terra stratis digitorū duorum magnitudine, similibus anchusæ: radicē ipsam prætenuem: purgandi uiribus, sed exiliter. Alia uidetur herba quæ uocatur oxyfa Plinio, etiam si folia æque ternā habet: quippe quæ non purget, sed contra potius astringat, & ad stomachū dissolutum & enterocelas in cibo detur. Proinde sunt qui oxyn putent esse, quam uulgos tauram & triada, hoc est trinitatem: & sphragida, hoc est sigillum Solomonis appellauit: folio tripliciat uno potius in terna dissposito, radice capillamentis multiplici: flore cū maculis quibusdam candidis cœruleo. Est & ophrys Plinio herba denticulato oleri similis, folijs duobus, quæ capillum, inquit, denigrat. Est & mamiras herbula cuiusdā radiculatū Paulus notat: geniculis frequentibus, nodosis, albugines, & cicatrices externes, atque comminuens.

H I P P V R I S.

DCLVII.

Hippuris equisetum, & equisilet dicitur à Latinis, iniquia sceniscis: nascens in pratis. Est autē pilus terræ equibæ setæ similis, ut nostri tradunt. Græco: aliquipsum folijs nigricantē eodem noie appellat. Hanc uero, quæ hic describitur, folia habere pauca, tenuia, exigua uideas comas, semē rotū

k a dum

dum simile coriandro. Nasci in arbutis maxime, auctor Plinius. Hanc herbam Dioscorides à Romanis salicem uocari tradit, de qua fortasse Vetrus homo doctus apud Festum intellexerit, cum diceret, uirgulti genus esse salicis: non ridicule, ut idem Festus carpit, interpretatus: quæ celeritate crescat, ut salire uideat: quando Græci quoque hanc & iteam *Asper*, & *Asper* à salicis quadâ similitudine & à scandendi more uocant. Alio loco Plinius: Ventoso tractu nascitur, scanditque arbores, & propendit extraxis folio nullo cirris numerosam, qui sunt iunci geniculati, radice pallida. Nec mirum sit alicui quod folia modo pauca, modo nulla tribuantur: facit hoc & auctor: quos secutus est, & locorum atque temporis diuersitas. Hanc ipsam caucum, siue daucum uocari legas in aliquot codicibus: uerum tamen exemplaria id uocabulum non habent.

HIPPIRIS ALTERA. DCLVIII.

Sciendum hippurum uocari & pisem quandam, siue hippurea, quem aliqui etiam coryphaem cognominant. Differt ab hoc qui uocatur hippus ab Epicharmo dictus ispidion, siue ut legunt aliqui, ispidion.

COCCVS BAPHICA. DCLVIII.

Differt coccus baphica, hoc est granum tinctorium à cocco Cnidio, siue grano Cnidio, ut apertissime constat Calenum, & utriusque notas contemplantibus. Magnitudo huic, id est Cnidio grauior pipitis maior, uis ardens, rotundum, rubensque colore cocci. Fructus qui hoc ferat thymelæa, siue chamælæa dicitur. At qui tinctorii granum gignit, aut priuatim coccus dicitur, ut Dioscoridi placere uideo: aut ille est aquifolia. Granum, inquit, hoc Plinius rubens est, primumque ceu speciem fructus paruus, aquifolia illicis: quod quilibet uocant, pensionem alterâ tribui pauperibus Hispaniæ donati. Est enim illex gemina, ut Columellæ placet: Minor apibus quæ sita & prolixiore à cænis improbata mellificio. Omnes, inquit Plinius, roboris dotes illex solo prouocat cocco. Granum hoc Calatiæ, aut circa Emeritam Lusitanæ, maxima laude, inquit, habebatur. Cignitur & in Africa & Pisdia. Pessimum in Sardinia. Est autem genus ex eo, inquit, in Attica fere, & Asia nascens, celerime in uermiculose mutans: quod ideo scoletilon uocabant: improbantque limaci parum similem: culici, ut Dioscorides affirmat & Pausanias, qui fructum hunc in Locride copiosum ad Ambrysom rharni amplitudine, præterea lentisco similem, nigriore tantum & molliore folio describit: fructu solani quidæ specie, sed erui magnitudine. Colligendum præcipiunt antequam uermiculus nascatur. Calatæ qui supra Phrygiam sunt geniliter lyy uocant. Eum fructum Iones & Græcia tota coccum. Anniculo itaque grano succus ad pigmenta languidus: quadrimo euandus ita nec rebit uires nec senescit. Colos inter principales imperatoris tantum paludamentis dicitur, qualis in rosam micat, & quo nihil aspectu gratius, & in purpuras Tyrias dibaphasque, aut Laconicas: etenim Tyrio primum tinctas, mox & cocco tingere mos erat, aut ceterum fieret byssini: nam & tertio & quarto & quinto saturabatur: unde nomina illa uesum, monoceros, dicoros, tricoros, tetracoros, pentacoros, in uires principum. Sit autem granum tinctorium, an phœnicotælanus atque palmatus, quod Hippocrates phœni-

cion coccon quasi granum puniceum uocauit, æstigmatibus relinquo. Illud quoque hoc loco referendum est, coicina quædam legi apud Græcos texta, quæ non stri ceu coccina legentes, in Strabone rubra conuertunt. Cæteræ coicina dicuntur à coice frutice in Aegypto textili, cuius mentio & apud Theophrastum est: Coix, inquit, folio harundinis angulari, ad nexus utilis, à quo & sicellæ genus coix Attice, ut inquit Pollux, quod Dorice coix dicitur.

TRAGION.

DCLX.

TRagion alij similem terebintho faciunt, alij iuniperi per omnia succo lacteo, qui spissatur in gummi, nascentem non alibi quàm in maritimis Cretæ. Dicitur & tragionis,

TRAGION ALTERA.

DCLXI.

TRagion hæc minor est priore: nec in Creta solum, ut illud, sed multis locis nascitur, ut Galenus inquit.

TRAGOS.

DCLXII.

TRagos Asia fert, ueprim ut Plinius dicit, sine folijs, racemis rubentibus, ad medicinæ duntaxat usum. Hanc & in litoribus nostris gigni modo perhibent herbarij, iunco marino similem: à quo & iuncum marinum multi uocant eam. Tragos alia est quàm nos hirculum uocauimus inter nardos: item alia, stirodes, hoc est cerealis cognominata, inter frugesque dicta.

OXYSCHOENOS ET IUNCVS

PALVSTRIS.

DCLXIII.

Iunco palustri Græcos ad funes usos, nomen credamus, quo herbam eam appellant, unde funambuli *χοιβάτω* ab ijs dicantur. Qui nauigare in Indos Alexandri milites, iuncos lapideos uidere per litora, simillimos nostratibus. Iunci ueterum gentem quodam cacuminis callo præferunt: mox coherentia quædam uelut oua pariuat, pediculis circa spicaceis, in quibus uascula rotunda, leuiterque hifcentia, & in ijs semen nigrum cuspidis effigie, non dissimile asterisco, duntaxat exilius, radice longa, quæ crassior multo sit, quam maribus cognominatis. Caput huic cepis, & gethyo simile, integumentis modice rubentibus. Iuncus palustris, hoc est, *χοιβάτω* & in multis generis conciditur. Oxyschoenos proprie is est, quem marinum iuncum uocamus. Sterilem masculum existimant, foruncum foeminam. Is qui semen nigrum habet, melancranis appellatur, quasi iuncus atriceps: melancranis dictus Straboni. Unde funditoribus Balearicis amenta quod & Phileta meminit. Hic sine alijs generibus nascitur ex suo semine, sicut is quem marem nominamus, ex semetipso, cacumine in terram defixio: nam oxyschoenon & holoschoenon eodem cespite contemplatum se Theophrastus & admiratum scribit. Omnia radices singulis annis intermoritur duntaxat. Holoschoenon mariscum à magnitudine (ut puto) nostri uocant, quemadmodum & mariscus ficus, auctore Festo, quæ Græci busyca, hoc est grandiores & fatuas ficos, ob id & sycomoræ esse quidam officinas uolunt. Hic & ad tegetes, ut Plinius inquit, & omnino utilia utilissimus, quoniam molli car nobisque sit. Vfus omnium ad nassas marinas, nexu elegantia, lucernarum lumina, præcipua medullæ amplitudine iuxta maritimas alpes tæta, ut incisio uetere im-

plcant

pleant penè unclay latitudinem: in Aegypto vero cribrorum longitudinè, non aliàs uiliorem: ob id cribrum significatur, iuncum effigiat ut inquit Horus. Idem autor in Aegypto scribi iuncis nec aliter affirmat. Videtur autem palustris iuncus idem cum scirpo esse, nec in fruticum inquit Plinius, nec in uersiprum caulium uel, neq; in herbam alio uel suo genere numeretur iure. Scirpi fragilis palustresq; ad tegulum & tegetes, & quibus detracto cortice, candelæ luminibus & funeribus seruiunt. Firmior quibusdam in locis etiam rigor: namq; uis uelificat, non in Pado tantum nauis, uerum in mari piscator Africo, præpostero more uela intra malos suspendens, & mapalia sua Mauri regunt, proximèq; æstimanti hoc uideantur esse quo papyrius. Ob id etiam sunt apud nos, qui scirpos interpretentur quos Græci biblos, id est papyros uocant. Sed fruticosi generis sunt papyri, enodes & sine fronde scirpi, leues proceriq; ut Festus ait; unde prouerbiū quoq; natum sit, nodū in scirpo queri. Habent Græci & alteri ex iunci nominis prouerbiū *χονίον παυλάτων*, hoc est funiculū rubrica tinctum: contra reos desidia, q̃ Athenis qui non in tempore ad concionem uenissent, rubricato fune in foro comprehensi notabantur, & mulctabatur. Huc uidetur alluisse in Pcenulo poëta Plautus, cum de scortis uilibus diceret:

Vestras schœno delibutas schœnicolas sordidas. Quamq; & rubricatas, hoc est fūco litas intelligi uult eas. Est & in uerbo schœnicola adagiū, & ut sint quales Græci *χονίαν* uocantur, hoc est, spartum rodentes, quod item de inerbis & nugarijs, ut Varroni placet, & alienum laborē frustra consumētibus, usurpari solet. Notum est argumentū illius Oeni, de quo multa in castigatione Pliniana dixim⁹. Scio quod dā intelligere, nō schœnum id est spartum, sed lentiscū, hoc est schinum rodī ab legnibus, quia prouerbiū id contra eos dici scribit auctores, qui nimio se commendī studio superfluum, ac dentibus extereendis & fricandis incubant, qualis in lentisco mastiche uis redditur. Sed schœnotroges tamen in omnibus Græcis codicibus, nō schinotroges legas. Sunt qui schœnotroges à scilla dictos putent quam & Aristophanes & alij schœnon quoq; appellant, & dentibus professe constar: unde Schœnida Venerem cognominata tam Lycophroni sunt qui credant, q̃ cibo eius accendatur libido, ut schœnotroges & schœnicolas, hinc quoq; dici meretrices autumare liceat. Vel forte schœnicolas *ἀπὸ τρυφῆς*, quasi tabernicolæ, nam & alicarios & prostibulas uocabant, q̃ circa pistrinulas & stabula uersarentur, ut ait Festus. Schœnicolas ab unguento ait pessimum uocatas, quod Græci schœnon dicunt. Habetur & iuncus euripice uocatus, & triquetrus, & odoratus, in suas quiq; mentiones a deūdi.

EVRIPICE DCLXVIII.

Euripicem nō desunt qui tropicem appellent inter recentiores: quorum pleriq; ut eruditioris suæ periculum faciant, multis partibus rei Latine officunt.

LICHEN IN SAXIS. DCLXV.

Lichen siue lechen est muscus, de quo hic, itēq; herba alia nascens in petrosis nomine utriusque inuento, quoniam contra lichenas remedijs omnibus anteponuntur. Folium herbæ unum ad radicem lacum, caule uno paruo, longis folijs de pendentibus. Vitant recentiores herbarij hepaticam appellant,

Appuli herbam cuius unum ad radicem folium haberi diximus, iecorariam siue ficatellam cognominant, folio succi pleno & crasso, ita nominatam, quia iocinoris fibræ similis aspicitur. Diuersa est eodē nomine apud nos in littore passim nascens, & olitorio foro ieiuniosq; tempore uenalis, hederaceo ferè folio, flore purpureo, illiq; pusilli effigie. Conuoluit herba in quibus appropinquat. Soluit alium coctā, & crudā oleris modo accepta. Sunt & lichenis sui equis, calli, de quibus secundo libro dictum.

PARONYCHIA.

DCLXVI.

Anc & neurada cognominari docent autores. Quid autem sit neuras muliebribus malis quæ sit Hippocrati, non liquet plane, nisi quod ferè affirmo) non neurin, sed nerin, hoc est nardū montanum legat.

CHRYSOCOME.

DCLXVII.

Chrysome sine folijs, sine semine folio scapo: comas habet fulgore auri, unde nomen. Vocatur & Diosgenia, hoc est Iouis barba.

CHRYSOGONON.

DCLXVIII.

HELICHRYSOS.

DCLXIX.

Elichryfos & heliochryfos à Theodoro aurelia uocatur, ad solis repercussum comātib⁹ in orbem folijs fulgore auri, à quo nomen. Alij à uirgine Ephesia quæ hoc flore prima coronauerit, Dianam. Coronant et̃ deos Ptolemæus rex Aegypti diligentissime curauit. Vestes odore cōmendat non ineleganti. Existimatio ē gloriā parere coronatis flore creditur, si unguento se perfundant ex auro, quod apyron hoc est ignem nō expertum, uocatur. Floret ferè cum uiola nigra uere. Flos auri modo flouet. Radix summo terræ corio innixa, folio candido, caule tenui & duro: non ut Theodorus inquit, semine, qui carpon, non caulon in Theophrasto legerit. Galenus hanc amaranthi nomine significat, nec aliter uocauit: ob id corymbos eius nunquā marcescere Plinius scriptum reliquit. Philostratus ex amarantho coronari sepulchras quoq; solitas affirmat, idēq; Thessalos instituisse primos ad tumulum Achillis.

CHRYSANTHEMOS.

DCLXX.

Chrysanthemos nec forma, nec uiribus à buphthalmum superius indicata differt uerba tantum mutata sunt, eodem manente sensu: ut ne Dioscoridis quidem caput suspicietur aliqui. Illud notauero, à Dioscoride quidem uocari hanc etiam chalcitri: sed an sit eadem, quæ Plinio chalceon in uicinis nascens, & iocinori tria imponi iussit, nescio.

PERISTEREON.

DCLXXI.

Peristereon à Græcis uocata, & columbæ in ea mansissent: item peristerium, unde columbaris uocatur: item Lucinia, & lustrago, & militaria. Sunt qui peritomonem à uolucrum pastu nomen: & à colorum uarietate panchromon à nostris uerbenā & uerbenaca, siue, ut arbitror, corrupte uermina ca dicitur. Item ferraria non feria, etiam si Dioscorides ita nominasse uideatur, quandoquidē secundum huius herbæ genus ab ipomet Dioscoride sideritis appellatur. Hac & Iouis mensis uerebatur. Verbenā porro & fagina Romani hoc est gramen ex loco sacro, præsertim ex arce capitolij cum sua terra euulsum, in publicis remedijs & in sacris legationibus, cō ad hostem clarigatumq; mitterentur, crebant: cū

natis ita fecialibus & patre patrato, uel foedera facturis, uel bella indicituris. Sed omnes quoque frondes sacratas purasq; per abusione uerbenas uocabant. Dioscorides duo facie genera, rectum & supinū. Plinius marem & foeminā: maricaules reddendo plures & tenues, itemq; cubitales & angulosos, demum quæcunq; Dioscorides supinæ: nisi q; rariora mari folia q; foeminæ adiciat. Quidam nō distinguunt, sed unū omnino genus tradunt. Vtraq; sortiuntur Galli & præcinent responsa. Hac perunctos magi putant impedire quæ uelint: amicitias conciliare: Colligi circa canisortum debere, ita ut ne luna, aut sol conspiciatur, fauis ante & melle terræ ad piamētū datis, circumscriptam ferro effodi sinistra manu, & in sublimē tolli. Sicari in umbra separatum folia, caulem & radicem. Vtrumq; genus in planis aquis nascitur. Diuisurę foliorū utriusq; similes quidem omnino quernis, sed maiores. Rectum cui præcipitur, sole arietis signū meante: non quidem ad omnia, sed ad medicamentū illud, qd ppter ea criogenes pastillus dicit.

PERISTEREON SYPINA. DCLXXIII.

Peristereon *πρίστηρον* hoc est supina, frequentior est q; superior. Latissimus est quorundā error, existimantium uerbenam & peristereon priorem esse, quam oliores sclaream modo uocant: de qua uerteris nihil dixisse (quod sciam) uehemēter miror. Folium ei betę lanuginosum, serratumq; in modum cristę, hos spica ceusē cœruleo purpureis odorata tota & uulgaris: nisi quis hanc alectorolophon, id est, cristam gallinaceam interpretetur. Alectorolophos, inquit Plinius, folia habet similia cristę gallinacę plura, caulem tenuē, & semen nigrum in siliquis. Mutat colorem, sed ex nigra albicare incipit, & intumescit, ac exit. Vtilis tussientibus & oculorū caliginē. Solidum semen coniicitur in oculum: nec turbat, sed in se caliginē contrahit: hęc Plinius. Hoc quidem ipsum facere uidetur semen eius, quā uocant herbarij sclaream, folio cristę simili ac nigro semine: uerum non in siliquis, sed in folliculis siue capitulis post florem: nisi quis siliquas in Plinio prouaculis quibuscunq; accipiat.

ASTRAGALOS. DCLXXIII.

Astragalus aliter à Plinio describitur, folio longo, incisuris multis, obliquis circa radicem, caules terni aut quaterni, foliosq; pleni, flores hyacinthi, radices uillosas, implicatas, rubētes, præduræ. Nascitur in petrosif & Arcadię Peneo, siue ut Galenus & Paulus, Pheneo. Colligitur exitu autumnii cum folia amiserit. Siccat in umbra.

HYACINTHVS. DCLXXV.

Hycinthi cum uiola nigra erumpunt uere, sed ante rosam, ut ferē omnia, quæ in coronas à montibus petuntur. Exeunt & cum gladio, sed eximie in Gallia, ubi & hyssigum eo tingitur: nam colos in ueste hyacinthinus nō ex hoc tantum hyacintho, ut ferē creditur, sed & uiola, quę syluestris hyacinthus quoq; dicitur, transiisse nomen uidetur Plinio utiq; nisi quis in eo ianthinum malit q; hyacinthum legere, ut Martialis: Coccina famosę donas & ianthina mœchæ. De quo in caltigatione Pliniana diximus. Hyacinthi & albi & ferruginei, hoc est cœrulei uisuntur: nam & lapis fruticis cognominis, cœruleo nitore fulget, ut Solinus inquit, ut qui colorē cœli dixerunt hyacinthinum, de cœruleo uideantur accipisse. Porro tam syluestres q; urbani plurimum du-

rant. Comitatur florē hunc duplex fabula, iustū præferēs eius quē Apollo dilexerit, aut ex Aiacis cruore editum ita discurrentibus uenis, ut Græcāq; literarū figura ea legatur inscripta. Pausanias florem qui natus sit extincto Aiace apud Salamina, credi refert editum primo, nec hyacinthum, sed literis hyacintho similem uideri, ex candido rubentē ac lilio mino rem. Idem autor cosmosandalon dici florē apud Hermonēses Troezenijs confines, quem ipse hyacinthum uidetur interpretari. Eo flore coronatos festa quæ Chthonia uocant, agere. De cosmosandalis & Cratinus & Clearchus. Palladius hyacinthū & irim & gladiolum à similitudine foliorū uocari dicit. Qui Seruū grammaticū accusant q; hyacinthum esse dixerit, quē Vergilius uacinium in camine uocari, Dioscoridem acculant affirmantē hyacinthum à Romanis uacinium appellari. Plinius quoq; Vacinia, inquit, aucupijs Italij feruntur, Gallie uero etiam purpurea tingendis seruorū uestibus. Item alibi: Transalpina Gallia herbis tyrium atq; conchyliū tingit, omnesq; alios colores. Item alibi: Mire, inquit, hyacinthus in Gallia prouenit: quo ibi pro cocco hyssigum tingit. Est autem hyssiginus color, à quo Græci uestes *hyssigines* appellant hoc tinctas colore. Quō sit ut recte senserit grammaticus hac parte, uacinium Maroni pro hyacintho acceptū fuisse: nec obstat q; nigra dicat poeta: quando purpuream quoq; uiolam est, ubi autores nigram uocare soleant.

PAPAVER RHOEAS. DCLXXVI.

Papauer *ῥοῖα*, hoc est erraticum, capite, ut Theophrastus inquit, unguis pollicaris ampliudine, legitur uiridisculum ante mensem hordei. Hoc & satius albitur, q; inter syluestria & satua melius fortasse quasi medij constituas: quoniam spon te quidem, sed in aruis nascatur. Admonendi tamē sumus, rhoeadis cognomēto non hoc tantum papaueris genus uenire solitum, sed & alia duo syluestria, ut mox liquebit: hoc, quoniam flores eius breui decidit: illa quoniam fluat ex ipsis conuulnato scaפו succus lacteus, opion appellatus.

PAPAVER SATIVM. DCLXXVII.

Satiuum omē magis rotundat capita: id syluestri longū, ac pusillū ad effectus omnes ualentius. Optimū in siccis, & ubi raro pluit. Papaueris fatiui tria fecere genera: candidū, cuius semen toltū in secunda mensa cum melle tagematis loco edebat. Hoc & panis rustici crustas ouo assuso cōmendabat. Alterū nigrum, cuius sca po in ciso lac exprimitur. Tertium rhoeas, de quo diximus, q; nisi maturuisset, edomitū existimari nullo modo posset. Galenus & Dioscorides papaueris genera sex enumerant, rhoeadā, ceratitriā, aphrodisiatiū siue thylactinā, & duo alia syluestria: capite fissili unum, oblongo alterū, quæ & rhoeas uocant aliqui: propterea q; & duob; ijs quæ situm lac, sca po inciso fluat.

DE OPIO ET MECONIO. DCLXXVIII.

Differt meconium ab opio, si proprie loquaris, sicut apud nos succus à lacte, quod & sapor & lachryma quoq; dicitur. Succus & meconion uocatur, qui decocto uel crudo papauere, ut in ceteris exprimitur. Lac uero & opion, quod calicē inciso manat & papauere nigro, ut Diagoras suadet, cū turgescit: ut lollas, cum deflorescit. Incidi iubent sub capite & calice: nec in alio genere ipsum inciditur caput. Humor hic & herbæ cuiusq; lana excipitur: aut
si exigui

si exiguus est, unguis pollicis aut lactucis, & postero die magis quod inaruit: pastilli siccantur in umbra. Accenditur syncerum diffusilius & crebro extinguitur. In aqua innatat nebula. Aestiuo sole sudat & se diluit, donec simile recenti succo fiat. Confectum in posca coit. Meflides oprime feruari putat. hyosciam femine adiecto: alij in faba. Adulteratur hoc Alexandriae. Thebanū opium celebrari ad multa uideo, praesertim in collyrijs duobus, quae Lynceus & Proteus ab Aegineta Paulo cognominantur. Sicut Hermolaeus & Antoninus ab Aërio, in quo non opium modo, sed acacia quoque poscitur ad repercussum. Achaicū quoque Aslanum opium auctores Graeci nominant.

PAPAVER CERATITIS. DCLXXIX

Papauer ceratitidis, siue ceraticon hoc est corniculatum, syluestre est, cubitali altitudine, folio uerbasci nigri, minus atro, radice breui & corricosa: Temperatum mellibus: folia huic minima & tenuiora quae ceteris syluestribus. Nascitur & nitrolo co, & glaucion a quibusdam appellatur, haud prope.

PAPAVER APHRODES. DCLXXX.

Papauer hoc Heracleon siue aphtodes, hoc est Herculeū & spumosum dicitur: cuius folia herbace radiculæ, quæ Graeci struthion uocant, similia sunt Dioscoridi Theophrastoy, ut multi censent. Et quia struthion etiam passerem significat, Plinius hac parte, folijs, inquit, si procul intuear, specie passerum representantibus. Verba porro Theophrasti hæc sunt: Papauer, inquit, Heracleon φάλλον ἔχει, ὅθεν ἔρως τὰ δὲ ὀνόματι αὐτοῦ ἔρως, hoc est, foliū habet quale struthion, quo lina candefaciunt. Plinius hæc non de radica, ut dixi, quæ lanis demum lauandis aptissima ē, curans eas, & conferens candore mollitiæq, ut tradit ipse Plinius xix. libro, sed de passeribus intelligit. Ex ipso autem papauere lina, inquit, splendore trahunt. Quia tamē Plinio contradicere non prius audeo, quā si possum, contempler oculos, passerē an radiculæ speciem papauer illud præbeat, uerbum Graeci posimus in Latino, ut liberē esset exquisitis arbitrium. Semē huic spumeum. Aestate tunditur in pila. Utilissimum hoc, medicamento nobili quod diacodion & asteriacen uocant. Etenim capita papaueris, & codias, & asteriscos Graeci appellant. Quin & humanū caput potētæ interim codian uocant, ut inquit Pol-lux. Fit autem huius papaueris, aut cuiuscunque syluestris capitibus coctis. In aquæ celestis sextarijs tribus biduo maceratis, in eademq, decoctis, deinde siccatissimum cum melle coctis, ad dimidias partes uapore tenui. Addidere postea drachmas senas croci, hypocistidis, thuris, acaciae, & passi Cretici sextariū. Aëtiū papauer hoc, ut arbitrator, intelligit, cum meaphroditicon commendat herbam, contra uiperas in potu prebens, fortasse quia uomitionibus probetur.

HYSCYAMON. DCLXXXI.

HYOSCYAMON. DCLXXXII.

Alter Dioscorides (ut Galenus inquit) hyosciamon apud Hippocratē uidetur interpretatus, id quod ille ὀφειονον κληῖται, hoc est fabæ semen appellauit. Hyosciamon uero Graeci uidetur appellasse, hoc est fabam suillam, propterea quod, ut Helianus ait, pastu cuius herbæ resoluantur & conuellantur apris: Sed remedium nouere, aquas enim statim adeunt, & canctos ueniantur, atque ita protinus

saluti restituntur.

PSYLLIVM. DCLXXXIII.

Psyllum radice tenui, superuacua, farmetofium, 508 fabæ grauis in cacuminibus, flores canino capiti, ut Plinius, non dissimiles, ob id cynocephalon uocatur, & cynoides. Corrigendū enim legem in Plinio putamus, ubi non floribus, sed folijs canino capiti similibus describitur: alioqui in exemplaribus manu scriptis floribus non folijs. Semen in baccis effigie pulicis, unde nomen. Prouenit in uitarijs. Mendosum & illa quoque parte Plinii existimo, cum dicit psyllibus lacteum succū esse, qui densatus in gummi, & sumptus cum melle, uomitiones faciat, preferit quibilibet trahat. Quid enim sint psylles non comperi.

STRYCHNON. DCLXXXIII.

Strychnon, siue ut Galenus strychnon, satium, 510 quod & melan hoc est nigrū, cognominant, à nostris solani dicitur, familiare cibis, in Aegypto maxime. Nihil mali corporibus esse prædicat Xenocrates, cui hoc salutare non fit. Hos uic est candidus, acini siue poma potius herbacea, & quadrenus aculeata, in quibus semen. Hoc Romæ uidimus in horto oratoris galli.

STRYCHNON HALICACABVM.

LICACABVM. DCLXXXV.

Strychnon halicacabon folijs ocimi describitur 511 à Plinio, commendatū quidē & hoc cibis ab alijs, licet hortense præferatur. Radicē halicacabi bibunt qui sunt uaticinandi callentes, qui furere ad confirmandā superstitionē aspici se uolunt. Aspidura naturæ intantum aduersa hæc herba est, ut radice propius admoda fopentur.

STRYCHNON SOPORIFERVM.

RIFERVM. DCLXXXVI.

Strychnon hypnoticon, id est soporiferū, ab alijs smorion, ab alijs moly appellatur, coronarijs in Aegypto expetitur, in uitante similitudine florū hederæ. Velocius hoc ad mortē quā opium: inuenio & strychnen & eubepaton, & callion uocatam: nostris uesicariam à folliculis: uel quia uesicæ profit & calculis. Theodorus omnes strychnos uesicarias appellat. Radix huius sanguinis modo rubra, Theophrasto candida, cum inarescit. Semen coccineum, folia mallcoroneila tucæ uel caprinæ, sed hirsuta, magno cespite, in rupibus sepulcretisq, nascitur. Genus hoc Dioscorides libro primo halicatabum uocauit: eademq, ad uerbum ferē scriptis, quod nunc in soporifero legitur. Sed halicacabus tamē uera est, quæ proximo capite superius descripta est, ut Galenus inquit. Laudant hoc à loco ad fruendum, & tamarisfo.

STRYCHNON MANICON.

NICON. DCLXXXVII.

Strychnon manicon, infansiosa herba, quam & 512 doryon, siue potius dorycnion uocabant: quia cuspides in prælijs eo tingerentur, passim nascēte. Alij perisson appellabant: folium erucæ maiusculum, capite gethyi maiore pilosioreq, ut Theophrastus scribit, qui hoc edant uideri sibi pulcherrimos affirmans. Hoc & coronarijs placebat. Erythron dicebant & neurita, qui nequiter occultabant, ut inquit Plinius. Frutex est furculosus uerius quā herba, ut Plinius tradit, folliculis magnis latisq, ac turbinatis, grā di intus acino, qui maturescit Nouembri mense.

DORYCNION. DCLXXXVIII.

512

Dorycnion, siue dorycnidion, tam per c. q̄ per
chetiam pro strychno manico acceptum à
quibusdam ueteribus inuenio. Dioscorides &
Galenus uidentur aliud ab eo genus existimasse: di-
ctum fortasse ita, q̄ cuspidates telorum inficere mos
esset illo, ut in manico strychno diximus. Dorycni-
o gustus lactis est, & contracto emanat.

MANDRAGORAS. DCLXXXIX.

Mandragora fructus niger, sapore quodam
uini, effigie oui: non ut Theodorus putat ra-
cemi, *βορρυγιδίου* aut *βορβυλίου*, pro eo quod
erat *βορβύλιον*, in Theophrasto legens. Fœminæ folia hir-
suta, radices carnosæ, teneræ, cubitales fere. Mala hæc
fert auellana: nucum magnitudine: mas arsen, &
hypoplonon quoq; dictus, folio latiore, ut lapathi
satius. Cauent effossuri contrarij uentum tribus cir-
culis ante gladio circumscribentes ad occasum spe-
ctantes. Succus non ubiq; inuenitur, sed ubi potest.
Circa uindemias queritur. Odor grauis eius, sed radi-
cis & mali grauior. Succum excipiunt de ciso caulis
cacumine: adeo caulem habere nō dubitant, etiam si
Dioscorides id negat. Hic & hirsutus fœminæ tribuitur.
Folior: succus rosicidorum pestis est, ut inquit
Plinius. Mandragoram conclamari frigoris uenentū
esse nemo non scit. Inuenio herbæ nomē andracelon
à similitudine uirili dictæ: an eadem hæc sit cū man-
dragora, non legisse est cur esse sentiam: quippe cū
& anthropomorphon dicatur, nisi quis andracelon,
quia frangat, & occidat hominē, dictam putarit, cu-
iusmodi uim multæ habent herbæ: nam & annus ui-
tæ lxiij, ut est apud Macernū, andraclēs uidetur appel-
latus, quia duplici ratione climatericus sit, & maxi-
me frangat homines. Alioqui ab hominis effigie
andricelon potius q̄ andracelon dici potuisset: in quo
& illud notandū andricelon apud Græcos, ut Aristot-
eles & Iulius Pollux testantur coloris genus est, quē
nos purpurisum dictamus: atq; ita placuisse Theodo-
ro quoq; nostro liquet.

MORION IDEST ALTER

MANDRAGORAS. DCXC.

De morio mandragora nihil habeo quod addi
possit ijs quæ à Dioscoride notantur: sed quo-
niā mala terrestria & canina mandragoræ
fructus appellantur, in mentem subeunt, quæ uulgo
melenzana uocantur: hoc est ut ipse puto, mala in
sana: de quibus nihil ueteribus scriptū fuisse iam desi-
no mirari. q̄ multa huiusmodi reperio, sicut hercle
multa quondā fere, quæ modo uel ignorantur, uel
certe non habentur. Mala ergo insana & frutice uulga-
ri sunt, passim nascente, ut melones & cucurbitæ: pa-
ri quoq; cultu, folijs propē ficulneis, flore oblongo,
specioso, candido. Manditur uulgo pomū ex oleo, sa-
le, pipere, fungorum modo coctum,

ACONITVM. DCXCI.

513

Aconiti primū genus pardalianches, & thely-
phonon, siue potius theriphonon cognomi-
natur: cæteræ Theophrastus simpliciter, & si-
ne aconiti mentione thelyphonon, & scorpion à ra-
dicis similitudine uocauit, geniculatū tradens grami-
nis modo, locis umbrosis, & cætera quæ hic à Dio-
scoride traduntur. Hoc solum genus à Plinio demonstra-
tum est, hirsuta leuiter eius folia prodendo. Vocatur
& mycetonos: quoniā ē longinquo mures olore ne-
cat, inuenio & mycophonon uocari genus herbæ,

quam & sciada quidam nominant: nec quæ sit ea do-
cent, præterq̄ q̄ Phnias in libro de stirpibus hæcha-
bet uerba: Pileari forma sunt semen, anisi, fœniculi,
coriandri, caualdis, cicuta, pastinacæ, sciadis quæ
& mycophonon uocant. Plinius & Theophrastus
mycophonon cui neruosus est cauliculus. Aconitum
potro Theophrastus in Creta & Zacyntho nasci ma-
xime putant, de lycotono, ut arbitror, locutus: sed
optimū in Ponto circa Heracleam, ubi monstrat Her-
culus ad inferos aditus, quasi ex spumis Cerberi canis
ortum. Hoc à thelyphono, ut testatus modo sum, dif-
ferre arbitror: constat enim folio syluæ stris intubi: q̄-
q̄ Aëtius nō seridis (id enim significat intubum) sed
iridis syluæ stris accipit. Radice non nucis, ut Theodo-
rus transtulit, sed gammari marini speciei, quoniā ca-
ryas pro caridas, uel carabidas legisset. In quo notā-
dum carabos, qui & grapæi sunt, interim pro locu-
stis, interim pro gammari à ueteribus acceptos, ut
Athenæus auctor est. Carides uero squillæ sunt, quas
& curidas, & coridas, & colybdenas quidam uocant:
etiam si marinum genitale Nicander colybdenam pu-
tauit. Aconito sane breuis herba, nec superfluens, sed
ut frumento: semen ei tamen in spica non est. Nasci-
tur ubiq; nec tamen in cauitibus nudis, quas aconas
uocant, unde aconitū nonnulli uolunt appellatum.
Alij quā in petrosis parte plurima nascēti, nullus iux-
ta pulvis esset. Alij à pago, esse oppidulo, fere portu
Periandynorū ad Heracleam ita nominato. Alij quo-
niā uis eadem in mortem esset, quæ cotibus ad aci-
em ferri decutiendā, statimq; admota uelocitatis senti-
retur. Fructū eius & folium nihil nocere prædicant
uim mortiferam in radice haberi. Ad erodendū uti ea
medicos: præparari uero posse ut tollat biennio, an-
no, mensibus sex, tribus, duobus, uno (ratione etiā
peritioribus occulta) miserius perire, qui pote eo diu-
tius uitam extrahant. Differri, celeratq; sumentibus
exitium, pro ut sero aut ocyus collectū fuerit. Debel-
lari pestem eam nō alia radice, ut quidā expromp-
te, sed aut uino, aut melle, successu raro: alioqui re-
perto in uisceribus ueneno, ceu pari inuento, non pe-
rimit, sed colluctatur cum eo tantum: Ita duo uene-
na commoruntur, ut animal superfit. Omnij potro
ueneno: ocyssimum esse aconitum, ut tactis quoq;
genitalib; fœminini sexus animalij, eodem die mor-
rem inferat, quo modo interemptas à Calphurnio
bestia dormientes uxores. M. Cælius obicit. Fugiti-
uos eo in uinculis uti solitos desponso animo aconit-
um seruantibus, instituta capitis poena. Quod autē
sit herbæ genus aconas uocari, non reperit: Etenim
ut Athenæus inquit, grammaticos mos est, poetās
& autores alios enarrantij, cum quid huiusmodi oc-
currerit, quasi conuiniendo præterire, nihil aliud re-
stantes q̄ aut lapidis, aut animalis, aut floris genus
esse: quō fit ut parum fidelis grammaticis in hac erudi-
tionis parte semper habuerim. Aconiti intensionē pri-
ma dicitur Hecate, ueneno: insigni crudelitate fœ-
mina, quæ Persam patrem Solis filium perinde crude-
lissimum ueneno sustulit, auctor Dioscorus: propterea
& Ouidius in Metamorphosi cum herbam dixit
Hecateida, uidetur aconitum accepisse.

ACONITVM CYN.

CTONON. DCXCII.

Huius aconiti quæ formā, neq; medicinas Dio-
scorides exequitur: librariorū, ut arbitror, cul-
pa fuit, tria capita scribentij, cum duotanti aconiti
summa

517

summa genera dicitur Galeno teste, pardalianches
ait lycoctonon.

ACONITVM LYCOCTONON. DCXCIII.

DE lycoctono, cuius species treis haberi con-
stat, in primo aconiti genere differui, Theo-
phrastum & Plinium secutus. Lycoctonos di-
cta est, quia lupos enecat. Habent & nostri rustici ad
eundem usum, lupariam uocatam, folio uitis, multas
habente diuisuras, & macula candidas, flore oblon-
go, luteo. Aëtius: Aconitū, inquit, sunt qui aconito-
mon, & irin syluestre, & pharmacidam uocent, radi-
cula ferē graminis. C I C V T A. DCXCIII.

Cicutā Græce copion: inuisa & hęc publica Athe-
niensium poena. Semen habet noxiū. Caulis
eius uiridis, & urit plerumq, ut in platanis, Le-
uis hic est & geniculatus, ut harundin, nigricans, alio-
rius fœpe binis cubitis. Hinc & spariū, quod est inter
cannas, ut Seruius existimat, genicula, cicutam uo-
cari à Marone. Folia coriandri tentiora, semen aniso-
crassius, radice nullius usus, ut Plinio uidetur. Semi-
ni & folijs refrigeratoria uis, quæ si enecat, incipiunt
extrema corporis algere. In uino pota iremē diabi-
lis existimatur. Succus exprimitur folijs horribusq;
tunc enim maxime tempestiuius est & melior. Semi-
nē trito expressus, & sole densatus, nocentior q̃ semē
ipsum, ut in Thapsia: cum in reliquis contrā sit: necat
enim sanguinem expellendo. Hęc altera uis est, &
ideo sic necator: maculæ in corporibus apparent:
ad dissoluenda medicamenta utuntur illo pro aqua.
Fuerit autem cicutā herba, cuius gustatu exercitus
M. Antonij cum fame laboraret, penē sit extinctus in
Parthia, nō traditur: alioqui reuēdiū, ut Plutarchus
ait, in uino tantū erat. Plinius quoq; Maxima, inquit,
cicutæ uis terrę Parthorum, mox Laconicę, Creticę,
Asiaticę. In Græcia uero Megaricę, deinde Atticę.
Thrasycæ & discipulus eius Alexias & hanc & cæte-
ra uenena temperabant, ita ut sine aliqua offensioe
aut tæbe tollerent in quantius tempus dilata mor-
se. In cicutā præcipiebant, ut & sulfus aut prægelidis
opacisq; locis ad hūc usum reponeretur. Chij, ut The-
ophrastus scribit, non terebant eam, ut cæteri cum
regmine, sed hoc detrectā, tulsam & tenui cribro
emissam ex aqua propinabāt. In Ceo insula mos fuit,
ut sexagenarij senes conuocatis necessarijs, solenni
sacrificio cicutam epularet, & coronati biberent: Stra-
bo autor: ut ferē in Theophrasto non Chios, sed Ci-
os legendū putem. Cui consuetudini se Valerius q̃q;
Maximus secundo libro interfuisse tradit, in eius in-
sulæ oppido sulide. Cicutam funt qui etiam epheme-
ron, à celeritate interitus uocant, ut Photion autor
est. Recentiores cicutæ duo faciunt summa genera,
aquaticæ frigentis naturæ, terrestres calidæ. Terre-
stris duo item genera, maius & minus: sed quoniā au-
torem nullum præferunt idoneum, uereor ne (ut ferē
solent) hallucinari fuerint: alioqui cicutæ similem
diximus esse myrrin herbam, ob id cicutariam à no-
stris appellatam, calentis ingenij: nam uerba illa Pli-
nij: Caulis, inquit, cicutæ uiridis, & urit plerumq; ut
in platanis: quia sensum nullū cōmodiorem habent,
correximus ex Theophrasto ad hunc modum: Caulis
cicutæ uiridis & suffus plerumq; Athenas perlatus,
q̃q; cicutæ uis est & illa (si Celfo credimus libro quin-
to) exedendi corpora: aut forte feminibus & folijs frigi-
da sit potestas, caulij feruida. Illud uero minus tolera-
bile, q̃ Mauritanij uel eorū interpretes, illud rutæ ge-

nus syluestris, quod Dioscorides & Plinius armala uo-
cari scribunt, ipsi pro cicutā capiti sunt qui, (q̃ G. 1.
lenus ait tertio libro *ὑπάρων*) cicutā sturno cibum, ho-
mini uenētū esse, cō uertit: Hyoscyamū esse tur-
do cibū, homini uenētū, quod nihil esse potest fœdi,
imperitij, absurdū. S M I L A X. DCLXXXV.

Smilax siue taxus, est ubi à Theophrasto & Dio-
scoride milos appellata sit, folio eterno, extremi-
taribus & lateribus sinuato ut quercus & palu-
ri, & omnino illicis, molliore tantū profundioreq;. Dif-
fert & materia ab illice, q̃ soluta & nigra in opertibus
est taxo, præsertim in Arcadia, ubi & nigra est apu-
nicea. Flauet in Idæa tam similis cedro ut imponat mer-
cantibus, præsertim medulla. Getmē ei maxime fero-
cinum. Floret paulo ante solstitiū. Fructificat à uergē-
liarū obitu. Facillime augescit, procerā, similis abietī,
minus excelsa, sed alis crebriorib;. Folij q̃q; ut scribit
Plinius, abietis, sed pinguius ac minus uirens: strigo-
sa, tristis & dira, nullo succo, baccifera. Radices ei gra-
ciles, per summa cespiti breues. Circa Idam rariā, in
Macedonia & Arcadia frequentior: Rotundo fructu,
& paulo ampliore q̃ faba, colore ruffo, tactu molli,
ueterinis lætior non item ruminantibus. Sunt qui
eum quoq; mandant suauī cibo, & innocent prædi-
cant. Vmbrosissimis locis prouent. Fumus ex eo mu-
res perimit. Mari fructus, ut Plinio uidetur, noxiū,
lætale uisum. Baccis in Hispania præcipue uenētū
inest. Vasa etiam uatoria ex ea uinis in Gallia facta,
compertū est mortifera fuisse. Sunt qui taxica hinc
appellata putent, quæ nunc toxica uocant, quib; sa-
gittæ tinguntur in Arcadia ueneni uel præsentissimū.
Reperitū innoxiam fieri, si in ipsam arborem clauus
æreus adigatur. Conglutinamēta siue succos ex
ca sermēs & subellijs parant: nunc & arcus & scœ-
piones: nec taxus uulgo sed literæ prioris immutati-
one naxus & naxius quoq; dicitur, quod nomen &
Dioscoridi fuisse cognitū uideo, ubi uenena libro sex-
to numerat, eodē loco nō taxū sed toxum à Roma-
nis dici credidit: nec thymalū ut hic, sed thymilō scri-
bendū, q̃d & Aëtius q̃q; sequit. Paulus thymilō. Gale-
nus taxū etiā dici cacton inquit. Paulus cacton sping
gen^o esse, quā Dioscorides lib. vi. uocauit axon, cuius
pappi recētes in cibo sumpti strangulāt, in quibusdā
ex plariis ixiæ notati. Verisimile est hāc esse cactū
de qua Theophrastus & Plini^o loquunt: Cactos, inq̃;
Siciliæ tū nascitur suæ proprietatis, cuius in terra ser-
punt caules ē radice, lato folio & spinoso, q̃s uocant
cactos: nec cibo desquāmatos fastidiūt, gustu amarū
usculo: sed & seruati sale uescēdo sunt. Vnū caulē recētū
habent, qui pternix dicitur eiusdē suauitatis, sed uetu-
statis impatientē. Semē ei lanuginis quā pappo uo-
cāt: q̃d enā cō & cortice, teneritas cerebro palmarū
similis relinquit. Vocatē scālā, siue ut Plini^o pascālā. Ali-
bi Plinius: Sūt, inquit, & cedug palmarū q̃q; syling, get-
minātes rursus ab radice succisæ. Dulcis medulla ea-
rum in cacumine q̃dā crū appellāt, expta q̃ uiuunt,
q̃d nō aliz. Vocant autē chamæriphe serā à Theopha-
sto folio latiore ac molli, ad uitia utilissim^o, copiose
in Creta, sed magis in Sicilia. Nūc uulg^o Siculū Roma-
nūq; ciphilionē mercatu et frequētinoiat. Aliq pal-
midii ab quadā palma spadicū similitudine, ut ex quī-
bus scopæ fiat. Margyllo Hispaniæ mō appellāt cœ-
do, quia bacculas rubētes margaritis similes ferāt, du-
mulus uocatas, q̃bus filo in missis scæming supplica-
tōes pcesq; suas nuntiat, Plinius quodā loco: Marga-
rida

rides, inquit, palmæ breues, candidæ, rotundæ, acinis q̄ balanis similiore, quare & nomina, inquit, à margaritis accipere diuersum tamen genus hoc ab Hispano illo fecerim, q̄ in meridiano tantū orbe margarides nascuntur, & quidē una tantū eius arbore in Chora, ut idem Plinius affirmat. Iam hoc q̄ dixi palmidum notati, non Siciliæ quod peculiare, sed Aegypti & Hispaniæ. In Italia quoq̄ nasci perhibent non procul Terracina. Mirum quod traditur in Aegyptio ipfisctiam palmæ: quarundā in nasci truncis, sed minoris operis ad mandendū. In orbe reliquo duorum generū, sed eodem cespite proueniunt mas & femina. Sexum distinguit semine quod pappo, ut diximus appellat. Fallit hoc imprudentes, opertum cortice multiplici, tunicis ferrugineis interuentientibus. Cortex folij modo in latum ex angusto panditur, & armatur aculeis: ideoq̄ latum & spinosum à Theophrasto dictū est. Ex huius crassitudine in Aegyptio charta modoringitur uilis, ad contegendas inuoluendasq̄ legestrū usu merces. Ex tunicis quas intercurfare diximus in eadem provincia, funes rudentesq̄ neciuntur. Caulis ipse ceduus quorannis, alioqui adolefcit crassitudine intantum, ut a boris iustæ truncum æquet ambitu.

A P O C Y N O N.

DCLXXXVI.

520

A Pocynon semine acuto, diuilo, lanugo inoso, grani odore, urgis minus longis q̄ hedera. Quadrupes necat, si uelcatur, omnes. Est & uenenū hominibus. Dicitur & cynocrambe à Caleno, ab aliquibus hippomanes: q̄q̄ & uirus defluens ab equis inguinibus, quo tempore amoris insania ferunt, hippomanes appellant. Apud Hesiodū certe hippomaues herba est, quæ edentes equi aguntur in furorem. Dicitur & capparis hippomanes. Est & saltationis genus apud comicos apocinon, sed scriptura distinguitur.

NERION SIVE RHODODENDRON.

DCLXXXVII.

Nerion Sabina quoq̄ herba dicitur. Sempernum fronde, caulibus fruticosum. Melinsanum è Ponto contrahitur, rhododendri flore, quo scaten sylus. Hoc uenome quidem apud eos inuenit Latinū, ut Plinius tradit. Galenus hanc intelligit quoties rhododaphnen nominat aut nerion, duobus eam locis prodens. Phorion rhodoniam quoq̄ dici meminit: quosdā tamen rhodoniam interpretatos inquit fuisse uitem, si uas uas ferentem. Dioscorides rhododaphnen à quibusdā uocari spongon scribit. Aëtius spongitin herbam dicendo, proci dentia sedis utilem, quid intelligam haud scio.

F Y N G I.

DCLXXXVIII.

251

Fyngi cortice, medulla, nervo, uena, carent, pediculo admodum æquali: q̄ qui ex ipsi pezicæ à Græcis uocantur, nec pediculū nec radicem habent. Fungos Græci mycetas uocat, nec distinguitur quanq̄ Paulus etiam boleros cognouit, bolitas appellando, quibus & principatū inter fungos dedit, si cut secundum locū q̄s qui amantia nominant. Sūt & egiritæ, sed industria fermento in ipsi populi nigrae truncis diluto aqua, protinus coalescentes. Quo runda facile noscuntur uenena, diluto rubore, rancido aspectu, liuido intus colore, rimosa stria, pallido per ambitū labro. Non sunt hæc in quibz uisda sicci & niri similes ueluti guttas in uertice albas ex tunicis sua gerunt: uolam em terra ob hoc prius gignit,

ipsum postea in uolua, ceti in quo est luteū, nectunice minor gratia in cibo infantis boleti. Rumpitur hæc primo nascente, mox crescente in pediculo corpus absumentur, raroq̄ unq̄ gemini ex uno pede. Origo prima è limo & accenset succo madentis terræ, aut radicis ferme glandifere. Antio spuma lentior, deinde corpus membranæ simile, mox partit ut dixim. Deprehendisse perniciosas, nisi agrestes possunt, atq̄ qui colligit. Caligaris clausus & rubigo ferriat cha lybs uenenatos faciunt. Boletis ortus occasusq̄ in cluditur septem diebus. Fungos lenior natura & numerosa genera, nec nisi ex arbori fere pituita. Tutissimi qui robust, callo minus diluto q̄ boletis rubore, mox candidi uelut apice flaminis insignibus pediculis. Tertium genus nullis accommodatū uenenis. Quidā discrete arbori generibus, fito, ferula & gummi ris: non item fago aut robore, aut cupressu. Omnium colos liuidus: sed siq̄s abert argumentū uenenū q̄ o si miliores arbori fico fuerint. Noxiterunt fungo qui it coquendo diuiores sunt. Innocentiores qui nitro ad dito coquentur, si utiq̄ percōquatur. Imbribus proueniunt omnia hæc. Siccantur pendentes sulli iunco trāfixi, quales à Bithynia ueniunt. Succineis nouaculis & argæto apparatur fungos ipsæ suis manibus delicia coquebant: unde Græci hos deos: cibo nasci distant, ut Tranquillus in Nerone meminit. Porphyrius non cibum sed filios deos: fungos & tubera uocabat, quia prouenire uidentur sine semine. Nata forte diuersitas, quod uerbū *hōiōs* & *eū* qui alit & cum qui alitur significat, accentu modo commeanite. Porro deos & cibos & alumni ideo uideri possunt, quoniam & eos quoq̄s pater ignotus est, filios terræ dicimus, quod quidem & Cicero in quadā ad Atticum epistola confirmat de Lica. Recetiores alia quoq̄ nomina uel genera dedere: ouatos, ab oui similitudine: spongiosos, à spongia: digitellos, à digitis: porriginosos, à porrigine: pezicas quas sessiles & pediculis carentes. Lacinia priuatim dicuntur è castanea, magnitudine spectabiles, ut singuli sufficiant. Innocentissimi sunt erubis & carduis uere nati, rotunditate clusili, quos inde fruntulos, & spinulos appellant, & cardeolos. Oritur & laxo, id est, lapide tyncurio, siue lynceæ uulgari uoce dicto fungus, admirabili natura. Præciditur hic in esum, & alius subnascitur anno toto: pediculi pars relicta duratur in silicem, atq̄ ita semper crescit lapis, restibili secunditate: nec credimus anteq̄ domi natos ita mādūcaremus. Nouum & hoc uita sibi cōperit, inuicemq̄ multa perdidit: q̄q̄ est ubi Plinius hoc innuat, ut in castigatione Pliniana xxij. libri diximus. Sunt & ignari qui dam fungi, quibus strigilium uice tostrina utitur.

COLCHICON.

DCLXXXIX.

Colchicon & ephemeron, de quo mox prodetur, Hermodactyligena à neotericis uocantur. Galenus & Paulus ephemeron duplex faciunt, Dioscoridē sequuti: unum delibutorij ueneni ui, de quo hic alter: quod irin syluestrem cognominant, de quo proxime dicemus. Colchicon sancta heri modo passim prædicant, ephemeron nesciri. Hermodactyli porro, ex quibus pilulæ ad podagras tan toperere cōmendantur ab Aëtio & Paulo, quinque foliū sit an ephemeron, parum mihi constare: alioqui recetiores pro ephemerone accipiunt. Dioscorides quinque foliū Hermodactylon q̄q̄ dicit, & morbis articularibz & coxædici cōuenire prodit, ephemeron tumoribz,

EPHEMERON.

DCC.

EpheMERON folijs liſij minoribus, ſemine ſuperuacuo: dictū ita, quod intra diem iugulet, ut Theophrastus putat. Sed illud alterz genus est & Colchicon proprie crediderim, folio ellebori. Radicula oñibus nota. Seruoz in desperatione confugium. Hoc ipsum Colchicon & Plinius ephemerī appellatione intelligit, quoz medicinas contra ephemerōn impactum cōmemorat. Ephemerō radix longa, non ut Colchico rotunda. Quidam ephemerī uocabulo delibatorij ueneni compositionem quādam capiunt, ut Aëtius testatur.

LENS PALVSTRIS. DCCII.

Lens palustris quoddam ruyetur à Gracis uocat, sine radice, sine folijs: etiam si id quod in ea fructificat, simile folio conspicitur, minus habili humore, q̃ ut in eo solum conſtari poſſit. Quidā genus aliud non quidem in aqua nascens, sed in uliginosis dilutisq; maius eo tradunt, carens folio, dicitur quoddam hoc est sylvaricam lentem uocantes.

AIZOON MAIVS. DCCIII.

Aizoon maius aliqui louis caulem siue oculū, alij digitellum, alij ſpegetō siue hypogeffon, quod in subgrūdijs ferē nascitur. Aliqui amemnon à ſolitudine depulſū. Sūt q̃ triſthales à terro flore: sunt q̃ aithales ab æternitate. Sunt qui erothales & erogennetō à uerno tēpore, aut q̃m a matoris conueniat. Latini & ſedū maius, alij ſadum, Opili? Aurelius ſeſum iū, nonnulli ſemperuiū, uulg⁹ auriculā ē. Huic crassitudo caulis pluſq; pollicatis: folia carnosa, larga ſucco, leuia, oblonga. Sedum herbam fuſſe putant eam, quæ Glaucō immortalitatem dedit marino deo. Fuit & alter Glaucus in fabulis, qui Dracone medico monſtrante, contactu herbæ, cuius non redditur nomen, reuixit ſub Minōē.

AIZOON MINVS. DCCIII.

Aizoon minus herideis & heriſſthales, & chryſorhales uocatur, à quibusdam tres siue triſthales quia ter floreat. Hoc in muris parietisq; nascitur & regulis. Fruticosum à radice & sursum uſq; ad cacumen, folijs anguſtis, ſuccoſis, radice inuſſi. Vermicularis uulgo dicitur. Sunt qui iſſſicin, ut Plinius, aut hyſſicin, aut iſoteos, tribus enim modis ſcriptum inuenitur, forteq; geſſicin melius dē q̃ γέσσιον appellas, hoc est à grūdis: quando & maius quoq; aizoon hypogeffum dici oſtendimus, hoc est ſubgrūdiarium.

AIZOON LEPTOPHYLLON SIVE PORTULACA SYLVESTRIS. DCCIII.

Tertium genus aizoi, andrachne agria, hoc est ſylueſtris portulaca dicitur, de qua etiam ſuperius ſiſdem uerbis à Dioſcoride ſcriptum eſt.

COTYLEDON. DCCV.

Cotyledon parula herba, cauliculo tenero, folijs pinguibus. Nascitur in maritimis petroſiſq; uiridis: non eſt hæc, ut quidam rentur, ea quæ uulgo cimbariſa appellatur: etiam ſi cimbalion à Dioſcoride uocetur. Eſt autem cimbariſa herba ſolitenus anguloſo, hederaceo, flore paruo, purpureo, in muris terræ naſcens, quam quidem nonnulli genus alterum capni dictæ faciunt, ut in capno teſtati ſumus.

COTYLEDON SECUNDA. DCCVI.

Cotyledon ſecunda, caule longiore ſed pergracili, guſtu aſperrimi. Huius uſu Hippocrates in cibo ſcemininum ſexum concipi, ſicut prio-

re maſculinum prodidit.

URTICA SIVE ACALYPHA. DCCVII.

Urtica ex omnibus aculeatis generibus noſſiſſima eſt, acerbulis in flore purpuream lanuginem fundentibus: Sæpe altior binis cubitis. Mitior ſcœmina eſt. Inter ſylueſtres quæ dicitur cania acrior, caule quoq; mordaci, ſimbriatis folijs: quæ uero etiam odorem mittit, Herculeana uocatur. Semen omnibus copioſum, nigrum. Mirum ſine ullis ſpinarum aculeis lanuginem ipſam noxiam & tactu tantum leui, pruritem poſtulaſq; aduſto ſimiles exiſtere. Notum eſt remedium olei: ſed mordacitas non protinus cum ipſa herba gignitur, nec niſi ſolibus roborata. Incipiens quidem ipſa naſci uere, nō ingrato, multis etiam religioſo in cibo eſt, ad pellendos totius anni morbos. Sylueſtrium quoq; radix omnem carnem teneriorem facit ſimul cocta: quæ uero ex ſis miſſiſſima, & folijs non mordentibus lauium, ſiue aonium uocatur, à quibusdam urtica iners & mortua. Album hæc habet in medio folio, ſacris ignibus utile. Quidam & noſtris diſcreuere genera temporibus, autumale appellando, & reliquas ad eandem rationem: celebrat & marinam cognomine Plinius ad uſeſq; uitia. Condiſ laudes urticæ, Phaniſ phyſicus, ut iſſiſſimam cibis coctam inuere ratamq; profeſſus. Si quadrupes ſœtum non admittant, urtica naturalia earum fricanda monſtrat. In Oera monte ſterilium nec iniri ſe patientium caprarum ubera terētes ea lac eliciunt. Ex urtica in Aegypto fit oleum. Semen colligi meſſibus oportet. Alexandrinum maxime laudatur ad omnia. Urticam Hippocrates nidam uidetur appellafſe, cum alij cniſdam uocet. Eſt ubi clidam legas corrūpe ut cenſeo: niſi aliud genus ſit: Grana, inquit, clidē ſexaginta clyſteræ uoluis inſiciantur, quas bilis infeſta uerit.

GALIOPSIS. DCCVIII.

Galiopsis & galion uocatam inuenio hanc.

GALION. DCCIX.

ERIGERON. DCCX.

Erigeron à noſtris ferē triſſaginis ſpecie deſcribitur, & cum molliſſia naſci fertur in regulis murisq; cauliculis ſubrubentibus, lanugine qualis eſt ſpinæ, inter diuiſuras capitibus deſcende. Ob id Galli xuleam, Callimachus acanthiden, alij pappum uocant. Hæc deinde Gracis de ea conſtare Plinius affirmat, alios erucæ folijs, alios roboris, ſed minoribus multo dixiſſe. Item radice alios ſuperuacua, alios neruis utili, alios potu ſtrangulante. Nec deſuere qui alterum genus facerent, nec quale eſſet demonſtrarent, dantes contra ſerpentes bibendam: edendam uero comitalibus. Aggredimur medicinas, quia notæ deſunt. Nicander uideſt hanc intellexiſſe, cum geraon pogona dixit: nam & nos ſenecionem uocamus, aut tragopogoni ſimilem herbulam, quæ uulgo barba ſenis dicitur, aut chryſocomen quam & louis barbam appellamus: quæſq; & arbor quædam eſt quæ louis barba dicitur, in opere topiario toſſilis, & in rotunditatem ſpiſſa argenteo folio: aquas odit, ut Plinius deſcribit, nec adſciſt plura.

THALICTRON. DCCXI.

Thali.

Thalictroon cauliculus habet crassitudine papaveris, ut inquit Plinius: rutæ, ut Galenus: cubiti, ut Dioscorides: librarijs similitudine vocabulorum deceptis. Nos rutæ Galenum secuti vertimus.

BRYON THALASSION. DCCXII.

Bryon thalassion cognominatur, ut à bryon differat in arboribus nascente. Marina herba hæc, sed in terra tantum nascitur & scopulis, folio herboso ac lato, nec lactuæ dissimili, rugositate tantum velut cōtracta, sine caule, sed ab ima radice principio alio atq; alio plusculis exeuntibus folijs.

PHYCOS. DCCXIII.

Phycos non habet alia lingua nomen, ut Plinio videtur: etiamsi fucus inde apud nos dictus esse videatur, quoniam alga, inquit, herba sit potius, hic autem frutex: quæ ubi maris algam uocet, & fucum marinum lactuæ similem, qui conchylis sub sternitur. Genus est triplex, unum folio lato uiridi, ob id prassion vocatum, ab aliquibus folter, radice foris pilosa, intus squamatis compacta, prælōga & crassa, ut cepis & gethyo. Alter: simile fœniculo, nec uiride sed pallidum, sine caule, rigens tamen atq; stans, & cōcopen à duritia uocatum. In cæcis fractus laxissimè nascitur terra, ut mari tamen alluatur: nam superius in uadit haud procul flore. Extra Herculis columnas magnitudinè mirabili. Latitudo quæ manu comprehendi nequeat. Tertius hoc fluctu extrinsecus in nostrum mare prassion, ut diximus, uocatum: quia pati fronde sit. Annuum esse traditur. Verum præcipiti uerno enasci, per æstatem vigere, autumno flaccescere, emori hyeme. Tertium graminis simile est, radice longa, obliqua, geniculata, caule harundinis, longe minus quæ cetera, alij breuius. Tria genera folio distinguunt: primum lato, secundum longo, quod & rubens sit: ultimum crispum, quod & pelagion & Cretense nominatur: quia spongiarum urinatores ex alto id petant. Circa Cretam in petris copiosissimum & præstantissimum, quo & tæniæ & lanæ & uestes inficiant, prouocant purpuras quidam recens tinctura est, ita colorem alligans, ut elui postea non possit: ob id & pseudoconchylion à Democrito uocatur, & flos siue coccus marinus, & à Strabone in Arabico sinu minium, hoc est ut Nicæder uenit, bryon muscumque. Laudatissimum à parte aquilonis, quemadmodum & spongia. Phycos autem marinum siue thalassion cognominatur, ut à phycos, id est fucos metallicos dicit. Refrigerantis apud Galenum est naturæ metallicum, & cerussæ proximè uicibus, etiam tenuitate penetrandi uincens, de quo nihil Dioscorides. In Arilotele de animalibus, littoralem herbam, hoc est quæ litore oleat, uidetur intellexisse Theodorum cum uertit lituum, id quod ille *trina* uocat: siue ritamen potest ut litus ipsum & odor eius, in eo uocabulo accipiendus sit.

POTAMOGETON. DCCXIII.

Potamogeton. Castor hanc aliter nouerat, tenui folio, uelut equinis setis, thyrsos leui & lōgo, in aquis nascentem, cuius radix strumas tollebat. Potamogeton aduersatur crocodilis: itaq; secum habent eam, qui ueniant eos.

STRATIOTES. DCCXV.

Stratiotes gemina est: aquaticus, de quo hic agitur: & terrestis, millefolij cognomine, de quo statim post dicitur. Est autem stratiotes aquaticus, herba militaris, in Aegypto tantum nata inundatione Nili. Diuersam ab hac militarem aliam existit

mo, quam alij eandem, quæ & lactoris, aliqui similem dicunt. Est autem lactoris nota uulgo, ut inquit Plinius, plena lactis: quod degustari, uomitiones concitat. Hæc & lactaria, & anabula nunc dicitur, oleæ folio sed minore, flore luteo. Sed an una aliqua sit hæc ex his, quæ tithymali nominantur, considerandum relinquo.

STRATIOTES TERRESTRIS.

VEL MILLEFOLIA. DCCXVI.

PHLOMOS. DCCXVII.

Verbascum, siue phlomos, siue ut Galenus phlomos, etiam in niue nasci posse creditur. In alio aliqui marem, in nigro fœminā uolunt in telligi. Caulis uerbasci erectus, semen inutile. Tertium porro genus non nisi in syluis inuenitur, cui herba quæ Romæ blattaria dicitur, tam est similis, ut sæpe fallat pro ea capta. Est autem blattaria folijs minutis candidis, cauliculis pluribus, flore luteo. Hinc forte natum, ut Dioscorides uerbascum syluestri blattas contrahi prodiderit. Medicinæ huius capitis sequenti mentione collocatur.

PHLOMIDES. DCCXVIII.

Phlomides. Distingui genera hæc penè superuacuum est, cum sint eiusdem effectus omnia. Thyrallida uero & lychnitum ex argumento appellant, quoniam ad lucernas conueniunt: proinde ipsa minimum ellychnia Græci & phlomos, & thyrallidas quoque uocant, ut inquit Pollux.

ÆTHIOPIS. DCCXIX.

Aethiopis caulem habet concavum, semine candidum, radices plenas, molles. Quæ ex Aethiopia uenit, eximia est, illico proficiens. Colliguntur radices autumno, siccantur in sole aliquot diebus, ne situm sentiant.

ARCTION. DCCXX.

Arction nascitur in petrosis. Ab Arcto nomen obtinet: aliud omnino quæ uulgo brachia uirina dicitur: ueteribus omnia, etiamsi ebis modo supputatoriæ uim habet, folijs tam diuersis, ut singula eorum multa esse uideantur radice glutinosa, multiplici, subalida.

ARCION. DCCXXI.

Arcion siue prosopites, personaciam quidem in Latino sonat, sed pro petasite tamen capitur à Plinio dicente: Folio personacæ nullum est latius, grandes lappas ferentis, quas non in arcio, sed in petasite cernimus. Petasiten interpretor, quā uulgo bardanā, & lappam maiorem uocant: arcion, quæ ungula caballina dicitur. Plinius differentiam in nomine tenuem constituit: petasiten personatā, arcion, personatam appellando: Personatam, inquit, quā nemo ignorat, Græci arcion uocant: folia habet maiora etiam cucurbitis, & hirsutiora, nigrioraq; & crassiora, radicem albam & grandē: quæ omnia ferē cū Dioscoridis arcio conueniunt. Nominatur & persolotata, siue persolyton à Plinio herbæ genus Aegyptiæ, in hortis feri coronamentis solitum, duobus generibus, mas, & fœmina: in hijs subdita ea Venerē uiro rum maxime prodendo. Illud com monuerim maiora esse personatæ, hoc est petasitæ ac bardanæ, quæ persolatæ, hoc est arcij & ungulæ caballinæ folia: radicē personatæ candidā, digitali crassitudine, fastidientis odoris: persolatæ brachiali & odoratam, flore in spica purpureo. Galenus & hanc & superiore eodem arctij nomine appellat. Quod autem personaciam sit quam

quā Lucius Columella personā uocari scribit, ne dubitem facit qd̄ utilem pecori, quod uisera momorde rit, scarificationis superpositam cōmemorat: quod & Plinius probat, & propterea a nōnullis echion quasi uiperariam tradit appellari.

PETAITES. DCCXXII.

Petaites dicta uidetur a petaso, pileum significante apud Græcos: unde petasati, hoc est pilea triapud Catullum enim ita Castor & Pollux dicuntur. Nec aliud in Mercurio petasus est q̄ galeus: q̄q̄ Laetantius grāmaticus & alas & talaria continere credit in ea uoce, quā si petasum pro pinna capiant, cum legēdum sit non petasum, sed petalon, quocunq̄ loco pinna significatur: ita enim Græci etiam fronde uocant, ut est apud Iulium Pollucem. Multos decepti corruptus in Plinio locus: Alcamenes, inquit, Phidias discipulus æreum petasum fecit, qui uocatur encrinomenos: alijs petalon, alijs petasum legēribus: cum legendum sit pentathlon, quem nostri quinquentionem uocant, ut est apud Festum, quod & codices manu scripti, & primis impressi formis habent. Quod genus & Myronis & aliorū operibus ascribitur, ut eodem capite Plinius indicauit. Petasones porro dicimus, quas Græci pernas, & nostri pernas uocant, ut Athenæus inquit. De petasite multa proximē diximus, credentes hāc Latine personaciam uocari, & Græce a quibusdam echion, ut ait Plinius: nisi quis non echion, sed arcion scribendum propter similitudinem cum arcio contenderit, cui non contradico ipse.

EPIPACTIS. DCCXXIII.

Epipactis, siue qd̄ idem est, elleborina inter frutices Asia Græciæq̄ a Plinio reponitur.

CAPNOS. DCCXXIII.

Capnos siue capnion, hoc est fumus, duplex: alia hic descripta, nascens in hortis, & segetibus hordeaceis: alia & nomine & effectu similis, quas pedes gallinacos uocant. In parietibus & sepiibus genitam, ramis tenuissimis sparsisq̄, flore purpureo, ut inquit Plinius, quam nōnulli modo cimballarem uulgo dictam, nescio q̄ recte, interpretantur, folio hederæ prætenui, ut in cotypele dum commonui mus. Hanc autem capnon, quæ nascitur in sepiibus chelidoniā phragmitem uocare moris est Aëtio, ad exinanitiones partium in iocione curuarum utilem dictam, ut puto, quoniam succo discutit caliginem, ut chelidonia: & ob id in medicamenta oculorū additur: ut in collyrium Mareiani eam chelidoniā capnida cognominantis. Quod si eadem probetur esse cum cymbalari, ut quidam consiſciunt, etiam illa similitudo confluit, quod folium hederæ habuerit, quale chelidonio minori contigit: propterea confidere cupio, nunquid non similis, sed eadem omnino sit capnos hæc cum chelidonio minore. Multa certe paria comperio. Ceteræ ex eo q̄ capnon Plinius a nostris pedes gallinacos uocari scribit, magnus pleorūq̄ inuasit error, existimantes capnon a Dioscoride monstratum, non aliud genus esse, q̄ quæ uulgo sanguinaria & galli crus dicitur. Pudenda & poenitēda inficicia, nisi frons attrita multis esset: Quandoquidem ea quæ galli crus uocatur, graminis est tam similis, ut ab eo forte non admodum se iungi possit: nisi quod folio minore cernitur, & fibris potius q̄ radice nititur. Id autem quod in utroq̄ summo frutice trifolium gallinacci pedis imitationem habet, candidius in

hac q̄ in gramine conspicitur.

LOTVS SATIUA. DCCXXV.

Lotus satiaua nō nisi post annum ex semine suo nascitur. Est & lotus syluestris, itemq̄ locus Aegyptiæ: herbe omnes, de quibus paulo post agendum nobis erit: nam de loto arbore iam diximus. Quæ sint in Columellæ horto lotæ Phrigiæ luminibus gemmantibus, haud scio reddere. Apud Herosperios Aethiops nasci tradit herbam lotum uocatam Artemidorus, quæ uescentes quamlibet stituculo & squalenti tractu sitim arceant: ob id & Lotopha gi Aethiopes, ut inquit Strabo, nominati sunt.

LOTVS SYLVESTRIS. DCCXXVI.

Lotus syluestris inter aculeatas, ut puto, constituitur, caule foliato, ut crepis ab radice. Quæ sit crepis nondū comperi. Crepulā certe dici quæ sit acanthos topiaria, Dioscorides affirmat.

CYTISVS. DCCXXVII.

Cytisus siue cytifum hederæ modo uincit & stragulat lata: contrā cytiso pestis alimon. Densa cytiso medulla, ebenumq̄ prouocans. Non ex alio pabulo laetis maior copia aut melior: incommo dum tamen tantisper dum floret, ut inquit Aristoteles: quoniam sit urentius. Perq̄ modica eius herba quadrupes dē pingueſcunt, ita ut iumenta etiam herodeum spernant, nec aliud minoris impendi est: uel mediocri solo prouent. Scribitur semine & caule. Perſicitur triennio. Florere desinit uerno æquinoctio, cū & metitur. Aspectu, si quis breuiter exprimere uelit similitudinem, angustioris trifolij. Frutex hic in Cythno insula inuentus, inde translatus est in omnes Cycladas, mox in urbes Græcas, magno casei prouentu, ut mirum sit rarum esse in Italia, æstus, algoris, grandinum, niuisq̄, omnis demum iniuriæ siue noxæ patiens. Intactum quorūq̄ hostibus propter nullā gratiam ligni. Ab Antinomacho Atheniensī magnis laudibus extollitur. Apium examina cytiso eliciuntur: q̄q̄ Democritus & Aristomachus eas prædicant nunquam de flore cytifi pabulum contingere. Columella cytifum, & zeas, & carnicin, & trifarum uocari scribit: & esse geminam: hoc est satiuam, & alteram suæ spontis.

LOTVS AEGYPTIA. DCCXXVIII.

Lotus herba Aegypti uernacula est, caule fabaceo & petasato, folijs densa congerie stipatis, breuioribus tantum gracilioribusq̄. Flores ei similes, ut Theophrastus inquit lilio, ut Dioscorides, hordeo. Libratione in alterutro culpa crinon pro crithe contra uer scribentium. Copiosi ij & in se farcti, comprimentes se ad occasum solis, aperientesq̄ ad ortum per uices, donec persiciantur capita, & flos ipse decidat. Fructus in capite papaueris, incisuris omnīq̄ alio modo, nisi quod crebriora intus grana. Radicem corſion uocant, operam nigro cortice, qualis & castaneæ tegit, interius candidum corpus: quod decoctum cibo gratus est q̄ crudū, siue aqua siue pruna: nec aliunde magis quam purgamentis eius uices crasseſcit. Illud sciendum, autore Theophrasto, genera huius plura inueniri, distincta flore, fructu, caule, folio: ut nomen ferē tantum commune habeant, ratio naturæ tota dissentiat. Loton qui arborem putant tantum esse, de qua uolumine primo diximus, uel Homero coarguuntur, qui inter herbas subnascentes, decorum uoluptati loton primam

nomi-

nominauerit. Est & lotometta, quæ fit ex loto lata: ex cuius semine simillimo porri atq; milio, panibus in Aegypto pastoralibus maxima aqua lacte uel sub actis, negatur quicq; esse salubris aut leuissimum ca leant. Refrigeratus maiore negotio concoquitur, fit q; ponderosus: eos qui uiuant pane illo, nec dysente ria, nec tetanismo, nec alijs in uentre morbis infestari prædicant. Incolæ & capita ipsa loti acruata putre faciunt: mox separant à putaminibus lauando, & sic cata tundunt, eoq; pane utuntur. In Euphrate scapus & flos usq; in medias noctes à uespera mergitur: ut ne dimissa quidem manu comprehendi possit. Vertitur deinde, paulatimq; subfriguitur, de hiscente flore ad solis ortum, ut plane à terra absit alie. Hanc loton in coronas uenire diximus in myrto: propterea Crati nus eam stephanonia uocauerit: si Attici omnia foliacea stephanomata solent appellare. Antiochos uero dicta ab Antinoo, qui è Bithynia fuisse dicitur, per diui Adriani ferè tempora, qui & memoriam uiri co luit, in Aegypto ab eius nomine uocata, delubris eti am in honorem eius dicatis, apud matricimos in Ar cadia, quod crimen inde Bithyniam habuisse crede rentur: ut illud tamen quod diximus alibi sciamus, lotum non quæ ceruleum, sed quæ similem rosæ flo rem edat, inuentu rarum, Antiochium proprie uoca tum, in assentationem Adriani principis poeta Alexan drino, qui finxisset è leonis cruore, quem Adrianus grassantem in Libya necasset, editum, & Antiochion dicendum, alimentis annuis ex museo constitutis. Huius rei partim Athenæum, partim Pausaniam au tores habeo. Diminutua in Paulo forma lorariū ru bens legi ad pforas utile, nisi quis non de loto Aegy pta, sed de syluestri porius accipiat. Pastillus est siue orbiculus apud eundem Paulum dialocration uoca tus ad genitalium fedisq; uria.

MYRIOPHYLLON.

DCCXXIX.

Myrphyllon q̄q; ferè millefolium significat, alia ramen uidetur esse ab ea, quæ inter sibe rires Achilleon & millefolia cognominat: itemq; ab ea quam in Ethruria millefolium uocari di ximus, & ab ea quæ militaris: aliqui Græci hanc my riophyllon, illas uero chiliophyllon appellare con sueuerunt.

MYRRHIS.

DCCXXX.

538

Myrhis, & myrtha, siue murtha, ut ego arbi tror à nostris appellata. nonnulli Smyrin. Flo rem habet cicuta, cui & cætero simillima est, minor tantum & exilior. Hanc sunt qui chære phyllon siue chærefolium modo nominatam, & in hortis passim nascentem, intelligant. Plinius chære folium aliud uidetur genus accepisse, cum inquit: Se ri quæ in octio autumnii chærefolium, quod pædero ta Græci uocant, acerrimum sapore, igneij affectu, ac saluberrimum corpori: q̄q; uerba hæc postrema de sinapi dicta uideri possunt, de quo statim autor idem loquitur. Columella horto suo breue chære phyllon appellat. Myrrhis proprie cicutaria Latine dicitur, ut in geranio testari sumus. Inuenio & mylam gen⁹ herbe, cuius radix paruo bulbo similis dicatur, contrahendi effectui uuluis apposita, cum farina lo lij. Miror hanc in Dioscoride nusq; legi, cum tamen & Hippocrates id prodat, & Galenus medicinas eius à Dioscoride accepisse fateatur. Aëris radicem sylue stris lapathi mylen appellatam prodit, utilem deco cto in mobilitate, & dolore dentium.

MYAGROS.

DCCXXXI.

Myagros siue melampyros, herba ferulacea, ex cuius semine oleum etiam fit. Paulus Ae gineta præter hanc genus aliud facit her bæ, quæ myaron appellat, & melampycon, eiusdè per omnia cum myagros nature, ut librarijs: fortasse culpa euenit myaron pro myagro, & melampy con pro melampyro scribentium.

OENAGRA.

DCCXXXII.

Oenagron, & cenagron, & cenorheram, & oeno therin, & cenuthurida, & cenotheriden uoca mus: aliqui onear. Sit hæc & quæ dicitur œnur ta, quæ corui & canes inebriatur, ut Aelianus inquit, non affirmarim.

CIRSION.

DCCXXXIII.

Cirson potius q̄ ut quidam legunt, cirson à ua ricibus dicta est, quibus utilis existimatur: ita enim uarices ab Hippocrate dicuntur, quas Aristoteles ixiæ uocauit. Huic herbe similis est quæ hircina lingua uulgo dicitur, sed caule tamen rotun do, non anguloso ut cirson. Nec dissimilis huic uide tur quam porriginem siue borraginem olitores no stri uocant, flore interim purpureo, cirson interim cœruleo, quæ si cirson non est, mirum quamobrem sit indicta ueteribus, quæ sit & uulgatissima & cibo gratissima: nisi quis buglossæ generibus contribuat.

ASTER ATTICVS.

DCCXXXIII.

Aster Atticus, siue inguinaria, folijs oblongis, 540 duobus aut tribus, passim in ueprib⁹ nascens, ut Plinius scribit, argemionia à quibusdam uocari dicens. De hac Galenus bis uidetur scripsisse medicinas: uno loco astra Atticon uocans, altero bu bonion. Qualis autem Pausania sit herba quæ in My cenensi agro ad Iunonis sanum asterion uocatur, à flumine terram illam rigante, quia in ripis nascitur, cuius folia tunoni sacra in coronas sibi necunt acco læ, non comperi. Est & alius aster nunc uulgo stella dictus, folio ferè uicis, seu maluz potius erraticæ, ad radicem maiore, pluribus sed minoribus diuisuris. Florem fert in modum stellæ in luteo uiridem, pusillum, & herbe suæ similem. Ad herniam pueros & uulnera commendant hanc. Eius decoctum, quæ uir gines uideri uolunt, insident. Veteribus dicta indicta sit haud fecio.

ISOPYRON.

DCCXXXV.

Isopyron, & phasiolos, & phasilon q̄q; dicit. Alia uidetur herba esse quæ Theophrastus ison uocat, Theodorus more suo, æquum: duplici fastigio, nigrū & candidum. Flos fructusq; illis pro ratione di scriminis, niger aut cædidus: q̄q; & medio, inquit, co lore fructus q̄q; cernuntur, & flores in purpuram in clinantes, uirgis & folio tenuioribus atq; leuioribus. In Aëtio ison dicit herba quandā uideo, cuius cibo pi tuita detrahitur: nec satis animaduerto an eadem sit cum iso. Alexander q̄q; in problematis, si locus memo ria non excidit, ison herbam inter olea dinumerat.

VIOLA PURPUREA.

DCCXXXVI.

Violam Græci ion pto flore, uiolarium ioniam pro frutice appellant. Nicander in georgicis ion uocatum credit uiolam, quia nymphæ quædam ionix florem cum Ioui primū dederunt mune ri. Nascitur uicis modo è supernis, quasi è puppi di cas, non prora: ut ruta, silymbrium, serpillum, eoq; omnes phrygana, hoc est furculi siue cremia uiolæ dicuntur, excepta nigra, quæ hoc capite describitur.

Vires

Viret hæc perpetuo, & ut quidam ferunt, si certo genere colatur, anno toto. Scriitur plantis ut olus. Vere floret post leucoion, & ante si ameam. Cum ion Græci dicunt, nigram siue purpuream ferere intelligunt. Humilis hæc & latiore folio, statim ab radice multa carnositate exiit, sine ramis: ob id uulgo loricpedem uolam uocamus. Hæc nomine à cæteris distinguitur, solæia appellatur Græcis, ut ab ijs ianthina uetis & uioleacea diceretur. Alia uiolarum genera in leucoio reddidimus. Violas Sarranas à colore cum purpureis easdem esse apud Columellam arbitror. Purpureas uacina & hyacinthum dici Seruius grammaticus existimat. Dioscorides quoque hyacinthum Latine uacinium appellari scribit. Admonendi sunt qui hæc legunt, purpureas uiolas, duorum generum haberi: alias inter loripedes siue sesiles, de quibus hic agitur: alias inter leucoia, odoratasque omnes esse. Sed & candidarum quoque gemina hæc discrimina cernuntur: alii loripedes, alii leucoia. Leucoia intelligo, quas Mauritanica cheiri appellat: loripedes, quæ uulgo claudæ nominantur, & Maurice senephigi.

C A C A L I A. DCCXXXVII.

543 **C**acalia putant esse, cuius semen à Plinio marginis minutis simile reddatur: dependens inter folia grandia, in montibus ferè nascens. Hanc Galenus negat se uocauit. Differt ab hac acalidis, item caulicis, de quibus ante dictum est. Paulus acaliam, non canconis, sed cancano simile esse tradit.

P S E V D O B V N I O N. DCCXXXVIII.

544 **C**hamæcissos. DCCXXXIX. Chamæcissos uocant hederam non attollentem se à terra. Spicata est tritici modo hæc, & uetus i. n. y. s. id est hederæ terrestres appellatur.

C H A M A E P E V C E. DCCXL.

545 **C**hamæpeuce non chamæleuce, ut ferè habent codices, legendum arbitror: quoniam chamæleuce populago sit & bechion: chamæpeuce uero laricis folio similis ostenditur, unde nomen, quasi larix pumila.

B V G L O S S O N. DCCXLI.

Buglossos, & buglossos, & buglossa dicitur. Ca- to linguam bubulam appellat: utilem insitio- nibus obtegendo cortice, ne imber in librum permanet.

C Y N O G L O S S O N. DCCXLII.

546 **C**ynoglosson topiarijs operibus gratissima est: dicta, quia caninas imitetur linguas folio. Est ei similis alia, & quæ ferat lappas minutas.

P H Y T E V M A. DCCXLIII.

Phyteuma negat se describere Plinius, quasi superuacuum, & ad amatoria tantum utilem.

L E O N T O P O D I O N. DCCXLIII.

547 **L**eontopodium si amatoris tantum nascitur, id uerum uidetur à leontopodio, de quo Plinius scribit, ut ab eo aluum sisti, bilem purgari prædicet, semine lymphatica fieri somnia. Campestri & gracili solo nasci, litheoron & coripetron ab aliquibus uocari: nisi de hac loquutus intelligatur, cum dicit: Silebitur à nobis & cemos, cum sit usus eius, inquit, ad amatoria duntaxat: quandoquidem leontopodium & cemos uocari Dioscorides hoc loco testis. Cemos autem uidetur appellata ex floribus siue calycis figura: quoniam pyxidecula Athenis ita nomina- batur, per quam suffragia in subiectum uasculum,

quod caddiscum uocabant, demitti consueuerant: quod & Venetijs hodieque seruatur: Pollux autor, Leontopodium hanc & in uetustissimo Dioscoride appictam uidimus, simillimam herbæ, quam uulgo ex nostra consuetudine calendulam appellat, ut eadem omnino esse uideatur. Leonis habere nomen uetis simile est & illam, quam ita carmini suo Columella inseruit:

Et hianris sæua leonis
Ora feri. Et alibi:
Oscitat & leo.

Nec præterea quid de ipsa prodam, habeo.

H Y P O G L O S S O N. DCCXLV.

Hypoglosson & hypoglossa dicitur. Acinos ferrubentes rusci modo. Vidimus & hanc. Corollæ genus hypoglossida uocari diximus in myrto, aut ex hac herba, aut à lauro Alexandrina, quam & hippoglossida appellabant. Hippoglossus dicitur & morbus lingue Hippocrati, quoties tumore obduruit, ita ut salua deuorari nequeat.

A N T I R R H I N O N. DCCXLVI.

Antirrhinon & anarthrinon & antirrhizos, siue an arhizos, simile lappæ tradit: quidam lino, ut arbitror, corrupta lectione, pro aparina. Radice nulla siue minima, flore hyacinthi Plinio. Galenus hanc & bucanion, hoc est bubulum aut uutilinum caput dici mementi.

C A T A N A N C E. DCCXLVII.

Catanance Thessalia est herba. Huius secunda specie ab herbarijs nostris inuenitur bistorta nomine.

T R I P O L I V M. DCCXLVIII.

Tripolium ab aliquibus eadem existimatur quæ polium, errore manifestum, ut ex earum descriptionibus apertissime cognosci potest. Radix crassa tripolio.

A D I A N T O N. DCCXLIX.

Adianton capillis Veneris à Theodoro dicitur: frutex topiarius, æstate uret, bruma non marcescit. Nomen ei ab aduentu, quod folii eius persulum mersumque aqua, simile tamen sicco uideatur. Radicem parua, ut possit nulla existimari. Locis opacis pro uenit. Perdices in bellum armanur huius herbæ cibo. Callitrichon & polytrichon à capillo dicitur quem tingit, crispum densumque faciens. Dicitur & saxifragum: non tam quia nascitur in saxis, quæ calculos mire frangit: sed nigrum magis, quod & breuius est, & trichomanes priuatim appellatur, de quo statim indicabitur. Adianton candidum est & maius nigro, & polytrichon proprie cognominatur, & ab Hippocrate calliphylon: etiam si est ubi calliphylon scribitur. Folia utriusque filicis inferiora, aspera ac fusca sunt, contrario inter se positi frequentia: umbrosas petras, specus, & manantia saxa diligit.

T R I C H O M A N E S. DCCL.

Trichomanes adianti genus alterum, callitrichi cognoscit, breuius & nigrius, tenuissimis iuncis, radice minima, gustatu feruens. Primum uero genus adiantum polytrichon uocatum, iuncos albos habet, & folia plura maiora: frutice quoque maior est, ut prædiximus.

X A N T H I O N. DCCLI.

Xanthion & phasganion uocatur à Galeno & Paulo, phasganion à Dioscoride, philanthropos ab Aëtio, nunc lappa in uersa & minor à nostris

nostris. Non uidetur quibusdam xanthion ab aparina superius descripta differre. Sed cur obsetro Dioscorides & Galenus & ceteri diuersas habuere, duobus locis scortum de ijs prodentes? Quid q̄ in omnibus Græcis exemplaribus aparina ex intervallo stellata pingitur quasi rubia? Xanthium multo aliter ostenditur, folio atriplicis, uel ut quidam scribant, etiam solani?

AEGILOPS.

DCCLII.

558

A Egilops necat hordeum, in quo maxime nasci amat. Festucago à Gaza dicitur. Plinius auenam Græcam uocat. Hæc non nisi post annum ex semine suo gignitur: uere pilosum ei foliū ut lolio, non tamen ut illi pingue. Inmitis aspectu, solum emaciatur. Radice culmo q̄ multiplici, melius in cultu erumpit. Remedium aut uia bienniu in quiescant, tum planè luxuriat eam admissum pecus obterat & consumat.

BROMOS.

DCCLIII.

554

B Romos & hæc auenæst, syluestri fere habitu ut ægilops. Nascitur inter uicia segetis, spicam ferens, radice copiosa & multiplici, culmo sparfa. De hac & inter fruges legumina q̄ secundo libro diximus.

GLAUX.

DCCLIII.

G laux olim eugalacon ex facto uocabatur. Rami serpunt in terram, sūt à quibus nō glaux sed glax & galax, ut à lacte nominata pronuncietur. Hæc descriptione inuenitur herba in nostris lit toribus ad Medea cum omnino similis: nisi quod florem habeat aureum, non purpureum.

POLYGALON.

DCCLV.

555

P olygalon & polygala dicitur. In caule summo folia, ut diximus lenticulæ, gustu astricte.

OSIRIS.

DCCLVI.

O siris & Ofirias ramulos habet nigros, & folia item nigra Plinio. Semen quoque primo nigrum, post rubescēs, cognita mulieribus smegmate, quod à Galeno & Paulo & Aëcio cacorema, siue à pupulis corema dici putant.

SMILAX TRACHEA.

DCCLVII.

S milax *ῥαχέαια* hoc est aspera milax à Galeno dicitur, ut à smilace pro taxo differat. Ergo smilax hederæ genus est Cilicia cognomine, importata enim ex ea terra est in Græciam, folio in acumen pinnato quidem, sed & in angulum depresso, nec tamen anguloso, hederæ co, paruo, & ubi pediculo ad alligatur, ferè madido, medium callum spinæ modo tenuem habente, stamina q̄ non porrecta ex eo, ut in ceteris folijs, sed circa eum coacta in orbem, ab annexu pediculi, ex quo & iulus quidam gracilis & cō uolutes, pampini modo emittitur: flore candido lilium olente, fructu solani aut melochri, ut etiam nū labruscæ. Racemis ut hederæ pendentibus, aut uiræ potius: quoniam ab eodem limite pediculi acinorū exeant. Acinis colos ruber, complexus nucleos binos maioribus ternos, minimis singulos. Nigri sunt nucleis atque duri. Peculiare habent racemi q̄ latera caulium sepiunt, q̄ unus omnium grandissimus propendet summo caule, ut in rhamno atque rubo. Flore huius coronarij utuntur, quanq̄ syluestri, ut & spinæ acutæ. Hactenus Theophrasti de smilace sententia. Plinius: Folia, inquit, smilacis & hederæ in coronamentum se dedere. Smilacem hanc, & autophoron & asperam cognominari uideo penes eum, Coronā

ex ea factam impari foliorum numero, capitis doloribus mederi: Quidam, inquit, duo genera smilacis dixere: alterum immortalitati proximum, in conualibus opacis scandentem arbores, comantibus acinorum corymbis, contra uenenata omnia efficacissimis: huius lignum ad aures leuem sonum reddere. Alterum genus culta amare, & in ijs gigni, nullius effectus, ut mox diceretur. Infausta smilax omnibus facris & coronis, quoniam sit lugubris: uirgine eius non omnis propter amorem iuuenis Croci munita in hūc fruticem. Id uulgus ignorans, plerumque festa sua polluit, hederam existimando, sicut in poetis, aut Lihero patre, aut Sileno, qui omnino nescit quibus coronetur. E smilace codicilli quoque fiunt. Plurima hæc in ipsi Tempe uiret saxa operiens, conspicuo nitore oculostrensens, ut Aelianus inquit: quamquam de smilace, quæ dolichos sit, uideri potest Aelianus dixisse. Est autem dolichos, quam Plinius siliquam syluestre uocat, id quod tribus aitoris eius locis inter se collatis autumo: unus est libro eius decimo octauo: Siliqua, inquit, omnis dira adhaerendo: alius decimo septimo: Et circa, inquit: Tempe Thessalica, quæ polypodion uocatur, & quæ dolichos. Tertius libro trigesimo primo: Circa Thessalica, inquit, Tempe mirum siliqua syluestris amplecti radicibus fontem eum dicitur, semper florens purpura. Vitruuius tamen hanc quæ circa Thessalica Tempe nascitur, non herbam, sed arborem intelligit: In Thessalia, inquit, fons est profluens, ex quo nec pecus ullum gustat, nec beluarum genus ullum propius accedit: quæ fontem proxime est arbor florens purpureo colore.

SMILAX LIA.

DCCLVIII.

S milax siue milax *ῥαχέαια* hoc est leuis, diuersa est ab ea, ut præmonui, quæ smilax *ῥαχέαια* hoc est hortensiana dicitur, de qua & alio loco demonstratum est. Leuem Plinius amare culta, & in ijs gigni scribit, sed nullius effectus esse. Galenus similes eam uires habere prædicat quas aspera.

MYRTVS SYLVESTRIS.

DCCLIX.

M yrtus syluestris differt à satia a bacis rubentibus breuiatæque: ideo & chamæmyrsine uocatur. Eadem & oxymyrsine, atque rusus, siue bruscus uulgo, sed corrupte. Inter herbas sponte nascentes idoneas cibo numeratæ, & ex qua fiunt rursus. Ruscum, inquit Verrius apud Festum, amplius paulo herba est, exilius uirgulto, fructibus non dissimile iunco. Huius colore mulieres uti solitas Cato meminit. Hanc & acoron idem Plinius, sed Dioscorides acaron uocari scribit. Scio fructum huius cubebas Maurice uocatas credi: quod quam uerum sit, diligenter animaduerti cupio, præsertim ab ijs dissentiens, qui hoc affirmat. Galenus certe id quod cubebas medicis appellant, ipse carpesium uocat: duorum generum: Ponticum & Laertium, à montibus Pamphylia, ubi frequens est, ita dictum. Inueniri hoc, & in Sida copiosum tradit: oppidū, id est Pamphylia. Naturam & effectum ei reddit quales ipsi phugustum quoque similem tenuioris etiamnum, hoc est subtilioris substantia: propterea & plus uirū in eo esse purgandis & exterēdis intestinis, quæ sine occlusa: non tamē par uirtute penetrandi casse, nedū cinnamomo, etiam si Quinto, inquit, ita uidebatur, Yrinā cit, & renes calculis laborantes liberat: quo argumētū

gumento Mauri syluestris myrri baccas carpesium, & cubebas esse putauerunt: præcipue cum nec Dioscorides carpesium, nec Galenus myrtum syluestrē usq̃ nominent. Est autem odoratū semen carpesium, hoc est cubeba. Foetent syluestris myrri baccæ, dum recentes sunt. Ossea in ijs duritia. In carpesio nihil tale. Superuacuum existimo in re confessā quidē, sed & nobis primum comperta, longiorē moram dedere. Illud intranscursu dixerim, carpesium, si ore continere, clarā uocem facere pronuntiantibus: ob id Bernardus lustinianus, homo in primis doctus & eloquens, nunq̃ sine hoc semine concionabatur: sed & illam dorem prædicant: maiore in coitu uoluptatem sentiri ab ijs, qui habeant id in ore: quasi non satis sit in ea titillatione mens cōmota, nisi doceamur quemadmodū nos Venus adminiculatur, & uiolentior transuertos auferat. Paulus, & carpesium uocauit quondam. Nam opocarposum hoc est lac ē carposi, siue carpatho, ut Dioscorides appellat, siue carposia, interim, & carpesia, ut Paulus, ex eodem sit genere an diuersum, non consta: illud certum est, inter delibutoria uenena poni eum fuscū, libro huius operis supremo. Est & carposiū linigenus: quod ut Pausanias ait, solum ex omnibus igni non corrumpit.

LAURVS ALEXANDRINA. DCCLX.

Laurus Alexandrina carpophyllos quoq̃ dicit, quoniā super dorsum folij fructificat. Propria nascitur circa Idam, unde cognomē Idææ. Plurima & circa Heracleam Ponti. Frutex copiatij & coronarij est operis.

DAPHNOIDES. DCCLXI

Daphnoides & ipsa laurus est syluestris, baccis nigro ruffis: sed aliq̃ eam pelargon, aliq̃ cephalon, siue stephanon Alexandri uocant, herbarij nostri laureolam, & hanc & sequentē. Folia huius crassiora Plinio q̃ laurus, graciliora Dioscoridi. Nec illud præteribo, Dioscoridis mihi uerba nō uideri, quibus dicitur, alypo similem hanc herbam esse foliis nymphæ. Inuenio & qui alypoides hanc uocēt.

CHAMÆDAPHNĒ. DCCLXII.

Chamædaphne folio tenui: eadem quibusdā & uincaperuinea est, herba topiaria: semper uirens in modū linææ folijs geniculatim circumdata, uetribus inopiam florum supplere solita: cuius & comeduntur alparagi: porro mihi alia uidetur esse uincaperuinea, q̃ chamædaphne: q̃ uincaperuinea non attollitur, sed serpit, ac se in modum linææ, ut prædixi, porrigit, flore in purpurā cœruleo. Chamædaphne assurgit in cubitalem altitudinē, ut Dioscorides & Plinius confirmant. Potest tamē etiam chamædaphne dici uincaperuinea, id quod & Plinio placet. Sed ut testatū sit rament, aliud, non idem omnino genus esse alioqui & medicinæ quoq̃ nō nihil uariant. Hydropicis, & auribus, & aluinis prodesse uincaperuinea dicitur. Chamædaphne capitis doloribus, urinæ, mensibus sciendis, ardoribus stomachi, torminibus.

ELLEBORVS CANDIDVS. DCCLXIII.

Ellebor candidum, hoc est ueratrum, frigidis gaudet. In Anticyra cōmodissime purgari fructu eius, quod sesamē habet similitudinē, Theophrastus tradidit: sed hoc sesamoides uocatur. Cornuticibus semen ellebori gratissimū scribit Aristoteles: quā ob causam antiqui eas damnauere mensis: tunc quærantur. Nigrū à candido radice tantū dif-

ferre arbitrantur pleriq̃: alij etiam folijs, quæ candidum continuo radicia nexa, & humis parsa habeat, caule serulacō, breuiore q̃q̃ albuci. Plurimū nascit in Oeta monte, & optimū uno eius loco circa Pyrā. Secundus locus Pontico: tertius Heleatico, quod in uiribus grigniferunt: Quattus Parnaso, quod adulterant Aetolico ex uicino. Sunt qui & Malleicorum inter hæc laudent. Albū cum succiditur caput aggruat: ideoq̃ celeriter effodi præcipitur, & allium præsumi, & uinū forberi: quod Dioscorides & in nigro feruat. Leguntur autem tenuissimæ radices breuesq̃, ac uelut decurtatæ etiam hæ: nam summa quæ est crassissima, cepis similis, canibus tantū purgandis idonea est. Veteres radicem, corticemq̃ carnosissimum eligebant: quo tenuior eximeretur medulla. Hanc humidis spongijs operatam turgescemq̃, in longitudinē sindebat: deinde fila in umbra siccabat, ijs utentes: nunc ramulos à radice sua grauiissimi corticis ita dantes. Inciditur forficulis ellebor, & cribatur. Cortex remanet. hoc summo medulla cadit. Album optimū, & quod celerime mouet sternutamenta: sed multo terribilius q̃ nigrum. Durare uim utriusq̃ triginta annis putant. Necantur albo muscæ trito, & cum lacte sparso. Galli sagittas in uenatu tingunt elleboro, circuncisq̃ uulnibus tenerior sentiri carnem prædicant. Herophilus elleborū fortissimum duci quæbat: concitatis enim intus omnibus, ipsum imprimis exire: ideo errauisse antiquos parcius id præbendo, cum celeris erumpere, quod largi us daretur. Reddi post quatuor ferē horas incipit: totum opus septenis absoluitur. Nigrum equi, boues, iusq̃ cauent, cum impune candido uescantur.

ELLEBORVM NIGRVM. DCCLXIII.

Elleborum nigrū sunt qui ectomon Melampodion uocent. Hippocrates certe haud aliter ferē q̃ ectomon appellat ueratrum ipsum, præcipueq̃ nigrum. Porro Melampodion iccirco dicit, quia Melampodem inuenitorē habeat, quæ aliq̃ diuinationis peritū, aliq̃ pastorē fuisse tradunt: & fureses Proeti filias Elegen & Celanen, dato caprarū lacte, quas elleboro purgatas animaduertisset, sanasse in Arcadia prope fontem Clitiorū. Caulis ei similis candido. Folia, ut Theophrastus quodā loco tradit, etiā laurinīs similia. Vbiq̃ prouenit. Religiose hoc colligitur: nam & gladio circumscribit, & ad ortū spectat, q̃ eruit precatur, ut id liceat sibi, concedentibus dijs, facere. Veratrum & nigrum & candidum ex Anticyra cōmendant scriptores & poëtæ. Anticyra uero hæc in Locride siue Phocidæ sita est, ut scribunt Pausanias & Strabo. Nam & aliubi legitur Anticyra, hoc est sinu Maliaco, & prope montē Oetam, ubi elleborum quidem præstantissimū, sed in Phocidis Anticyra melius paratur admissio, ut inquit Strabo, sesamoidis, de quo statim dicemus: propterea in Phocidis Anticyram non in Oetam elleborum poturi secedebant.

SESAMOIDES MAIVS. DCCLXV.

Sesamoides maius à similitudine nomē accipit. Hoc nascitur in Anticyra, nec alibi quod inuenirim. Hoc & elleborum à Theophrasto dicitur, ut in candido notauimus.

SESAMOIDES MINVS. DCCLXVI.

Sesamoides minus, folio minore q̃ sesami nascitur in glareosis. Hoc & sesamoides candidum à Galeno dicitur,

DE cucumere sylvestri, siue anguino & erraticeo, dictū in satiuo est. Illud hoc loco meminimus, halidem a quibusdam uocari ut inquit Dioscorides, anguinū cucumerē. Ego balin, & balidem lego dici florem quendā, & alio nomine ballichum, qui mortuus uitae resistuat, ut & Arione fabulantur. Phorionē habeo grammaticū, q̄ hoc affirmet post Pliniū, demonstratā à dracone, qui ea herba catulum sibi occisum reddidit saluti. Cucumerem sylvestrem bubalion quocūq; dici, autores sunt Dioscorides & Hippocrates. Est ubi caprificum ita dici legas: errore nato, q̄ caprificus *ἀπρίσις* uisū appellatur: sylvestris uero cucumis, *ἀπρίσιος*. Alius quocūq; flos habetur bellis nomine, pratenfis & candidus, & quadātenus rubens, aduersus strumas efficax, ut Plinio uidetur. Sit autē bellis idem qui & bellius siue bellio, & ipse flos pratenfis, quē Plinius quinquagenis quinibus barbulis pastillicantibus coronatū scribit, animaduertendū puto: q̄q̄ em̄ luteus uidetur à Plinio describi bellio uolumine primo & uigesimo: bellis uero cādidus sexto & uigesimo: non tamen ita in omnibus Plinianis codicibus luteum cum esse legimus. Quidā luteum ei semē, nō ipsum florem audiunt, & paralyfin uulgo dictā interpretantur: qui & primus uenis flos, & margarita cognominatur, & hyeme quocūq; tota nascitur, ex occidente, ut quidā existimant, in Italiam conuectus. Quinquagenas tamē ei ternas, non quinas barbulas inuenio. Laudatur ad paralyfin, à q̄ & nomen: item q̄ ad podagras, & ischiada. Paralyfin uocatē florem habet similem, paucioribus tantum barbulis. Flos qui, quoniā à longinquo conspicuus ē, paradelos uulgo dicitur: folio enim non admodū diuerso: nisi q̄ serratum est huic, non paralyfi. Sunt qui buphrthalmum & bouis oculū appellant: nam qui Antipatrem uulgo dictū rentur eum esse, liquidō fallitur: cum sit Antipater furculosus, & flore luteo, quasi cunilaginis minor: folia roris marini latiora, minus q̄ longa: Christophorianā & oculum Cōsulis nōnulli uocant. Huius illa proprietas, q̄ flores post nascentes altius tolluntur, q̄ prius natī: de cuius rei argumēto uideri posset aliquibus, hanc herbam esse quā Plinius impiam uocari tradit: Herba, inquit, impia uocatur incana, roris marini aspectu, thyrsimodo uestita & capitata: inde alij ramuli assurgunt, sua capitula gerentes, ob id impiam appellauere, quoniam liberi supra parentem extollantur. Alij potius ita appellatam, q̄ nullū animal eam attingat, existimauerunt. Hæc, inquit, inter duos lapides trita seruet, præcipuo aduersus anginas succo. Nec tentari unquā eo morbo qui gustauerit, ita q̄ & subius dari: quæq; medicamentum id noluert haurire, eo morbo interire. Sunt qui & in auium nidis inferi aliquid ex ea putent, atq; ita non strangulari pullos auidius deuorantes, hæc Plinius. Ceterum q̄q̄ similitudo in ea proprietate sit, multa sunt inter utraq; discrimina: Primum q̄ impia incana est herba, Antipater non est: alterum, q̄ trita non seruet: tertium, q̄ nec capitula nec thyrsos gerit, sed flores duntaxat.

E L A T E R I V M. DCCLXVIII.

ELATERIVM. Theodorus agitatorum conuertit. Nullum medicamentum longiore æuo durat, ducentum enim annos uim eius pollere Theo-

phrastus asserit. Melius quōd uetustius, usque ad quinqueagesimum. Lucernas adhibuit extinguit, hoc enim ueri probatio est: si prius q̄ restinguat scintillare sursum ac deorsum cogat. Pallidum præstantius ac leuiter amarum. Huius causa maturus secatur: alioqui semen exiit, oculorum etiam periculo. Harū dine ueteres incidebant. Tradunt hoc uicco tactis radicibus uitium, non attingi uuas ab auibus. Ad hunc succum cucumis anguinus autumnō capitur.

STAPHIS AGRIA. ECCLXIX.

STAPHIS, siue astaphis agria hæc est, quæ pituitaria quocūq; dicitur. Cornelius Celsus uiam Tamiā intelligit falsō: maturefcit enim semen huius cum uindemia, nigrescitq; cum Tanninē acini ruhescent, & in apricis nascatur, & ampelos agria sit, non staphis agria. Hæc non nisi in opacis. Paulus Galenum secutus, duplex genus facit staphidis, satiuū & sylvestre: ut satiuum sit, quam nos uiam passam uocamus, quinto uolumine reddendam. Astaphin q̄ Attice loquitur, ostaphin uocabant: sicut omintha pro mintha, siue menta: & ostacum pro astaco. Est autem astacus, quem nos gammarrum quocūq; dicimus. Porro est locus in Aëtio ubi legis stephanida agriam, mendose, ut suspicor, pro staphide agria: quoniam ad uitia psorasq; capitis commendat eam: Nisi quis stephanida putet esse quam à nostris corneolam uocari diximus, hoc est cynosbaton: utiq; si & hæc, ut rubi manātib; in capite psidio esse potest.

T H A P S I A. DCCLXX.

THAPSIA liquor expressus efficacior q̄ semē: In Africa uehementissima hæc est. Semen ferule Thapsiam aliqui uolebant esse falsō: suū em̄ genus est, inani caule, nec excedente baculi longitudinem. Thapsia q̄d humoris abundantiam opus fuit, ut Galenus autor est, serō perficit. Facile corrumpit. In Theocrito poeta thapsos legitur genus herbæ, in gendis lanis utile, quæ & capillus flauescat: hanc & xylon Scythicon, hoc est lignum Scythicum à Sappho dici putant, uulgo chrysoxylon. Diuersum porro an idem sit thapsos quod thapsia, iudicandum relinquo. In Aristotelis Rhetorico, hypopis sunt & Græcis qui pro thapsia, uel alia herba capiant rubente: nos pro sugillatione uertimus.

S P A R T V M. DCCLXXI.

SPARTUM siue spartion, genistam nostri uocant: fortasse quia genu modo flexilis ad nexus sit, uel quia genibus medeatur dolentibus, multiplici tunicarum cortice, sponte nascens, & quæ feri nequeat: proprieq; aridi soli iunctus, & terræ uitium: quia nihil ibi ferit, aut nasci possit: noxium animalibus, præterquam acuminum teneritate. In Hispania spartum & pro fune ipso capitur, ut merinchus merindusq; a poetis. Sine duo sparti genera, unum quod genistam uocamus: alterum quod in Hispania & Africa funibus nascatur, leucea siue lygea potius dictum ab Athenæo, dubitauit ante nos & Plinius. Dioscorides certe cum sparton dixit, genistam uidetur intelligere, cuius florē in coronas addebant, apibus gratissimum. Semen quoque ipsum Græci sparton eodem nomine appellant. Asia egeñista facit lina piscatoria, egregie durantia, frutice madefacto decem diebus. Hac & uites alligat, ut Galenus inquit. Sparti quidem usus multis post Homerum seculis institutus uidetur: quoniam cum sparta dissoluta dixit, significauerit potius lina. In agro Theba.

Thebano copiosa, ut Varroni, Plinio & Gellio quocunque placet. Nec ante Pœnorum arma, quæ primum Hispaniæ intulerunt, & cum siles fierent naues, uel loro, ut in Liburnia, uel canabo, & stuppa, ut in Græcia: non sparto sutas esse constat. Serilla certe nauigium est Histricum ac Liburnicum, à conferendo nomen habens: quia lino spartoq; stipatur, ut Pacuuius cum dixit:

Sparteis suta ferilibus:

funiculos intellexerit, qui sparto conferantur: auctor Pompeius Festus. Idem napuras funiculos ex stramentis uocari tradit. In Africa exiguum, & inutile gignitur. Carthaginensis Hispaniæ citerioris portio non tota, sed quatenus parit, montes quoque sparto operit: hinc strata rusticis eorum, hinc ignes faciesq; hinc calceamina & paforum uestis. Ad reliquos usus laboriose uellitur in hyemem uix: Facillime tamen ab Idibus Maijs in Iunijs hoc maturitas tempus. Ager unde colligitur minus triginta passuum in latitudine non parat, à litore Carthaginis nouæ, minusq; in longitudinem longius enim uehi prohibent impendia: ideo spartum aliter etiam diuissum natura interpolatur, rursusq; quamlibet uetussum, nouo miscetur. Spartum nihil ferè utilius nauium armamentis, machinis ædificationum, alijsq; desiderijs uite: inuictum in aquis & mari, sicut in sicco funis è canabe.

S I L Y B O N. DCCLXXII

Silybon aut silybos spinosa perinde ut albus chamaelon, cui est similis: ne in Cilicia quidem, aut Syria, aut Phœnicie ubi nascitur, coquere tanq; est: ita operosa eius culina traditur. In medicina nullum Plinio usum habet.

B A L A N V S M Y R E.

P S I C A. DCCLXXIII.

Balanus myræfica, siue, ut Plinius & Aëtius appellat, myrobalanus, hoc est glans unguentaria, ex arbore fit, cui folium, ut inquit Plinius heliotropij: ut Theophrastus (nisi librarij corrupti) myrti: ut Dioscorides, myricæ, duntaxat oblongius. Arbor grandis incorruptaq; sed contorta. Unguentarij corticem glandis eius premunt odoris gratia: medicini nucleos tundunt affusa paulatim calida aqua, etiamq; Theophrastus inutiles esse dixit. Galenus unguentarios uti scribit expressæ carnis succo, medicis quoque utilem esse, carnem eius pro uomitorio sumentibus affirmans. Glans ea magnitudine, & aspectu capparj, aut nucis potius auellanzæ similis: lignum robustum, usu præcipue nauali, in Arabia nascens. Syriaca dicitur, & est candida. Contrà in Thebaidæ, nigra: præfertur illa bonitate olei quod exprimitur, sed copia Thebaica. Inter hæc Troglodytica uilissima est. Sunt qui Aethiopiam his præponant, glandem nigram nec pinguem, nucleo quæ gracili, sed liquore, qui exprimitur, odoratore: nascentem in campestribus. Aegyptiam cuius & Hippocrates ipse meminit, pinguiorem esse, & crassiori cortice rubentem: & quantus in palustribus nascatur, breuiorem ficioremq;. Ediuerso Arabiam uiridem ac tenuiorem: & quoniam fit montana, densiorem. Longe autem optimam Petræam ex oppido quod uocant Petrâ. Plinius & alij nigro cortice, nucleo candido. Differt à glande unguentaria, quæ nux odorata siue muscata

uulgo dicitur, incognita ueteribus, ut existimo, de qua in macher.

N A R C I S S V S. DCCLXXIII.

Narcissus folium albus terræ proximum, sed latus, ut lilio: pingue, frequens, angustum, caule sine folijs herbaceo. Flos in cacumine post arcturum & circa æquinoctium, ac uere: item post lilium & uiolam flammeam uocatam, membrana inclusus ceu uasculo, ampliusculus, nigricans, oblongus: qui defluens sponte germinet, præsertimq; defixus in terram manu. Seritur & radice ampla, rotunda, carnosa. Caulis, & cum eo flos crumpit, ut in croco, antequam folium: quod non antequam reflorescat, cernitur. Caulis cum flore suo emoritur. Radix bulbo assimilis: nisi qd non est squamata. Narcissus ter floreudo, tria sæsonum tempora demonstrat. In coronamenta flore ueniens, à narce hoc est torpore dictus, quoniam æput grauet, non ut fabulæ, à puero, Plinius duo genera constituit: unum flore candido, calice purpureo: alteri cætera eadem tribuit, sed calicem herbaceum. Omnes, inquit, serotini: post arcturum enim florescent, ac per æquinoctium autumni. Duo hæc, inquit, genera medicij præcipiunt, quasi & alia sint, quæ non recipiant, hoc est, ut arbitror, genus illud quod uere aut æstate nascitur, ut ex Theophrasti sententia prædiximus. Sciendum porro est, cum florem eius nigram à Theophrasto dici legimus, non de flore ipso quem candidum esse conuenit, intelligi, sed de semine, quod & membrana contegit, & nigrum ac prælongum esse constat: quo in terram cadente propagat se, atque serit narcissum. Eumachus Cyrenæus in Rhizotomico etiam croton & acacalida narcissum uocari tradidit. Nam croton in Hippocrate ad ulcera uetera & uulnera recentia probata, quid aliud sit quam narcissus, nō uideo: nisi quis croton pro crotone hoc est cici, capiat in eo. Iulius Pollux autor est Theophrasti morem fuisse, lirium pro narcissi dicere: Homerum uero lirij appellatione compositi florum omne genus. Narcissum ab adulescente suimet amore capto, & in eum florem conuerso natum in bogia Thelphesias garriunt, fontem Donacæ monstrantes, ubi se specularetur puer stultissimus, qui umbram suam à se nesciret distinguere. Coarguit hanc fabulam uetustissimus poëta Pampylus, qui Proserpinam multis annis antequam narcissus esset, captam à Plutone cecinit carpentem narcissos.

H I P P O P H A E S. DCCLXXV.

Hippophaës siue hippophyes & hippopheon Hippocrati. Galenus hanc, & gnaphon & stybon & styben quoque dici putat. Nomen uidetur accepisse, quoniam forte accommodata sit eorum natura: quemadmodum & ea quæ hippophaëton uocatur, post hanc dicenda: sunt enim unius ferè generis in binas diuisi species. Vtrunque nostrilappaginem, ut arbitror, appellauere. Similis, inquit, Plinius, anagallidi lappago uideretur, nisi esset ramosior, pluribus folijs, graui odore: quæ talis est mollugo dicitur: quæ uero asperioribus folijs, asperugo. Nervorum quidem causis utilem hippophaëton Dioscorides affirmat. Plinius lappaginem quæ dicitur mollugo: unde colligit nonnullam eandem esse hippophaëton, & molluginem.

H I P P O P H A E S T O N. DCCLXXVI.

I 4 Hippo

575 **H**ippophæstion hæc uidetur quæ Plinius hippophyes Theophrastū sequutus appellauit: tributam ei proprietatē scribendo, q̄ fructū spinosum habeat. Nascitur in spinis ex quibus fiunt ænæ, ut idem inquit fullonia, capitulis inanibus, folijs multis, herbacei coloris: radiculis candidis, quæ succo exprimitur ætate. Idem Plinius sextodecimo uolumine hanc non hippophyes, sed planē, ut Dioscorides, hippophæstion nominat inter herbas quæ fruticibus alijs circumuoluunt sese: quod notatur, inquit, & in spina fullonia hippophæsto caliculis inanibus, folijs paruis, radice alba, cuius succus ad detractiones in comitiali morbo utilissimus habetur: qui locus in Plinio deprauate legebatur ante nos, ita ut ut ne intelligi quidem posset à peritis. Paulus nō hippophæstion per i, sed hypophæstion per y. scribendum putauit.

C I C I.

DCCLXXVII.

576 **C**ici ab ea differt quæ cuci à Plinio & cuciphoron à Theophrasto dicitur. Cuci folio & uauide in Aegypto palmæ similis: quando & eius folijs utuntur ad textilia. Differt q̄ palma indiuidua est: at hæc cum adolefcit, in brachia ramos spargit: quæ pari modo & ipsa finduntur, uirgis breuibus neq̄ multis. Pomo rotunditas quæ manū impleat, colos fuluis, cōmendabili succo ex austero & dulci, nec congefito ut palmulæ, sed discreto: lignum intus grandis firmæq̄ duritiæ, ex quo stragulares annulos detornant, ut Theophrastus inquit: aut uelares, ut Plinius. In eo nucleus dulcis dum recens est. Siccat̄ durefcit ad infinitū, ut mandi non possit, nisi plurib̄ diebus aqua maceratus. Materies non ut palmæ rara, neruosa, uirens, sed spissa, carnosa, grauis, dura, crispioris elegantie: & ob id in magno honore Persis, ususq̄ ad lectipedes. Hanc à Theophrasto & Persicā rextilem uocari, Thebaica præfectura copiosam si qui arbitrantur, coniecturam potius q̄ rationem sequuntur. At cici arbor quæ Herodotus silocyprium uocat, ricinus à nostris dicitur, ut ipsum quoq̄ animal, canibus præcipue infestum, quod & cynoraista Græce dicitur & croton: q̄q̄ Theodorus crotonas re diuos conuertit, non ricinos. Fertini etiā nū hodie, ut ex Didymo Zenotele accepimus, quī nobis à sacretis est & anagnostes, uernaculo uocabulo rhaitstas canum uocant. Dicuntur & cynomyzæ à quibusdam. Sed & ouibus molestos esse ricinos testis ē Cato. Vulgus ipsum eos Græco nomine appellat cica. Galenus cica dici uult etiam bestiolas quæ frumentum corrodunt, quæ coetus cion dicatur. Is uermis etiam cis uocatur, ut infra quoq̄ diximus. Hippocrates hanc arborem uidetur intellexisse com crotoideas radicem in medicinas quidā adhiberi cōmonet. Aliqui non solū cici, sed ciceam quoq̄ nominant. Ab hac arbore conficta iurum uocabula 'cicilendri & cecimandri in Plautina fabula si dixerim, diuinare potius q̄ docere uideat.

TITHYMALI SEPTEM.

DCCLXXVIII.

577 **T**ithymalum & tithymalus penultima producta, meconion à quibusdā uocatur: nostri lactucam appellant caprinā marinamq̄: aliqui lactariam, quia & Græci galactida nuncupare soleant. Lactē tithymali inscripto corpore cum inaruerit, si cinis inspergatur, narrat apparere litras: & ita quidam adulteros alloqui maluerit, q̄ codicillis. Vfus, iā & in castra & obfessas urbes transiit.

CHARACIAS PRIMVM GENVS
TITHYMALI DCCLXXX.

Characias ramos habet digitali crassitudine quingaut sex. Semen legitur autumno cū comæ succus, incipiente pomorū lanugine. Tam seruentis hoc natura, ut per se extra corpori impostum pustulas igniū modo faciat, & pro caustico in usu sit. Nascitur & in maritimis. Alia omnino est characias, quam uulgaris sermo charanciam appellat: quoniā septi modo in hortis fenestrisq̄ per cancellos opere topiario digeritur: de qua ne uerbum quidem apud ueteres habitū inuenio. Balsaminam Ligures Padani uocant: Hierosolymitanū pomum, Ethruria, folio uicis minore, pampinis item uitium, turbinato utrinq̄ fructu, uisenda cūte, carnosa uertucosaq̄ per uerfus, cucumeris pusilli, & bucini marini quadam similitudine, malo uerius ac tubere q̄ grandi bacca, aut folliculo puniceus: maruo colore, sanguineo q̄q̄ succo. Inanitas confracta. Semina intus aliquot lentisculæ figura continet rubentia, ex quibus oleum exprimitur ad uulnera præcipuum.

TITHYMALVS MYRSINITES DCCLXXX
Ithymalus myrsinites à Theodoro myrtaria 578
conuertitur, mollioribus folijs q̄ myrti: Colliguntur comæ huius hordeo crassescere. Fructus de metitur cum messium maturitate. Hic nō pariter maturescit, sed pars sequenti anno, & nux uocatur: inde cognomen dedere Græci, caryitin. Est ubi Theophrastus clematiam, hoc est farmentulam uocat, folijs humi sparsam, palmi longitudine: nisi quis corruptū locum putet, legendumq̄ non clematiam sed carytiam censet.

TITHYMALVS PARALIOS DCCLXXXI.
Ithymalus paralios à Theophrasto coccos apellatur, folio rotundo, semine candido, quo uua incipiente stringitur.

TITHYMALVS HELIOSCOPIOS DCCLXXXII.
Ithymalus helioscopium semine albo, columbis gratissimum, quod colligitur nigrescente uua. Nomen accepit, quoniam capita cum sole circumagit.

TITHYMALVS CYPARISSIA DCCLXXXIII.
Ithymalus cyparissias, caule gemino aut triplici: nascitur in campestribus.

TITHYMALVS DENDROIDES DCCLXXXIII.
Ithymalus dendroides, aliqui leptophyllon cognominant, maxime caliculis rubentibus, & semine copiosissimum.

TITHYMALVS PLATYPHYLLOS DCCLXXXV.
Ithymalus platyphyllon aliq̄ corymbiten, aliq̄ amygdaliten à similitudine appellant: nec ullius longiora sunt folia.

LATHYRIS DCCLXXXVII.
Athyris folia habet multa lactucæ similia, 582
tenuiora, ut Plinius tradit: germinibus crebris. Semina piperis magnitudine, facilia purgatur.

PEPLOS DCCLXXXVIII.
Eplos ex una tenui radice fructificat. Hanc & meconion & meconitin ab Hippocrate uocari, Galenus auctor. 585

PEPLIS DCCLXXXIX.
Portula

Portulacæ syluestres uocari herbas treis inuenio: unam quæ sit aizoi species: alteram cognomine Telephion: tertiam peplin siue peplion, de qua præsens mētio. Quid autem sit diplion Aëtio, qui ad autorem id refert Areteum, haud scio: Teren dum cum aqua, inquit, in angine morbo diplum, & subiecto linamento imponendum pectori, quoties præfocatio timetur. Sunt apud Græcos inter quos ista cius qui peplum pro fenna modo appellata intelligant. Ego diuersum puto genus, cum fenna siliquas & in ijs semen ferat, peplis non ferat. Alia est & sen nicula siue fanicula uocata, transalpina herba, folio uicis aut apij rubentibus, in sine sectionum maculis quibusdam, furculis quoque rubris ad radicem, quæ multis ei fibris subest: capitulis in summo frutice pusillis subnigrisq. Huius succum uulneratis in potum commendat. CHAMAESYCE. DCCXC.

Chamæsyce pumila ficus est, quasi tetræ ficum significans.

SCAMMONION. DCCXCI.

Scammonia, siue ut Cicero & Plini⁹ quæ appellant scāmioniū quamquam scāmioniū pro succo eius quoque capitur. Frigida amat loca, pingui tamen & arido solo nascens. Lachrymam ē radicē suā fundit, folijs albis pinguibus, radice nauseosa. Circa canis ortum succus excipitur. Adulterant tithy mali marini succo, maxime in ludæa, quod etiam strangulat, sumptum. Vis bimo, nec ante nec postea. Laudatur natione Colophonium, Mysum, Priennen se, specie autem nitidum, cito liquefcens, uirus redolens, somniosum, ling uæ tactu lactescens, & cum diluitur albescēs. CHAMAELAEA. DCCXCII.

Chamælæa frutex est petrosus. Sunt ei ut quidam habent codices⁹ mora odorata Plinio. Quidam folia ei amara & odorata scribunt. Si millimum huic oleum inest ut oleastro, cuius & bacæ quoque similes habet, ob id a quibusdam oleastellum & olea cilibraca uocatur autore Columella, sirapam inde condi solum scribente. Sunt qui succum in Gallia aut Italia nascentis eundem esse cum Euphorbio putauerint: sed hic multum infra illum est. Ex hac & granum cocci perlicum falsò nasci existimauere. Nostri & hanc, & thymelæam præcipue casiam uidentur appellasse. Theophrastus cneoron, Higino id apud nos cassiam interpretate, cuius duo genera feruntur: candidæ, cui folium cutis modo quadrantenus oleagineum: nigræ carnosum, tamarici similis, siue ut in Theophrasto quidā (quos probo) legunt myrto. Cādida magis humi se spargit & odora ta est: nigra sine odore. Radix ambabus alta, prægran dis: rami copiosi, crassi, furculosi, ab terra protinus aut paulò supra emicant admodò lenti, ut quibus ad uincendū pro iuncu urantur. Venere in coronamēta folio. Post æquinoctiū autumnū germināt, atq; florē mittunt qui diutinus eis est. Hæc tota de cneoro siue cassia Theophrasti sententia est. Dioscorides cnestron & cneorò uocari thymelæā prodit. At ego nō cnestrò, sed cnestron legendū arbitror: Hippocratis & Galeni, & codicū uetustiorū fretus autoritate: Hoc ipso nomi ne cultellus appellatur, quo casei scabuntur: quæ & ty rognestis & cobelis quoq; is dicitur Polluci. Liparonis herbæ meminit Aëtius, & Alexandria sic uocāte, quā aliqui cnestron, inquit, nomināt, ad ulcera capitis manantia uehementer utilis. Nec indicat is autor qualis ea sit: utrum uē a thymelæa siue cneoro

diuersam an eandē putarit. Rectiores ut plerq; oia chamelæā & thymelæā cū daphnoide turpiter cōfū dunt.

THYMELAEA. DCCXCIII.

De thymelæa granū siue cocci Gnidii enasci constat, myrri magnitudine, colore & specie foris, autore Dioscoride, nō farris, ut in Plinia nris codicibus deprauate legi. De thymelæa nōnihil & superiore protinus mentione diximus.

SABVCVS. DCCXCIII.

Sabucū medulla carere aiunt nōnulli. Theophrastus carnosum ei adiungit. Fruticosa uirgis arbor: quæ anniculæ donec folia deciderint in longit udinē crescant, in fenna maxime cubita: post id tempus, in crassitudinē fundatur. Lignū fungosum, & cū inaruit, leuissimū, medulla molli, quæ tota uirgulis eximitur, baculoq; usu. Siccata durat, inoffensumq; aquia redditur, etiam de corticatū, quod ei sponte arido contingit. Caudici crassitudo galeæ. Cortex leuis, tenuis, pilis, quæ uocant canopū, cuius a Græcis in Iuliani oxymelie sit mentio. Radices tellure summa, nec multas, nec grandes agit. Folij minus, quod quidē pars est maioris, molle oblongumq; habet, ut laurus latifolia, maiusculū tamē latiusculumq; sub⁹ & situ medio rotundius, exa cutū serratumq;: foliū uero maius, quod ex illis minoribus quasi coalescit, pediculo uno crasso & ner uoso geritur, ceu ramulus, folijs utrinq; geniculatis & ordine iugatis, uno in uerticibus relicto singulari. Subrussa hæc & fungosa, & de singulis petiolis uniuersa collabitur. Sūt & in ramis nouellis internodia sed quasi rudia, inarticulataq;. Flos cādids, ex flosculis minutis faui specie cōgatus, & pediculi fissura, graui odore, quæ liliq. Fruct⁹ quæ racemam pediculo unico dependet actione uocat⁹: qui cum ematuruit, nigrescat. Immature color uuæ acidæ, paulo maior q; granum, humore leno. Manus capillumq; inficit. Crana intrus scāmacea, nō ingratæ turdis sturnisq;: locis potissimum opacis & iuxta aquas agnuntur. Differt a ferulaceo genere, q; plus ligni ac fucci habet q; ferula. E sabuco magis canoræ buccinam tubamq; credit pastor ibi cæsa, ubi gallorū cantū frutex ille nō exaudiat. Dictam aut pro arborē a sambuca musico instrumētō, quod alijs pectida uocant, alijs magadin, ut in harundine notauimus. Sam buca porro ab autore uidetur appellata, qui nomen sambyx fuerit. Vsam tamen ea primā omnī Sibyllā perhibent. Arbor utiq; ipsa non sambucus, sed sabucus dicenda est, si Sereno Quinto credimus.

EBVLVS. DCCXCV.

Ebuli siue chamæactes, hoc est, sabuci pumile foliorū decoctio, mucræ necatur: nam & colibuli macerant aqua, ut ea sparsa culices abigantur. Baccas flores ē ebuli aut sabuci uidetur intellexisse Plautus cū dixit in Captiuis: Laridū, Atq; ebubulas foueri foculis feruētibus: nisi quis herbulas in eo uer su lecitare malit: aut q; propius est uero, epulas. Quidē: Epulisq; soli miscere calētes. Aut hanc aut ualde simile esse puto, quā Plinius ac tæan uocauit xxvij, uolumine: Actæa, ingt, graui foliosq; odore, caulibus anisi geniculatis, semine nigro ut hedera, baccis mol libus. Nascitur in opacis, & asperis, & aquosis: datur acetabulo pleno interioribus feminarū morbis. Pro eo qd Dioscorides in caulib⁹ umbellæ & capitula chamæactē habere scribit, Plini⁹ caules anisi reddit ei: quū nō caulib⁹ anisi, sed asperis in perisq; legi codicibus, sed ex eplaria quædam uetusta legūt anisi, nō asperis.

PRYCNQ

P Y C N O C O M O N . DCCXCVI.

590 **P**ycnocomon caule tenui, modico.

A P I O S . DCCXCVII.

591 **D**e apio herba cognomento ischas, quæ raphani sylvestris genus est, uolumine secundo locuti sumus: ubi omnia hæc ad uerbum ferè uidentur esse repetita. Plinius oposcillam uocauit: ut arbitror, corrupte pro apios ischas.

C O L O C Y N T H I S . DCCXCVIII.

592 **C**olocynthis cucurbita est sylvestris, plena ipsa, nec inanis, ut somphos minor, quæ satiuæ, primo herbacea, mox pallida, quæ et utilior est: quando eius sunt medicinæ. Hippocrates sylvestrem cucurbitam sicyonem, et quæ fundo careat, et specie globosa et uniformi sit, sicyanum, hoc est insectilem appellat: interiorum uero partem eius, spongiam.

E P I T H Y M V M . DCCXCIX.

593 **E**pithymum flos est thymi, sed non omnis. Differencia, quod hic herbaceus, alterius thymi candidus. Aliqui eum hippopheon uocant. Quidam aliter epithymum tradunt sine radice nasci tenui, similitudine pallioli rubens.

A L Y P O N . DCCC.

594 **A**lypon et alypea, et ut Paulo placet, alypias, cauliculus est molli capite, non absimilis betæ, ut inquit Plinius, ac re gustatu ac lentum, mordensque uehementer et accendens. Caput id est radicem eius betæ similem intelligo, non folia: quippe quæ minuta ei sint, ut Dioscorides affirmat. Deprauate in Plinii uigesimo septimo libro aliphon per alypo legebatur, antequam ipsi locum indicarem.

E M P E T R O N . DCCCL.

Empetron hoc praeoides à Dioscoride, praesoides à Galeno et Paulo cognominatur. Ferè in saxo nascitur. Recenti uires sunt, ut est uisitate perdit eas. Lappilos qui iusserueant, una tumpi affirman: quod et in saxifraga quoque diximus ex Plinii sententia, ut qui nihil differre ab ea iudicant: quandoquidem medicinas, quas scorum in uaria mentione Dioscorides enumerat, ipse uniuerfas empetro huic assignat. Aut igitur ita sentitendum est, aut Plinium errasse confutandum. Paulus certe Dioscoridem securus, mentiones duas habet, quasi duorum generum. Galenus unicam empetron, Aëtius etiam epipetron uocari solitum affirmat.

A M P E L O S A G R I A . DCCCLII.

595 **A**mpelos agria hoc est uitis sylvestris, cæditur horis omnibus, sed præcipue autumno. Radice acris, ut Theophrastus scribit, folio spisso, candicante, geniculata, rimoso cortice, uis rubentibus cocci modo, ut Plinius uigesimo tertio uolumine. Hæc et pro amulero, cuius sit proprie uua Taminia. Radix et acini coria perficiunt: gelidissimaque eorum est natura: ut enarrauit Theodorus, qui uerba illa in Theophrasto *φασκίον τὸ κατὰ τὰς ἀκτῆρας*, interpretatus ita sit: fructu defoliant arbores: cum legere debuerit non *ἀκτῆρας* hoc est arbores, sed *ἀκτῆρας*, hoc est corium: nec defoliant, sed depiant et subigunt. Pars acinorum æstu moritur, priusque reliqua, qui et solstitiales dicuntur. Vniuersi nunquam maturescunt, et si priusquam tota uua maturecat detur cibo. Generi gallinaceo fastidium gignit, uuas appetendi. Flos huius in racemis candidus dependet, solani per initia: post diuiditur in uicia ferè imaginem, sed oblongum. Est et si

milis, sed in salicis nascens ad eisdem usus quæ salicæstrum uocatur, contra hominum et quadrupedum scabiem. Plinius uigesimo septimo ita descripsit: folio duro, cineracei coloris, utriculis callosis, rubentibus qualiter flos, quem Iouis flammam appellamus in uiculis, ferens semen punici mali simile in acinis, ad eodeme effectus: propterea et recentioribus uere quæ hanc et flammulam et Iouis quoque flammam uocantur. Est et labrusca uitis sylvestris una species, cenanthen ferens, duorum generum, albi et nigri, ut Dioscorides post docebit. Ne uiculis decipiat Pliniana lectio: Labrusca, inquit, cenanthen fert satis dictam, quæ à Græcis ampelos agria appellatur, spissis et candicantibus folijs, geniculata, rimoso cortice, fert uuas rubentes cocci modo, et reliqua: his uerbis Plinius uigesimo tertio uolumine duos fructus non unum designat, labruscam et quæ ampelos agria uocatur.

A M P E L O S L E U C E . DCCCLIII.

596 **A**mpelos leuce, hoc est uitis alba, quæ et bryonia et bryonias à Columella: et madon ab aliquibus uocatur, et cætosus ab Hippocrate, melothron (ut putant) à Theophrasto, in coronas folio admissa. Quidam pilothron dicunt: quia pelles confici huius acinis quemadmodum et labruscæ possint. Huius farmenta longis et exilibus internodijs geniculata scandunt. Folia pampinosa ad magnitudinem hederæ diuiduntur, ut uicium. Radix alba, grædis, raphano similis. Semen in uuaris acinis deperdet, succo rubente, postea crocino. Succus radicis colligi debet ante maturitatem seminis.

A M P E L O S M E L A E N A . DCCCLIII.

598 **A**mpelos melæna, id est, uitis nigra, quam proprie bryoniam uocant, aliqui gynecanthen, aut aproniam, similem priori præterque colore, ut Plinius existimat. Sunt et in folio discrimina, ut Dioscorides, et ipsa quoque res demondstrat. Huius semine nigrum asparago simile. In frutetis, et harundineticis maxime nascitur. Aiuunt si quis in uilla eam extruxerit, fugere accipites, curasque fieri aues uillicatas. Hæc etiam tannum siue tannum quidam uocari putant, et uulgo tamarum. Q. Columella:

Lubrica iam lapatos iam tami sponte uirescunt. Sunt qui tannum quoque scribant, non tannum aut tannum.

P T E R I S . DCCCV.

Pteris hoc est filix, marcescit simo injecto, et ob id pecoris incubitu, quod et in Medica herba nonnulli tradunt. Nullus filici incise succus. Radici gustus est dulcis alstringens. Vna hæc est et exca filices exeunt, bina etiam cubita excedentes longitudine: hanc marem existimant. A filicibus filecta, ut à caricibus careta dicta. Est autem carex et qua mollissima texuntur cathedra, folio ferè harundinis ulginoso, et palustri folio plurima. Seruius caricem describit acutam et durissimam, sparto similem. A filicel felicones dictos existimant, quos ueteres pro malis et inutilibus accipiebant. Dicebantur et felicati calices à filice.

T H E L Y P T E R I S . DCCCVI.

600 **T**helypteris alterum filicis genus fecminam appellat. Folijs hæc breuior, mollior, densior, caliculata. Vtriusque radicibus fues pinguefcunt, quæ sunt eis longæ, obliquæ, nigra, præcipue cum inaruerit. Siccat eas sole, uergijs occidens effusas. Nascitur ubique, sed maxime frigido solo: uiridis laticibus

lateribus pinnata, unde Græci nomen imposuere. His cimices negantur. Serpentes non recipiunt. Vnus radices in trimatu tantum, nec ultra nec citra. Laudant in utroq; sexu Macedonicam, deinde Cassiopiam.

POLYPODION. DCCCVII.

601 **P**olypodion nostri, ut Theodorus putat, filiculam appellant, in Plinio ita legens: Ego filiculā dicendum arbitror cum ex Dioscoride, tum ex filicis similitudine: tum ex Carone, qui filiculam uo-
cauit, ad deiciendam aluum præberi iubens eam. Eodem modo & Columella nominauit, unde uinum polypodites quoque ad eundem usum fit, præcipuū in Phœnice oppido eius bybulo, inquit Aëtius. Post imbres semper emicat hæc herba: floret, & semen non fert.

D R Y O P T E R I S. DCCCVIII.

602 **D**ryopteris folio subdulci. Diuersa huic, sed similis est, dryophonon à Plinio uocata, cauliculis tenuibus, cubitalibus, circumdati utrinq; folijs, pollicari amplitudine, qualib; oxymyrsine, sed candidioribus mollionibusq; flore candido sabuci. Edunt cauliculos eius decoctos, semine uero pro pipere utuntur.

C N E C O S. DCCCIX.

Cnecos à Theodoro cartamum sermone vulgi dicitur. Multis caulibus, ramistylis spargit. De syluestri diximus in atractylide. In cneco peculiare illud à Theophrasto redditur, qd syluestre tenerius, leuius, & semine copiosius habetur: satiuum durius, spinosius. Cnicon Italiz ignotam, ut Plinius scribit, Aegyptus maxime celebrat, oleo nō cibogratam: hoc faciunt ex semine eius, quo & psitaci nunc aluntur. Cnecos melius q̃ cnicos dicitur: nam & cnacon à feminis colore Theocritus pro candido, siue flauo usurpat. Democritus & omnino chymici florem cnici echumenion appellant. Iidem elydion herbā nominant: nec quæ sit ea docent, præterq̃ qd lutei sit coloris. Inuenio tamen in opisthographis medicinalibus quibusdam pro chelidonio minore acceptam elydion.

L I N O Z O S T I S. DCCCX.

603 **L**inozostis siue parthenion, à Mercurio inuent⁹ est. Ideo apud Græcos ἰπυὸν ἦσαν & ἰπυὸν Βορὴν λέβ multi uocāt: caule utriusq; generis cubitali interdum, sed ramofo in cacumine, geniculis densis: se-

men in geniculis dependens, foemina solutum & candidum: mari, iuxta genicula stans, breue, rarius, contortum. Folia ocimo angustiora, sed maribus nigriora, foeminis uero candidiora. Radix superuacua, prætenuis. Nascitur in campestribus cultis.

C Y N I A.

DCCCXI.

Cynia non est ea quam Theodorus canariam 604 interpretatus est, ut in culice docuimus.

H E L I O T R O P I V M M A I V S. DCCCXII.

Heliotropium à Cornelio Celso solaris herba dicitur, æterno folio: particulatim ut ocimū floret: ideoq; per q̃dū. Incipiens ab imo per solstitium circumagitur se cum sole, ut nomen indicat, ut ortum eius mane spectet, & eius iter ad occasum usq; persequatur: sed & nubilo die. Noctu uelut sideris desiderio contrahit coeruleum, ut Plinius ait florem, album subruffumq; ut Dioscorides. Genera eius duo: maius heliostrophon cognominatum, & minus: q̃q; utrunq; semipedalem altitudinem non excedit. Semen in folliculis messibus colligitur. Nascitur non nisi in pingui solo, cultisq; maxime. Colos heliotropij unus est & tribus fastigijs in quæ conchylum diuisere ueteres: nostri verrucariam appellauere, ut ualētrem contra verrucas. Si terram furculo huius circumscribat aliquis, negant scorpionem egredi. Imposita uero herba aut inde omnino respersum, protinus mori. Formicas certe agri efficacissime necari heliotropio monstratum est, oppilatis herba earum foraminibus. Succum huius excipiunt estate hora sexta, miscentq; cum uino, ut sit firmior. Multa magi de ea, sicut de cognomine quoque gemma, pollicentur: sed hæc propositi nostri haud sunt.

H E L I O T R O P I V M M I N V S. DCCCXIII.

605 **H**eliotropium minus, tricoccum priuatim appellatur. Vbiq; provenit, folijs non solum minoribus, sed etiam in terram uergentibus. Semen & huic effigie scorpionis caudæ, de quo & scorpius ei nomen est.

S C O R P I O I D E S. DCCCXIII.

606 **S**corpioides à Plinio scorpius uocatur, ex argumeto nomine accepto. Est & alia eiusdem nominis effectusq; asparagi cognomine, sed in totum spina: nullum enim folium habet, caule asparagi, cacumine aculeato.

LIBRI Q V A R T I.

F I N I S.

HERMOLAI BAR.

BARI PATRITII VENETI, ET AQVILEIENSIS PATRIAR.

cha, in Quintum Corollarij librum, PRÆFATIO.



ITES IAM ET EX HIS VINVM VEL PRÆCIPVVM HOMINI bonum, si temperamentum adsit, exequimur: in quo tamen si diligētius æstimare uolumus, uita sine causa maxime operosa fuerit, cunctatur & providentia nobis defuisset, tanta aquarum profuentia copia, tot fontibus, tot lacubus ac fluminibus: & ne accusare eam posses, cœlestibus etiam aquis irrigata sepe terra. Nec uero quicquid est (præterquod & opere maximo, & impendio paratur) unde plus flagitiorum ac scelerum sit. Nam q. pedes, q. lingua nutent, q. surimus, q. mente mouemur, q. deniq. unus oim animantium homo libidini ac rei Venere & semper indulgeat, uino acceptū ferre par est. Iam assiduos morbos, re pentinas mortes, & uenena epota cui uerius ascribas: ut arcana per hoc prodita, & animi secreta prolata, & testamenta nuncupata, tunc maxime taceam. Illa uero monstrosa eorum sitis, qui in ostentationem uiri um nudi cados hauriant, uomitūq. repetito sitim etiam per gladios promouent, quasi uina perdi melius non possint q. per humanum corpus. Quamō melius uitæ consuluri, si omnino abstinerent. Nunc uero, (si dijs placet) & irrita menta temulentiaë quesita. Nec nostratia iam placent, ipsæ alpes ac maria penetrantur, destinatis qui solertissime omnes etiam terrarum angulos indagent. Quin imō propolita his premia, qui scitissima de ferant. Nec hactenus restincta sitis: ipsi etiam poculis magnitudo est sua, formaq. qua maxime tenuitas utri bibendo blandiatur, assignata: leges insuper ac dictata bibendi præscripta: & cum certis cancellis inclusa reliqua sine, nullum non tempus inuadendi se largius placet, ebrietasq. premijs uel poenis inuitatur. Huc accedunt uasa adulterijs celata, formæq. obscenæ his redditæ, tanq. temulentia ipsa ad inflammandas libidines non sufficiat. Imocentius certe Maomeibæ sectæ homines hac in parte agunt, qui uino penitus ex lege abstineant. Nec uero nostris olim heroibus uini usus tam probatus q. non interdictus. Frequētia in eo omnia, ac temulentia maxime prohibita: plerisq. tantæ constantia penitus abstinentibus, ut salutem uini po: illo promissæ neglexerint. Romani ueteres id in sacris modice primum usurparunt, quod & nos retine amus sacratiore mysterio: ut interim sciamus fœminis eorum omnino interdictum: celsamq. ab eo coniugē, quia uini loculos refiginasset: & tamen nulli tunc subsefores alieni lecti timebantur oculi. Gentes certe multe uini usum consensu reiecerunt, multis etiam ad malorum remedia uiles ademptæ: nunc certatim passimq. in id omnis ruunt. Coacta etiam per summam iniuriam tellure illa ferre quæ noli, & acerbius incusata, q. præcipuum uitiorum fomite non generet. Quid q. lauities aut uictus elegantiâ nulla iam existimetur ubi uinum desit: cuius similitudinem per ipsas fruges, & aquam multi ad septentrionem populi appetant. Adeo uero nulla iam pars mundi ebrietate uacat: siquidem ipsum aque saluberrimum aliqui liquorem noxiū fecerimus. Quod si ignorant homines, quantum nobis uini haustus obsit, id saltem ex morbis ingruentibus aduertant, medicis nihil prius aut acrius interminantibus q. eius usum, pollicentibusq. nos de citius conualituros, quō fortius abstinebimus, & postea naturæ maiestatem cottidie ream facimus, probraq. illi ingerimus tanq. noxia parienti. Illa uero statim animantibus omnibus aquam de derat, & nostrum hoc scelus unum est, uini inuentio, meritis interim supplicijs affecto, qui primus excoctas set. Ex quo appareat q. perniciosiores futura esset, quæ ab ipso initio in autoris calamitatem redundaret. Ceterum q. in hoc iure hominem accuses, tam in metallicis, ac lapidibus perquirendis ad uitæ utilitatem, solertiam atq. industriam probes: quæ pars coronidem labori nostro attulit. Quare ut sartum (q. aiunt) opus etiam ad perpendiculum redderem, rurs ipsa & celsa euoluisse fastidium nullum fuit: nec rerum humilitas obsistit, diuin modo prodesse uita enim hominum ad usum omnem operam, industriam, uigiliasq. meas iam pridem dicaui. Deus faxit, ut quo animi candore ac propensione hæc prodidimus, eodem ab alijs æstimentur. Sed quicunq. genius fors q. operis futura sit, conscientia certe nostra plurimum uoluptatis etiam defuncto allatura est: quādo omnia à nobis ea mente ac studio laborata sunt, ut iuuarem: ut tamen in super uacuis diligentiam meam non obstrinxerim, quam præstare consilij nostri nunquam fuerit.

HERMOLAI BARBARI PA

TRITII VENETI, ET AQUILEIENSIS PATRIAR-

CHAE, COROLLARII LIBER QUINTVS.

VITIS SATIVA. DCCCXV.



ITEM SATIVAM

Græci *ἐμπύκνον*, & *οἰνοῖν*, & *οἰνοῖον* id est urbana nam, & vinum ferentem vocant, item clematida & clemacem interim & cenanthen, ut placet Lulio Polluci. Superuacui genera eius persequi, quæ totidem vitium aut immaturæ esse quot soli. Nascitur passim & in alto vitis, & propinqua littori. Durare vitem ad infinitum restibili fecunditate perhibent, culturæ quodam genere, Theophrasto autore ad Elephantinæ, ut idē scribit, & Varro mutuatur. Non decidunt vitis folia, neque circa Memphim. Ad Delta quoque Nil ferē tota vitis semper, quod & alijs quoque satis accidit. Capnia vocatur unum vitis genus, quæ uiam nigram ex candida, & candidam ex nigra sine prodigio ullo ferat. Infanz uites appellantur, quæ ad florem usque perducunt: quæ etiam est ubi Plinius infanz uites triferas appellat: quoniam in his alia maturescunt, alia turgescunt, alia florent: Smyrnæa triferam à se usam, M. Varro etiam prodente. Vitis candida melius reddit, quæ lætius fuit germen: quod quidem & huic & fico proprium. Vitis capreoli tribuntur: & uicis, quos & clauiculas & pampinos uocamus, Græci helicas: is est colliculus, ut Varro inquit, vitis, intortus ut cincinnus, à capiēdo dictus, quoniam ad locum capiendū fursus uersus serpat: sicut vitis dicta primo, quoniam inuitatur ad uvas parietas: & à pariendo parilema, deinde palma literis immutatur. Est autē palma maior flagellus, unde nascuntur uvæ, palma unius in uersione literæ à uenti statim dicta, ut idem Varro inquit. Eadem vitis caprea nominatur, quia capreoli pareret. Vicia & pabuli genus est à uinciēdo appellata, quæ item capreolos habet, ut vitis: & ad scapum lupini, alium uel calamum ad quem hareat, id solet uincire: unde uicialia pro pabularibus & uicia dicunt. Vicia tamen duplex, seminaris & pabularis uocata. Recentiores Græci biciam appellant, à uostris, ut putato, mutuari. Consistit in uitis lachryma largior incis, paulo ante germinatum: parciō autumnino, & hyemis initio: minus fecundæ crebrioribus oculis gemmantur solidiores: huius feruntur. Ipsæ appellamus uermes in uitis nascentes austrinis statibus. Peculiaris uiri morbus tragos, hoc est hirculus, importuno uento germinibus abscissis, uel imperitia colenti uel obliuisci. Theodorus articulationem uocat. Hircescere porro uites dicuntur, cum infocundæ sunt: quoniam & hircus animal, ut inquit Aristoteles, sterile scit pinguedine. Uvæ ipsæ & pampini laborant cranibo, qui similis rubigini est, sole post humores longos insequuto uehementi. Est & niuatio siue oratio, quociens uua desolente ninxerit: præterea excitatio, quam Theodorus exuperantiam appellat, Græci *ὑψιστή*, quociens acinæ racemis desiliunt, sine granis in

terioribus uuas arte nasci autores Græci posse docuerunt, agigarton id genus uo canes. Vites arbutiusque sunt, & simplices: arbutius Græci anadendridas & dendritidas appellant: arbuta uero ipsa, siue ignobiliori uoce arborea, idem Græci anadendradas, & aminyxidas, & amamaxidas Epicharmus & Sappho: nam & arbutusculæ testudinum (instrumenti nomen id bellici est) amaxapodes uocantur, in quibus rotarum uersantur axiculi, ut Vitruuius Pollioni placet: Quam non desunt qui genus uitis ammyxidas & amamaxidas accipiant. Alij uiam bumaston, alij hesperion uocatam interpretantur. Auoschas Parthenio uitem significat: Eratostheni, ramus eius cum racemo dicitur: Apollodoro uitis elinos: quo nomine Philetas & Nicander ramū eius non uitem ipsam capiunt. In Hircania feracissimam esse uitem mirati sunt scriptores, cum sit aquilonibus exposita: nam in Carmanis & Margianis Arianis, crassitu de tanta caudicis est, ut bini homines plerumque amplexi nequeant, bicuitalibus racemis. Vitem Bogij Thebias primum natam putant, qua & Liber patet.

VITIS SYLVESTRIS. DCCCXVI.

De uite sylvestri superiore libro diximus.

V V AE.

DCCCXVII.

Vnam Græci *ὑψιστή* à Staphylo Liberi patris filio, ut Ptolemæus uoluit, appellant: Lenida etiam poetæ: nam & Lenæus dicitur is deus.

Alia porro uua eliquescit in potum, alia eligitur ad uescendum: hæc aut in corbula secernitur, ut inde addatur in ollulas, quæ in dolia plena uinaeori tradatur: alia in piscinam picatis amphoris demittitur: alia in haram canario suspenditur. Uuam Amineam minusculam, & maiorem & Apicam commodissime in ollis condi putauit Cato. Eiusdem generis in sapa & mulso rectissime feruant. Duracinas, Amineas & Scancianas affirmant oportuissimas esse quæ pendeant: quod genus omnes conditaneas & condituias appellamus. Uvæ in palea seruatz pensilibus proximæ dicuntur. Uvæ uehementiores nigra: deo huius uinum ex ijs minus octundum. Suauiores Lenida, quoniam aëra translucida facilius accipitur. Est & uua cheriæa uocata, quæ contra morsum omnium bestiarum proficiat: cuius rationem ferendæ Palladius instituit. Florem uvæ in cibis dari gallinaceis præcipiunt, ut præterea non attingant uuas, quod & in labrusca diximus.

VINACEI. DCCCXVIII.

Vinaceus Græce stemphylon uocatur. Dicitur & uinacea neutro genere, Palladius etiam foeminino uinaceam: hæc & flores appellantur, sicut in oliua flaces atque fraces. Vinaceos poetæ sunt qui brycia & brytea quoque appellant: quæ & pro fratribus oliuarum sumuntur. Stemphyla in Aristotelis Rhetorico secundo Cellius fecem ipsam & uinaceis & oliuis expressam, flaces & fraces dici scribit.

NUCLEI ACINORVM. DCCCXIX.

Nuclei acinorum uua & Græcis gigarta dicuntur: Palladius excrementa, & semina, & grana uua interiora nominauit, Ab acinis acinatici

508

509

cum dici uinū existimo Veronēsis agri, ut scribit Cal-
siodorus alumnū, odoris saporisq; suauissimi, colore
purpureo, ineffabili dulcedine, tactu quoq; densum
atq; pingue: ut catneus liquor, aut potio esculenta ui-
deri possit. Laudatur ex eodem agro & Rhetica uete-
ribus in montanis Rhetor, qui supra Veronā sunt,
nascencia, ut inquit Strabo. Ipsos acinos Cato acina,
Catullus acinas pronuntiant.

VVA PASSA. DCCCXX.

Va passa Græcis staphis & astaphis ἰστίς, hoc est fatua dicitur. Cæteræ Apameas inue-
nio celebrari passulas.

VVA OENANTHE. DCCCXXI.

611 V Va oenante quā uites syluestres, hoc est la-
brulcæ fetunt, laudatissima est in Syria, ma-
xime circa Antiochiæ & Laodiceæ montes:
item ex alba labrula. Sunt qui principatū in unguē-
tis dent in Parapotamia nascētū: deinde in Antiochia
& Laodiceæ Syria: tertium locū ex montibus Medi-
cis, quæ & utilior medicina. Quidā omnibusq; præfe-
runt ē Cypro, Vitis ea, quæ massatis in Africa uocatur,
nunc medicis, nunc odoribus tantū gigni Plinius as-
firmat. Nascitur in Africa & uitis quā uolima uocat
accolæ, oliua in uites insita, utriusq; fetu cū arboris fe-
rentem: hanc Græci & elegostaphylon appellāt. Vinū
oenanthinū fit duabus libris floriū in multo cado ma-
ceratis, q; post triginta dies mutatur. Oenanthen &
a uitis dulce uiniū ferentibus arbutiuis maxime
colligi quidā præcipiunt, nō syluestri tantū. Labrulcā
dici putant, q; in marginibus terræ seu labris quibul-
dam ferē nascatur. Vinū anthosmias, ab odore floris
dicitur, nec idem cum oenanthino uino est: pro pre-
tioso sane capitur à Græcis: eius mentio est apud Ari-
stophanem & Hippocrate, & alios, uel promiscua.
Hippocrates certe hoc etiā anthinen uocauit: aliqui
anthinen pro anethino capiūt, ut Galenus inquit. Nā
uiniū cognomēto Hippocraticū Callis maxime tras-
alpinis gratissimū, fictici generis est, facili ratione.
Cinnamomū, saccharū & carpesium teritur in pisci:
ex eo uinū liquatur, ut transfundat qualitates eas cō-
bibat. Datur hoc epulis principalibus cum elcharite
pane bellariore uice, qui mos, sed in alio uino, peculi-
aris Atheniensibus fuisse legitur.

OMPHACIUM VITIS. DCCCXXII.

612 O mphiaciū siue omphax, id est acor, siue ac re-
mentum uūq; ab immatura uide dicit, quæ om-
phax à Græcis uocatur. Est & oleū omphacium,
de quo inter unguēta diximus. E Thasia, ut Dioscori
di uidetur uua, ē Phytia, ut Plinio, probatur acor: cū sunt
acini cicetis magnitudine, ante canis ortū incipiente
pubertate. Pretium in libras sex. Solet & aliter fieri
uinū immaturā terendo in mortarijs, siccataq; in so-
le: postea digeritur in pastillos.

VINUM. DCCCXXIII.

614 V Inum dicitur Græce dicit. Cratinus Matonē uo-
caphilalethen puerba: quale illud est, uinū
& ueritas: item illud, non habere uinū te mo-
nes. Pittacus ut æs frontis, ita uinū mentis esse specu-
lum. Aristophanes uinū loco Veneris appellat: poë-
tæ uinū etiam πῦλον dicunt, quasi uibrare mentē faci-
at: unde ctripula, inquit Phorion, dicitur κριπῶλον. Folia
uitis priuatiū cenaria uocatur à poëtis, & sarmentā
cenariis: ipsa porro uitis ab Hippocrate nominatur
cenarion. Tenuissimū est id quod celerime inuetera-
tur: nam cui fumī amaritudine accescit ætas, insalu-

berrimū putatur. Quod genetiosius uinū est, hoc ma-
gis uetustate crassescit, & in amaritudine corpori mi-
nime uilem coit. Saluberrimū Campaniæ, quā uenit
tenuissimū, utilissimū cuiq; uitis edomitis sacco.
Vinū alit uites, sanguinē, colorē: sicut lactis potus, of-
fatur frugū, neruos aquæ, carnes. Simias & quadrupes
deditas negat crescere allueta uini potu. Vinū
de dando uino uolumen Alcibiades condidit, ab eo
cognominatū: in quo utilitatē eius uix deorum po-
tentia æquari posse pronuntiauit. Vinū succus est, q
feruendo uires multo sibi fecerit. Multū Græci γιν-
ησι, & γινῆντιον uocat aliqui. Vinū oē aut multū est, aut
uetus, ut in proverbio sit uinū medium, pro aqua:
quod & prandii caninū dicitur apud Varronē & Gel-
lium. In Plauti Cassina mendosus est senarius: Adibo
caninam scæuam, spero meliore fore. Scribendū est
non scæuam, sed cœnā caninā, hoc est abstemiā. In
Latino agro, & Campano ad montē Vesuuium, qui
summani dicitur, uites modo habetur Græcæ appel-
latæ, uino inde pressū, quod Græcū nō ante dicitur, q
anno post calcatas uvas acto. Vilius q; uini anniculi
est: proinde q; uianū quasi uinum anni eius hoc est
hornum uinum uolub tabernæ prædicat uendendum.

VINI QUALITAS. DCCCXXIII.

D E qualitate & ætate uini dictū mox est. Vinū
potrō tenerē Græci ἀπαλιν, Cato lene uocat:
cui contrariū sit asperū, ut idem autor appel-
lat, hoc est σκληρόν siue durū, nam & muria quæ a spe-
ra esset, dura cognomina bae Columellæ Celsosq;: nisi
quis duram murā, sicut durā picem non pro aspera,
sed pro densa spissaq; accipiat, & utiq; pro garo: quā,
doquidē Celsus eam dyseriteticis cōmendat, sicut ga-
rum Dioscorides. De uino temperado, qd lymphatū
& dilutū dicitur, aliq; alia præcipiūt. Hesiodus tres par-
tes aquæ in unam uini miscet. Cæteri meracius fece-
re, hoc est, ut quinq; in duas addent: unde natum
proverbiū: ἡ πῆντα πίνω, ἢ ἕλκω, ἢ μὴ τίττω. Est aut
Plautus poëta festiuissimus significat cum de quantione Græ-
cæ loquitur in Stichō: Vide, inquit, quot cyathos hos
bibimus. Tum ille: quot digitis sunt tibi in manu. Can-
tio est Græcæ: ὅλντα πίνω, ἢ ἕλκω, ἢ μὴ τίττω. Est au-
tem sensus: ut aut duas uini partes ad quinq; laticis:
aut unam ad tres bibere oporteat: ad quatuor non
oporteat: seu futurū sit dilutius, q; sanitatis usus exi-
gat. Anacreon ut uinarius poëta unam uini duabus
aquæ temperat: aliq; aliter pro suo quiscq; ingenio. Vi-
num modice incoctū, ut Aristoteli placet, minus of-
ficie ebrietatē uitantibus. Temulentæ sunt & animā
res aliquot præter hoīem: siues, uinaceis: corui & ca-
nes, herba quæ centum Græci uocant: simia & ele-
phanti, uino. Vinū cui nomē Samagotio, qd tradidit
Aristoteles, tribus heminis & quidē lymphatis, qua-
draginta uisus inebriare dicitur. Ebrietatē Plato nūq;
nisi semel anno Liberalibus permittit in legibus. Ante
decimū & octauū portō ætatis annū uino temperā-
dum penitus existimāt, ut ne gustetur quidē. Mnesi-
theus Atheniensis medicus inebriari nunq;, sed satis
tamē diebus hilarescere permittit: quod genus cotho-
nismos à calicis nomine uocauit, ut ne dilutū nihilomi-
nus, & sine bellariore comiatu biberetur. Ac prima
quidē potio in conuiuijs quia meraca erat, cum præ-
fatione ἀγαθὸν δαίμνησθαι, in honorē uide licet Libe-
ri patris, nec tamē tota, sed quasi prægustanda præbe-
batur: postrema uero quoniam diluta esset, & salutaris,
cū præfatione τοῦς liberаторὶς χαίρειν. Vinum
aqua

aqua misceri Staphylus Sireni filius instituit: ob id
Grecum uulgo non alter uinum modo nominat,
scilicet crasin hoc est mixtum.

PASSVM, ET VINVM PROTRÖPON,
SIVE CRETICVM, SIVE

PRAMNON. DCCCXXV.

Passum hoc est *πῆλον*, genera habet laudata pſy-
chium, & à colore appellatū nigro, melampſy-
chium, quæ suum laporem, nō uini præferant: nā
in quod additū est defrutum, glyxix appellatur Athe-
næo. Sapa quā Nonius scribit uulgo dictā suo tempo-
re mellaciū, sit musto ad tertiam partem mensuræ de-
cocto. Sicut *πῆλον* siue ut Hippocrates *πῆλον*, hoc est
defrutum, ad dimidiam, & calenū ad partes è tribus
duas redactū. Passum probant Ciliciū & Africū, & in
Italia, ut quod Neapolitanū uocatur à Columella red-
ditum, prouincisq; finitimis: omniaq; hæc, ut Plinius
uerbis utar post Grecū. Fieri certum est ex uua quam
Greci siticam uocant, nos apianā q̃ apes eam impo-
pulari gaudeant. Hanc sunt qui muscatulā uulgo di-
ctam interpretentur. Item uenacula, siue ut Campa-
ni dicunt, sicula, quæ & stacula & Numisiana appel-
latur, passis & diutius in uite sole adustus uuis, staphi-
dion, ut arbitror, uocatur ab Hippocrate aut seruente
oleo. Quidā è quacūq; dulci dū precocta, q̃ siq̃tum
uis expresse, adiciant uinacis a quæ potant, se-
cundariū passum facient. Protopos accipitur etiam
pro musto, quod spōte defluit anteq; calcetur uis,
ut est apud Iulium Pollucem. Hoc proci⁹ diffusura
lagenis suis deferuere patiuntur: postea in sole qua-
draginta diebus torrent, æstatis secuta ipso canis or-
tu. Habetur & protropum inter transmarina uinum,
quod Athenæus in Lesbō nasci dulce scribit, etiam
prodromon uocatur ab aliquibus. At Pramnon, siue
Pramnion Hippocrates & prior Homerus celebra-
uit. Premebat hoc Smyrnæ regio, ut Alciphron Pra-
andrius scriptū reliquit, montano uico Latonæ pri-
us dicato, postea Latoris, nomē idē Amazonis. Extra-
batq; id etiamnum Plinio prodente iuxta delubrum
matris Deūm. Nigrū Galenus fuisse uoluit: Athenus
quoq; nō crassum aut dulce, sed durū austerumq; ob
id eo Athenienses minime delectari scribit Aristopha-
nes: hoc tamē non Smyrnæ, sed in insula primū Ica-
ro natum putat Seuius, in perra cui nomē Pramno,
sed & pharmacitū dici hoc ipsum quandoq; tradit.
Pro ueneno est sapa, si quis ieiunus à balneis bibat
eam. Polybius autor est Romanas mulieres nō uinū,
sed passum bibere solitas ad restinguendū sitim. Pas-
sum uero dictum, quia ex uuis passis, siue quas in ui-
te passī sunt aduri sole, premitur, simile Cretico & Ae-
gostheni uocatis. Plautus: Murrinā, inquit, passum,
defrutū m, mellinam. Nonius murinolum, siue muri-
nulum uocat: quā alij murrinam nisi uicium in exem-
plari sit. Varro: Mulieres, inquit, natu grandiores aut
loram, aut garum, aut defrutum, aut passum bibe-
bant, quā murrinā Plauto appellari putat. Est & mur-
rina idem, quod & myrratū uocant aliqui: non utiq; à
myrrha, sed à myro quod est odorem tuum: ut post
docebimus. Cellius: Mulieres, inquit, Romanas laure-
am, passum, murrinā potasse: laureā pro lora capiēs.
Meminit Varro & potionis genus fuisse miriclam.
Nonius duas facit loras: alteram, quæ sit deuteria: al-
teram, quæ lora constat. Lora uinū dulce, potionis,
inquit, erat confectæ, mulieribus grandæui aptum:
quod in quibusdam codicibus loram, non loram scri-

ptum inuenio, distinctionis forte gratia. Laudatur à
Græcis inter uina dulcissima scybelites, & natū in Arca-
dia Thyraū. De Cilicio uino mentionem hoc capite
habuimus: forte aut hoc sit, quod è Pisidia medicinæ
usu cōmendabatur Ambladeū cognomine ab op-
pido, ut Straboni placeat: uino aut Aegostheni, de q̃
supra diximus, nomē datum quidē uidetur ab oppi-
do Aegostene, quod in Attica terra est. Cæteris affir-
mare non ausim, quandoquidē Carystii ex Euboea
quoq; posset existimari, Carysto ibi celebrata scri-
ptoribus. È Laconia tantū uenit Carysto uilla id se-
rente, quod & Alcan poëta celebrat. Laconicum
uidetur fuisse initio: & quod monobasites dicitur: et i-
am si Creticū hoc nomine intelligimus, cotrūpente
uulgo id uocabulū, & uocante malualū, Mouer q̃
locus ubi Tænarū in Laconia mōstratur, Monoba-
sia dicitur hoc tempore, ditionis Veneræ id oppidū
est, unde in Cretā directo ferē cursu nauigatur. For-
teq; Monobasites uino datū nomē fuerit, nō q̃ ibi na-
sceretur, sed q̃ illud primū è Creta cōportaretur. Ae-
tate nostra celebratissimū est quod Achaicū uulgo q̃q;
dicitur: fortasse id quod ex Phliunte oppido quondā
Achaiz, Phlasiū ab Antiphane prædictū est: et i-
am si nunc aliubi quoq; scriitur.

VINVM GYPSATVM. DCCCXXVI.
Inum gypſatu m à gypſo dicitur, sicut à cal-
ce calcatur: aut à marmore, marmoratum.

VINVM PICATVM SIVE RES-
NATVM. DCCCXXVII.

A vino refinato dicta inquit Plinius est cra-
pula: siue quia caput tenet, quasi lucta eius:
siue q̃ ipsa q̃q; refina, & flos eius crudus, qui
uinis ad excitandā lenitatē additur, crapula q̃q; no-
minari solet. Pugnacibus inquit Plinius, multus plus
crapulæ inditur, lenibus parcius, à quo & uehemētia
uini, atq; feritas crapulæ significat uocabulo. Photio
de crapula interpretatē aliam superius explicū.

VINVM PARACHYTON. DCCCXXVIII.

Vinum parachyton, siue ut Plinius uocat, dia-
chyton: si modo idem est, sit uuis in sole sic-
catis, loco cluso per dies septē in cratibus, tot-
idem pedibus à terra alte noctibus à rore defensis,
octauo die calcatis: optimi odoris saporisq; inter dul-
cia: etenim parachyma Græci defrutū quandoq; ap-
pellant: unde uini originale, hoc est sine fūco, & si-
ne dulci aparachyton & autem uocant: q̃q; & alia si-
gnificatio aut tæ uini est, ut alibi monuimus. Tima-
chidas Rhodius uini genus passū dulce hypochyton
in Rhodo uocari tradit. Nam uinū autoceras hoc di-
citur, quod ita est exile, ut dilui non debeat, ut inquit
Pollux. Porro nostri dulcissima uina Libeti patris bella-
ria uocabant.

PHALERINVM. DCCCXXIX.

Phalernū quod Græci phalerinon uocāt, nec in
nouitate, nec in nimia uetustate corpori salu-
bre. Prima eius ætas à decimo: media à quinto-
decimo anno incipit: à uigesimo capiti & neruis est
noxium. Duo eius genera: austere, cui rufus color:
& dulce, quod tunc demū accidit, cui sub ipsam uin-
demiā austri flauerint, q̃ & nigrius efficitur. Athe-
næus & Galenus autores. Phalerno Statium simile
est, tantum leuius. Simile & Venaphranum.

ALBANVM. DCCCXXX.

Albanū quoq; duo sunt discrimina, subacerrū
& dulce. Vius æque à quinto decimo ætatis
in 3 anno,

anno. Inter Albanum Phalerumq; Labicano gloria, quod est dulce, ac pingue gustu lenitur, à decimo placere incipiente. Buxentinū Albano simile est, utiq; acerbo.

CECVBVM.

DCCCXXXI.

Cecubum iam non gignitur, frequens olim in Tarracina Fundisq; sic et Setina. Parum à superioribus Statana nō longō fuerunt intervallo: nam Signini nomē celebre alio sistendā, in sexen nium uetustate melius.

SVRENTINVM.

DCCCXXXII.

Surentinū veteres maxime probauerunt: sequēs ætas Albanū aut Phalerū: deinde alia aliq. Vitiū plus Surentino, aut Ileritatis Albano, uehementē minus Phalerno. Surentinū à xxv. anno poculū faciant: quoniā macilentū & aridū cum sit, ægē cōcocuitur, nec nisi uetustate castigatū uentibus prodest, quod & Tripholinū accidit. Simile est & Aequanum. Celebrantur à medicis & Rheginum, Surentino pinguius, eoq; celerius ad bibendū utile. Item Priuernum Rhegino tenuius, & Phormianū Priuerno simile, dumtaxat crassius. Tiburtino tenuitas redditur, idq; à decimo anno bibitur. Præstinum Tibur nō pinguius, Caurano præstantiā pauciores quoq; ipsa facit: ualidū hoc & præcrassum. Mariscum a ueterib. Austerum & Barbinū Athenæo, quod Balbinū dicitur, Balbia proueniens Plinio. E' Campania prope Cumas uluanū commendat, quinto demū anno poculentum, leue. Iam Calenū quod & Phalerno præferit ad utilitates stomachi. Fundanū plus iusto alit: ideo parcius erat conuiujs, q̄ & caput & stomachū tentabat. Sabinū leuitate præponebatur omnibus. Vium eius à septimo ad quintum decimū ætatis annū probabant. Nomentanū à quinto anno incipit: nec leue, nec admodū suauē. Spoletinum suauē, coloris aurei. Caulinum prope Capuam: fortasse id quod eoloco eradii Polybius anadendritin uocari, prælatū omnibus. Circa Neapolim Trebellicum. Herbulo color niger, non multos post annos candidus: delicatū hoc, & perq; leue. Tarentina, & quæcunq; illo tractū habetur, tenera sunt & dulcia, & amica stomacho, cuiusmodi lagaria non procul Crumento nascentia. Melisæ forū, & salute, ut Plinius retulit, insignia. Beneuenti siebat infumatis, quod Græce capnia dicitur, à Platone comico, quemadmodū & uuae fabrorū ferrorum maxime fornicibus ex Africa, præcipua Tibertij Cæsaris cura.

ADRIANVM.

DCCCXXXIII.

Adriana optima, ex intimo sinu Adriatici maris, quæ Pucina à loco ibi sito dicta sunt, & à Græcis pyctiana, medicamentis aptissima: quibus Livia Augusti cōtinuatus, quibus uixit annis, retulit acceptos, non aquosus: haud procul à Timauī fonte saxeo colle, maritimo afflatu, paucas coquente amphoras. Britanorū regi adeo gratum, ut quotannis deferendū sibi curaret. Mamertinū uero à colonis eius loci non Messenij, ut inquit Strabo, dicitur, etiam si circa Messanā in Sicilia proueniat. Hoc & Italicum quoq; dicitur, etiam si extra Italiam, ut Athenæus inquit, nascitur. Sculū est & Potulanū ab autore dictum, qua proxima est Italix Sicilia. In eadē prouincia & Taurominitanis honorlagenis, pro Mamertino plerumq; subiectis.

PRAETVCIVM.

DCCCXXXIII.

Prætucia ex supero mari, sicut & Anconē nascentia, & quæ à palma uia forte enata palmefia appellatur, ut Plinio placet. Cassiodorus: Vinū quoddā, inquit, Brutium appellauit, palmarianū laudare cupiens antiquitas. Nos si typum, asper, sed gratum suauitate: nam licet, inquit, inter uina Brutia uideatur extemū factum, tamē est bene generali opinionē præcipuē: est enim suauis pinguedine molliter crassum, uiuacitate firmum, nari uolentū, candore perspicuum, quod ita redolet ore tractatū, ut metito illi à palma uideatur nomen impositū. Viscere defecā constringit, uulnera madida desiccāt, lassum pectus reficit. Prætuciū multo præcipue conuenire dicitur, sicut Apamenū Syriæ. Inter externa Syriacum est, & quod reges Persarū bibebant Chalybonū uocatum, ut Straboni placet. Hoc Possidonius in Damasco Syriæ nasci tradit, eorundē regum cura satū.

HISTRIANVM.

DCCCXXXV.

Histriano proximū natione Liburnici fuit, ex Iliā insula qd Agatharchides præfert omnib.

CHIVM.

DCCCXXXVI.

Chium & Chiores dicitur, hoc & Thasium. E' uinis transmaria ueteribus fuisse in summa gloria. Theophrastus Thasium quod magistra tus bibebant, antepont omnibus. Tertio loco habetur Clazomenū, postq; parcius mari condere ceperunt, utiq; post Homerica Iliā, Pramnon & Maronites, siue quod idem est Maronæū in Thraciæ maritima parte genitū, uices tantū addito aquæ miscendum Homerus censuit. Vini eius ad Pliniū durasse legimus, prodentē sextarios singulos octogenis aquæ diluini grū colore & odoratū, & uetustate pinguescens. Hinc, ut arbitror, Cratinus unum ipsum appellabat Maronē: nam monarites aliud uini genus est, Cappadociæ Melitena eius parte nascent, non postferendum nostratibus præstantia. Maronæū à Marone filio Euanthis satum publicatumq; Philostratus in Heroicis suis testatur. Pramnon à uite pramna dictum uolunt: aliqui à manu ferre, quiddā à caudicis crassitudine, quasi distinguatur à crucio uocato. Est autem crucium ē nitibus altissimis, quales Lyciæ sunt acerbiusculū, & asper. Porro Thracia putatur, & Ismaricus à Polluce, Biblinum ab Homero nominatū, siue q̄ Biblina ea terra diceretur, quæ nunc Tisara & Oesyma nominatur: siue, ut Epicharmus placet, à Biblinis Thraciæ montibus uocatis. Seruius nauium id existimat quod Archilochus neclari comparatum scribit à Bimblino siue Biblo amne. Hoc in Sicilia Polū siue Polzeū appellari, quoniā à Polide Syconio siue Rhegino qui Syracusis regnauit, translatum eo sit. Quidā à uite biblia quæ in Italia dicitur dicitur. Nam Byblos per y. oppidū est in Phœnice uetustissimū, ut quod à Saturno conditū putetur, ubi unum quoq; medicamentosum ex herba fidicula con ficitur, ut diximus. Differt à Maronē Mareoticū in Aegypto, à Mana lacu dictū, ubi nascitur, ad uetustatem quoq; diffundi solitū: nam uicinū ei Lybicum appellatum, præsertimq; ad Antiphras notum, improbari uel adagio quoniā minus uini q̄ maris habeat. Alexandriæ id uulgo bibunt præcrude ac zythū, ut Strabo inquit: etiam si non zythos, sed zygonin ter pres in eo legerit, & ad pondera ut uino eo Alexandrinos in epistime conuerterit in quē errorem & Domicij Veronensis pronus corruit, in Protempi co Papiñq, quod incipit:

Si qui.

Si quibus audaces amor est seruare carinas.

Omnia porro transmarina septem in sex annis ad uelustatem mediam peruenire existimantur. Vino Chio ueteres in oculorum uitis uti solitos, nomen ipsum indicat colleriorum quorundam, quæ Græci Chiaca cognominant. Hoc uinum & Ariusia à loco: & optimum quod esset, aristum uocabant: Iulius Pollux autor, Nigrum uinum in Chio primum fuisse Theopompus autor est: nam & uitem ferere in eadē insula repertum putant ab Oenopione Liberi patris filio, qui & urbem in ea condidit.

LESBIVM. DCCCXXXVII.

Lesbium sponne naturæ suæ mare sapit. Hoc & protropum dicitur quorū dulce est, itemq; prodromon: Athenæus autor. Quærat aliquis in Vitruuio quis sit uerborum sensus, cum dicit: Sed animaduertimus insulam Lesbion uinum protirum maloniam catæce caumenen: item lydiam molliton. Corrupta lectio, quæ se restituienda est. Sed animaduertimus insulam Lesbion protropion, Mæconiam, Caræcecaumeniten: Lydiam, Tmoliten dare. De protropo dictum est superius: de Tmolite statim fiet mentione: Caræcecaumenite Strabo: Caræcecaumene, inquit, regio est, quam alij Mysiam, alij Mæconiam appellant. Dictam uero ita, q̃ nihil in ea præter uinum gignatur, idq; nobilissimū, ambusta uelut igni terra.

EPHESIUM. DCCCXXXVIII.

Ephesium destructo & mari conditur, ideo insalubre. Phygelites appellatum ab oppido propinquo, quod Phygela Plin⁹, Pygellam pleriq; nominauit. In nomine sunt & transmarina, & Leucadium, & Sapia, & Thasium: quibus principatum dat Hermippus in oppido Opunte: quod & Plautus in Pœnulo demonstrat, sumptum ab Eubulo. Item ex Eubœa Sciatho, & ē Pepartho insulis: q̃q; postremum hoc multi sunt qui damnant. Jam ē Syria Phoeniciū uocatū quandoq; Cyclium, cuius & Xenophon in Ascensu meminit. Laudatur & Magneticū, & ut alibi diximus Mendæum: præterea ex Acantho urbe: nam Cirimphium asperum contemnitur. Trœzenij, ut ait Aristoteles, Anthedonidum & Hyperianum commendat, auctor suorum nominibus Hypero & Anthes: quemadmodum & Altheptiadij ab Altheptio, qui ex Alpei nepotibus fuit. Apyrum quoq; uinum ab Alcmane poëta memoratur: est autem apyrum quodcūq; non est coctum. Laconica sunt Pentalophium à quinq; collibus, ubi nascitur, uocatū: item Denthiaidum, siue Denthis: & Oenuntium, & Onoglis, & Stathinium à locis omnia, quæ iuxta Pytan sunt oppidum eius terræ. Theophrastus Erythæum molle salsumq; idem Heracleoticū tradit odoratum atq; durum.

MESOGITES. DCCCXXXIX.

Mesogites, & Tmolium, aut quod idem est Tmolites, duo sunt uini genera, nomine à montibus Lydiæ imposito, qui Tmolus & Meslogis appellatur. Mesogites uero nobilissimum à loco Aromicum nomine, correpta secunda syllaba, ut Straboni placet. Tmolio per se gratia, ut uino, non est: sed cuius dulci admixto, reliquorum duritia suauitate accipiat simul, & ætatem. Ex eadem Lydia & Metropoli uinum commendat, ab oppido eius uno, Metropoli uocato.

VINVM IN COMMUNE. DCCCXL.

De uino in commune nonnihil & in mentione annosi diximus: nunc illud adiicio: Vinū offe in infantia dulce est, tum uidelicet, cum mustum dicitur: ubi autem pubescit, suauius efficitur q̃ dulcius: dulcedo enim seruando adimitur uinis. Vinum portū aut uetus, aut nouum est: media ætas à medicis introducta est: uulgo nescitur: unde notum prouerbiū Varroni, medium uinum prandium caninum esse: hoc est, quia nullum tale uinum habetur: ut uellus asininum Aristophani, pro eo quod nullam quā.

VINVM OMPHACITES. DCCCXLI.

Vinum omphacites, siue omphacinum uideur idem esse quod & *Βαϊόν* Græci appellauit: q̃q; marinam ei aquam largiorem misceri adiiciunt: cætero conueniunt: medicum item congruit, ut errare uideantur, qui non *Βαϊόν*, sed *Βιβόν* quasi à uita deriuatum nomen scripserit: cum Plinius à festinatione quasi uiolenter fiat, uocari prodiderit.

VINVM DEUTERIA. DCCCXLII.

Deuterias nostri loras, siue loreas, ut Cato: & secundaria, & operaria uilla nominant. Lora q̃ lota acina fiat, uocatur. Inter deuterias, & fecatum Cato appellat, fecibus uini expressum, qd à Columella fecinum dici putat, à Polluce tygephanon. Plinius: Tortiuum, inquit, nouissime expressum intelligo, quod Cato mustis tingendigratia, ut pigmentum aliquod adiciendum precipit. Græci hoc uulgo tamnam uocant, apud quos aurites uini pro deuteria sunt qui capiant: alij pro synero: alij pro nostrate, hoc est non alienigena, sed patrio, Galeno. Galenus in Hippocrate autem interpretatur quasi autoctem, hoc est anniculum, siue hornum. Quæ & Tornij uini mentio apud Hippocratem ad pulmonis præsidia. Vitiosum uinum Græci tropian, & ectropian, & oxynon dicunt. Genus uini est & quod grapiam uocant, subasperum. Nulli ex his plus q̃ annō usus. Erant & quæ spurca dicebantur uina, sed apud pontifices, hoc est quæ sacris adhiberi uetabantur: ut defrutum, & dilutum, & igni tactum: sed & mustum quoq; anteq̃ deferuere. Vinum porro malū amphus Græce dicitur à Socrate quasi dubium: ita enim uocauimus & nos auctore Plinio, fugacia. Præliganea uocantur, & quæ ad operarios, ut Cato inquit, ex missilis uvis premuntur. Circuncidanea uero, siue ut Varro circuncista uina dicimus, cum calcaris uvis scopi earum siue scopia, ut Cato, cum folliculis prælo subsiciuntur iterum, hoc est ubi desij siuere circuncisis extremis: non dissimile tortiuo, quod Græci bostrichitin, ut puto, uocant: tortium enim Columella dicit esse mustum, quod postprimum pressuram uina ceorum circunciso pede exprimitur.

VINVM ADVNAMON. DCCCXLIII.

Adynamon ratio faciendi uaria, sed omnibus ferè cognita.

VINVM NIGRVM E.

LABRVSCA. DCCCXLIII.

VINVM MELITITES. DCCCXLV.

Dici è genere est melitites, sed austerum securitiam fieri desisse Plinius existimat. Sit autē melitites id quod in Pseudulo uocat Plautus mellinam illo uersu:

Murtinam, passum, defrutum, mellinam,
in medio relinquinus.

OE N O M E L L

DCCCXLVI.

m t Oeno.

cratum, nos poscam puscam uel dicimus. Ipsi quoque Græci phuscam, ut Paulus & Aëtius, Infubres & Ligures Padani uinum fecatum siue loram, uulgo fere poscam nominant: nam acetum rosaceum oxyrhodon Græce dicitur. Acetum natura frigidum comprobatur Galenus: calidissimum Theophrastus existimauit.

O X Y M E L I. DCCCLIII.

627 **O** Xymeli à Themisone & Asclepiade medicis damnatum prædicant: acetum multum Latine dici potest: nam mixtum cum saccharo pro melle, oxyfâchar appellatur.

O X A L M E. DCCCLV.

628 **O** Xalme dicta quod ex aceto & sale fiat, quasi acetum salsum, efficaciter si sit recens acetum.

T H Y M O S A L M E. DCCCLVI.

Hymosalmæ quasi thymata falsilago dicitur.

A C E T V M S C I L L I T I C V M. DCCCLVII.

629 **A** Cetum scillicium & scillinum & scillatum quoque dicitur, & scillites Græce.

V I N V M S C I L L I T I C V M. DCCCLVIII.

V I N V M T E T H A L A S S O-

M E N O N. DCCCLIX.

631 **V**inum *θηθαλασσίον*, hoc est marina aqua factum, duo fere habet genera: bixeon de quo dictum est: alterum leuconion aut etiam leucochran, marina in album melle confusa. In alijs autem gentibus tethalassomenon, id est mari conditum uocatur, à serui furto origine accepta, sic mensuram explentis. Habetur & thalassites, uasis mufi delectis in mare, quo modo Caro præcipit, quadriennio Secundus. Rhodium Coo simile est. Phoriæneum salus Coo. Medicinas aliquot ex uino marina aqua facto legas, & ubi Dioscorides de qualitate uini loquitur. In hunc uinum quidam ex alto peti mare iubent, seruariq; ab æquinoctio uernò, aut certe nocte solstitio, aquilone flante: hauriri autem circa uindemiam: si hauriatur, decoqui.

V I N V M F A C T I T I V M I N C O M M V N E. DCCCLX.

N Vllum uinum factitium præterq; quæspecie rum uetustate fiat, plus anno durare putant: & plura ne tricenis quidem diebus. Vinum ex siliqua ceratites, hoc est siliquarum appellatur. Præstantissimum ex Syriaca. Factitium uinum Græci *σινευ τριανθῶν* appellant, quidam propomara: quæ quidem ut sua quoque sponte nascantur ex uiribus, ratio à Græcis inuenta traditur. Condebant & nitro uina: item marmore, item sulphure ac cinere, quod miremur. Veteres è uicis maxime sarmentis aut quercu.

V I N V M C I D O N I T E S. DCCCLXI.

V I N V M M E L O M E L I. DCCCLXII.

V I N V M H Y D R O M E L O N. DCCCLXIII.

632 **H** ydromelon aliud est q̃ hydromeli, ut constat: alioqui & sine melle fingitur quandoque, ut Paulus existimat. Laudabatur in Græcia quod è Cibra fictilibus pusillis austerum uinumq; solebat inueniri.

O M P H A C O M E L I. DCCCLXIII.

Omphacmeli, hoc est mel acerbum, siue acidum.

V I N V M A P I T E S, O I T E S, M E S P I L L I T E S, C E R A T I T E S. DCCCLXV.

Vinum è piro, sorbo, mespilo, siliqua & ceraunia. Differt porro apites ab eo quod apiatos etia Græce dicitur: q̃ illud è piro fit, hoc ex apio.

V I N V M O E N A N T H I N V M. DCCCLXVI.

Vinum oenanthinum quasi labruscatum conuersa: de hoc in oenanthe dictum.

V I N V M R H O I T E S. DCCCLXVII.

Rhoites & uinum dicitur & mel, quo punica mala conuidentur.

V I N V M R H O D I T E S. DCCCLXVIII.

Vinum hoc est rosaceum, siue ut Palladius, rosatum.

R H O D O M E L I. DCCCLXIX.

Rhomeli, hoc est mel rosaceum aut rosatum, à Paulo etiam rhodostacton dicitur: nam rhodomelon ex rosis & cotoneis malis conficitur.

V I N V M M Y R T I T E S. DCCCLXX.

Vinum myrtites hoc è myrtatum, Cato docuit fieri è nigra postea comperit ex alba. Genus uini Plinio est & myrtidanum ab ipso nominatum, è syluestris myrti bacis, q̃ & manus cingunt. Myrtidanum Dioscoridi frutex est, non uinum, ut diximus. Aliud genus uini est myratum, unde myrata portio: nò à myrrha, sed à myro, id est odoramentum, qd & Iulius Pollux myrinent uinum appellauit, nostri murina: q̃q̃, inquit, sunt, qui myrinem etiâ pro dulci capiunt, quod & Plinio placet ex Lælij Senilæ Capitonisq; sententia. In comœdia certe noua myrines hoc est odoratum uinum rimma dicebatur: de hoc & in lora diximus: nam myrrha conditum amarissimum sit oportet, quippe quod in cruce dño sit præbitum, non oblectameti sed cruciatu propositio: idq; nò tam myratum q̃ myrrhatum scribere oportet. Est & myrrites, p melle myrrato acceptum quandoq;.

V I N V M M Y R S I N I T E S. DCCCLXXI.

V I N V M S C H I N I N V M. DCCCLXXII.

Vinum schininum, hoc est lenificinum siue lenificatum id est. Si mastiche uero capiat, mastichites uocabitur. Vtunt in hoc cum pice diligentiores, ut inquit Plinius, nigra mastiche, quâ in Ponto similem bitumini, puenire tradit, radice iris oleoq; additis.

V I N V M T E R E B I N T H I N V M. DCCCLXXIII.

V I N V M P H O E N I C I T E S

S I V E P A L M E V M. DCCCLXXIII.

Vino palmeo Parchi & Indi utuntur, & Orientot. Phœnicites appellatur quod ex triviali palma costat: id autem quod ex abiete palma fit, spathites & elarites quoque dici potest.

V I N V M C A T O R C H I T E S A V T

S Y C I T E S. DCCCLXXV.

Vinum sycites aliqui palmiprunum siue palmipruni uocant nam eius qd sycinum appellauer, si cut & Ichacomeli & Lectipagæ, obliterata iam ratio est.

V I N V M S Y C O M O R I T E S. DCCCLXXVI.

Vinum è fico Aegyptia siue Alexandrina, item ex Cypris, cuius acetum Alexandrinum meli & sycomoriten Græci uocant.

V I N V M R H E T I N I T E S. DCCCLXXVII.

Vinum rhetinites hoc est resinatum, de quo & in pissile id est picato, dictum.

V I N V M S T R O B I L I T E S. DCCCLXXVIII.

Hoc uinum Hippocrates coniam uidetur dixisse, q̃ arbor è quâ nuces pineæ funduntur, cotios & strobilos uocetur, ut alio loco docui.

Galenus coniam pro pissile caput.

m 4 V L.

VINVM E CEDRO CYPRESSO, LAV-
RO, PICEA, IVNIPERO,
ABIETE. DCCCLXXIX.

VINVM CEDRITES. DCCCLXXX.

Vinum cedrites, a cedrino differt: q̄ cedrites ē
cedria sic: cedrinū ex assulis cedri aut fructū.

VINVM PISSITES. DCCCLXXXI.

Diximus de pissite, id est picino aut picato etiam
superius.

VINVM ABSINTHITES. DCCCLXXXII.

Vinum absinthites fit & alio modo, circa radi-
ces uitium confito, sicut elleborites.

VINVM HY SOPITES. DCCCLXXXIII.

Vinum hyfopites potest & iuxta radices satō
uinum fieri, ut absinthites.

VINVM CHAMAEDRITES. DCCCLXXXIII.

VINVM STOECHADITES. DCCCLXXXV.

ACETVM STOECHADITES. DCCCLXXXVI.

VINVM CESTRITES. DCCCLXXXVII.

VINVM TRAGORIGANITES. DCCCLXXXVIII.

VINVM BVNIONITES. DCCCLXXXIX.

VINVM DICTAMNITES. DCCCXC.

VINVM PRASIITES. DCCCXCI.

VINVM THYMISITES. DCCCXCII.

VINVM THYMBRITES. DCCCXCIII.

VINVM ORIGANITES. DCCCXCIII.

VINVM CALAMINTHITES, GLECONI-
TES, ABROTONITES. DCCCXCV.

VINVM CONYZITES. DCCCXCVI.

VINVM AROMATITES. DCCCXCVII.

Vinum aromatites, hoc est odoratū, parabilis
& simplicius Catoni ē ferta, iunco, palma.

AROMATITES ALIVD. DCCCXCVIII.

Athenæus auctor est, ut in myrtide diximus,
potionis genus ex aromatibus confectū, q̄ ue-
teres uterentur, & appellari trimma. Diximus
et de alio aromatite, quod Hippocraticum recentio-
res uocant.

VINVM NECTARITES. DCCCXCIX.

VINVM NARDITES. DCCCC.

Hic uino pipere & melle addito fiunt, quæ alijs
condita, alijs piperata appellant. Acetū quoq̄
piperatum fieri solebat.

VINVM ASARITES. DCCCCI.

VINVM EX SYLVESTRI NARDO DCCCCII.

VINVM DA VCITES. DCCCCIII.

VINVM BLELISPHACITES. DCCCCIII.

Saluatium uinū à salua dici nouimus. Saluatium
uero, quo ueterinarij utuntur, potionis genus
est. Poton Græci uocant ex hordeacea, aut triti-
cea farina & sale, à quo fortasse saluatium. Quidam
in Columella saluatium, aut salinātū legere malunt
ab eo salinare uerbum deducitur.

VINVM PANACITES. DCCCCV.

VINVM ACORITES ET GLYCERH-
TITES. DCCCCVI.

VINVM SELENITES SIVE

APIATVM. DCCCCVII.

VINVM MARATHRITES, ANETHITES,
PETROSELENITES. DCCCCVIII.

VINVM HALOSANTHITES. DCCCCVIII.

Vinum ē salis flore, halosanthiten Græci ap-
pellant.

VINVM PHTHORION. DCCCCX.

Vinum phthorion, aliqui eſtromaticon appel-
lant: ex elleboro in Thaso fit ubi & uinū con-
di perhibent, atq̄ ad soporē, atq̄ ad uigi-
lias. Cato ellebori radices in pila contundi præcipit,
circum uitem dandas. Vtile id uinū fore ad mouendā
aluum sine periculo. Theophrastus in Arcadia oppi-
do Heræa uinū tradit esse, cuius potu foeminae pariāt,
uiri mente cōmouentur. In Achaia saltu Cerynien-
si, uinū & uitrem nasci, quæ foeminis gustata faciant
abortum: in Trezene, steriles. Idem auctor uina quæ
dam scribit ethica uocari, Theodor⁹ uertit moralia:
etiam si mendose scriptū est molaria quādoq̄. La uſā
tur, q̄ celeriter purgāt se ac constitūt: qm̄ tenuia sunt,
& mixtura immunia: ob id ethica dici potuere, qua-
si castigata.

VINVM CHAMAELAITES. DCCCCXI.

VINVM CHAMAEPITYITES. DCCCCXII.

VINVM MANDRAGORITES. DCCCCXIII.

VINVM ELLEBORITES. DCCCCXIII.

De altero elleborite dictum est in phthorio.

VINVM SCAMMONITES. DCCCCXV.

De altero scammonite legitur in phthorio.

CAD MIA. DCCCCXVI.

Cadmia uocant & lapidē quendā erosum, ex q̄
fitæz, fufuris necessariū, medicinæ inutile: q̄ q̄

Galenus lapidosam cadmiā circa Solos in Cy-
pro insula nascentē, fornacariæ prælatam ætate sua
meminit, inuenturam. Possidonius q̄q̄ lapidē cad-
miam ex Cypro tantū ære fieri cōmemorat. Fit autē
cadmia de qua hic loquimur, etiā in argenti fornaci-
bus, candidior ac minus grauis, sed minime cōparā-
da ærariz. Plinius capitū in hoc est fumariz appellat
eam, quæ sit tenuissima, in ipso fornacis ore inuēta:
qua flammæ cluſtantur exusta, & nimia leuitate si-
milis fauillæ. Secundā botryitū, hoc est racemariā:
quia interior sit & cameris dependeat: cui prima di-
gnatio tribuitur, grauior priore, leuior sequentibus.
Duo huius colores, cinereus, & puniceus, qui & me-
lior. Friabilis hæc, oculorūq̄ medicamentis utilissima.
Tertium genus placitis aut placodes, & ipsa ex argu-
mēto, qm̄ sit crusta uerius q̄ pumex. Ponderosissima
hæc, & intus uaria ē lateribus fornacis: fiunt ex ea
duo genera, onychitis extra penē cetulea, intus ony-
chitz modo maculosa: ostrea citis tota nigra, & cate-
rarum durissima, unde nomen.

POMPHOLYX ET

SPODION. DCCCCXVII.

De pompholyge ac spodio communi usu hic
agitur: differentia, ut aliqui existimāt, q̄ pom-
pholyx paratur lotura: spodion siue spodos,
illota est. Quidam id quod candidum sit leuissimūq̄,
pompholygen dixere, & esse æris & cadmiæ fauillā,
& ut nomen indicat, ampullā, qualis est bullantium
aquarum. Spodion uero nigriorem ponderosiorēq̄
mixtis scintillis aliquando & carbonibus. Optimā
ē Cypro: propterea Hippocrati melancypion, quasi
atramētū Cyprū uocant, interpretant aliqui: nā Pos-
sidoni.

fidonius ē Cyprio tantum ære fieri spodion existima-
uit, ut Straboni placet. fieri q̃ liqueſcentibus cadmiā
æratio lapide liſſiſſimā. Hæc euolans ē fornacibus, &
retis ad hæreſcē, ſed fuligine diſtat candore: quod mi-
nus candidū ex ea fuerit, immaturæ fornacis argu-
mentū eſt: hoc quidā pompholygem uocant: qd̃ uero
rubicundius ex iſis inuenitur, acriorē uim habet, ex
ulcerat: adeo ut cum lauat, ſi attingat oculos, ex-
cæcet. Eſt & mellei coloris ſpodion in qua plurimum
gris inelligitur: ſed quædā nō genus lauando fit uti-
lius. Habetur & in argenti fornacibus ſpodos quā uo-
cant lauriorim, fortaſſe quā Illyriotin Hippocrates
neſcio an corrupte. Laurion certe loc⁹ erat in Attica
ubi argenti fodinæ quondā fuere, ut inquit Pauſani-
as. Veriſſima hæc oculis, quæ fiat in aurarijs. Spodiō
& ex plumbō fit eodē modo quo ex ære Cyprio mō-
ſtrauimus. Fit pompholyx & ex ſola quoq; cadmiā,
ut Galenus teſtatur. Aëtius: Inuentu, inquit, rara eſt
pompholyx, & adulterari ſolita. Laudatū uero nō
candida, ſed quæ ſubliuet, quæq; carbonibus inſper-
ſa, ſtamam ignis autem uideti faciat.

ANTISPODION. DCCCCXVII.

Antiſpodion eſt & cinis ſici caprificij, ac len-
tiſci, ē buxi quoq; coma eſt, pſeudocyperi, &
terebinthi, & ænantheſ.

AES VSTVM. DCCCCXIX.

Aes uſtum Græci *χαλκὸν πυρρόν* uocant. Cel-
ſus uero cum cinerē Cyprii uocat, aut Cypri-
um æs crematū, aut ſpodion Cypriam intel-
ligit. Aegyptus colligij modo terit in coticulis. Ful-
go æris, ſiue ut Aëtius appellat, æratioꝝ ſaborum,
ephæſtia Græce dicitur.

SCORIA AERIS. DCCCCXX.

Scoriam metalloꝝ Græci & ſcoriam, & cibdelin
uocant, ut Phorion placet.

FLOS AERIS. DCCCCXXI.

Flos æris, hoc eſt *χαλκὸν ἄνθος*, diſſert à chalcā-
tho, quod attramentum eſt ſutorij. Diſſert & à
ſquama, quæ ui atq; icibus, clauis & panibus
æreis excutitur: ſlos uero ex iſdem cadit ſponte. Fit
autē in ætarijs officinis, iam ſuſo ære atq; percoctō,
additis etiamnum carbonibus, paulatim q̃ accenſis:
Tum repente uehemētiori ſtatu expuitur æris pala-
quædā, (ut Plinij uerbis utar) quod pſegma ſtoremq;
uocat. Eſt autē pala proprie, ut inquit Strabo, pur-
gationis auri gleba ſenſibilis, à quo tranſlatū id no-
men eſt & ad alia. Plinius alio loco palacas in Hiſpa-
nia dici maſſas auri ſcribit, in puteis repertas decul-
ſis pondere, quas & palacranas uocant: ſicut minutū
quod eſt, balancem. Democritij chymiſtæ Aphrodi-
tes ſperma, hoc eſt Veneris ſemen: nam & ipſum æs
nō alio q̃ Veneris uocabulo pronuntiat. Iſde aſcion
chalcon pro æris flore accipiunt, hoc eſt, quaſi ex um-
bratum æs interpretet. Sunt qui florē diuerſum intel-
ligant à pſegmate, ſed ratio ſaciendū eadē. In utroq;
ſolum quo pſegma excipitur, ſtratū eſſe iubent.

SQAMA AERIS. DCCCCXXII.

Squama, hoc eſt *ἀνθραξ*, etiam ē ferro in uſu eſt, ex
acie aut mucronibus maxime ſimili, ſed acriorē
ui q̃ rubigō. Cypris clauos, de quibus hic ha-
betur mētio, Palladius Cuprinos clauos, & Cuprinū
æſ, pro Cyprio ære appellat. Aeris, inquit Celſus, due
ſpecies ſunt: alia tantū ætis, alia rubri æris. Veteres
ipſum æs rōde impolitiq; dicebant raudū ſiue rodū,
unde porta Romæ q̃ ærata eſſet, raudera, & raudu-

ſcula ſiue rauduſcula uocaretur. Quid ſi pomi ge-
nus inter citrea, quod tantum uulgo dicitur, ab æris
colore quaſi raudum uocariſ: hoc eſt ſuluum. Eſt em̃
ſuluum æs, ut inquit Ennius: q̃q̃ & Neratio fortaſ-
ſis iuuatore Neratū dici potuit: niſi quis non ranti-
um, ſed Aranium quæ Ariani, id eſt, Perſicum, à gen-
te uelut appellatū. Eſt enim Ana ut inquit Hellanicus,
& ſireſte me mini, etiam Herodotus & Plinius, & cæ-
teri, Perſica quædā regio. Quod item ſi malū Aranti-
um ab Arantia oppido Achæiæ dictū conſiciat, quod
& pomis ſettele ſcribunt fuiſſe: à quo effectu peſteri
phliunta non nauere, ut inquit Stephanus. Proinde
Lacedæmoniē menſem in quo terra fructibus abun-
dat, phliaſion appellant. Accedit quod Herculeum ma-
la Hæſperidū Arantiam primū tuſiſſe credunt, autore
Pauſania. Sed uero or ne quis me aliā inuidiæ obno-
xium, etiam nimio iuuadiſſe rem Latinam ſtudio, la-
pſum prædicet.

SQVAMA ALTERA HOC EST STOMOMA. DCCCCXXIII.

Stomoma genus eſt ſquamæ ſubtiliſſis, ex ſum-
ma uidelicet lanugine decuſſam.

AER VGO RASILIS. DCCCCXXIII.

Aerugo rasilis quā Græci uocant *ion xylton*,
minus probatur ē ſquamæ. Ocyſſime cōtra-
hit æruginē coronariū æs. Aeruginem maxi-
me Rhodiā adulterant marmore: deprehēditur p̃a
pyro galla prius macerato: niſcigit em̃ ſtatim æru-
gine illita. Deprehenditur & uibu, maligne uirēſ. Ae-
rugo æris à Columella eſt ubi ænea rubigo dicta ſit
à Vitruuio eruca nominatur, eadē quæ rasilis à ſpe-
cie uermiculi eius, ut conſido, qualis Rhodo ſinge-
batur: ob id & genus alteræ æruginis, ut mox lique-
bit, ſcolex appellabatur: nam & morbus quidā arbo-
rum nunc rubigo, ut Plinius, nunc ærugo a Rhodij
eſt, ut Hieronymus, quæ Græci *eryſiben*, Apphellere-
thiben uocant, à colore, ut nos rubiginē: à quo & ro-
bur dictum ſit, quia plurimas huius coloris quaſi ue-
naſ habent.

AER VGO SCOLECIA. DCCCCXXV.

Scolecia ærugo ſit & per ſe raſa, ex æratio lapi-
de quæ chalcitū uocant. Nominatur autē ſcolec-
cia ſiue ſcolex, uel quia ſe contrahat in uermicu-
loſ ſponte, uel quia ſingatur in eos arte. Ariſtoteles:
In Cypro, inquit, inſula ærarijſ fornacibus, ubi chal-
cites lapidibus pluribus diebus uritur, uermiculi medio
igne quadrupes & penati naſcuntur, paulō muſ-
cis grandibus maiores, qui per ignem ambulēt &
ſaliant, quandiu ibi ſunt, uiuentes: cum euafere lon-
gius paulō, moriuntur: pyralides ſiue pyrtoti nomi-
nantur: uel, ut in quibuſdā Plinianis codicibus, py-
rauſtæ.

AER VGO AVRIFICVM. DCCCCXXVI.

Aerugo aurificum, hoc eſt ſanterna, quæ à Greg-
cis *ios chryſochoon* & chryſocolia dicitur,
gluten eſt & ſerrumen auri eius, quod argen-
toſum uocant: ſignum q̃ eſt, ſi addita ea niſceſcit. E di-
uerſo æroſum contrahit ſe, hebetatur q̃ & difficile an-
neſcitur. Fit autem id glutinum præter ea quæ à Dio-
ſcoride ſcribuntur, etiam auro & ſpuma argenti ad-
ditis, una q̃ contritis. Vt uim ueto ſanterna hæc, an al-
teriſ genibus intelligatur à Theophaſto chytos argy-
ros, hoc eſt argentum ſuſile, quum dicat, & mortario
& piſtillo æris terendo conſici & aceto, nondum li-
quet

quet. In lanterna certe sola, quod quidē scīz, mortariū & pistillū ex are Cyprio deliderāt: sed cum urina im pueris, nō aceto, inuenio & argentū meritum, hoc est pseudargyron uocari, quod ex lapide quodam usto fiat Anderis in Troade: itemq; in Lydia prope Tmolū huc as addendo mixtura, puenit, orichalcū à quibūdā appellata, ut Straboni placet. Ceterū chrysocolia dicitur & panificij quoddā genus, ut in tritico docuimus. Sannā foras se dictā putem, quasi xanthemam: quippe cū legamus æruginem hanc à Græcis quandoq; dici xanthēsin, à colore flauo, qualis aureus est: ob id & latex diuinus ille tingendo auro chymistis tantopere quæsitus, plerūq; ioxystos, & ærugo nominatur.

ÆRUGO YSTA. DCCCCXXVII.

ÆRUGO FERRI. DCCCCXXVIII.

AErugo ferri, hoc est rubigo, deraditur humido ferro, clausis ueteribus. Hac Telephū Achil-
les sanasse proditur: q̄q; id quidam ex ærea cuspidē factum interpretantur.

FERRVM. DCCCCXXIX.

Ferrum Græce *Αἰσῆρα* appellatur, candens hoc nō si ducetur ignibus, corrumpitur. Rubens inhabile est tundendo, neq; ante q̄ albescere incipiat, aceto & alumine illitum fit arī simile. A rubigine uindicatur cerusa, & gypso, & pice liquida. Hæc est temperatura à Græcis antipathia dicta. Ferunt quidam & religione quadam id fieri.

SCORIA FERRI. DCCCCXXX.

PLUMBVM ELVTVM. DCCCCXXXI.

PLUMBVM SYNCERYM. DCCCCXXXII.

Plumbi halitus combusti canes occysime interficit, sicut omniū metallorū muscas, & culices: q̄ obrem nō sunt ea tædia in metallis. Plumbum crematū, cui cerusa fit admixta pari portione, aut hordeū, spodio Cyprio à medicis præfertur. Retortū plumbū est quādo uocetur à chymistis *Λευκόν*. Laminis plumbi ad lumbos renūq; partes adalligatis, formia Veneris inhiberi prædicant: quod & Caluus orator, & Franciscus Barbarus auus meus fecere. Athletas Galenus eo remedio uti solitos affirmat. Plumbū Græci molibdon uocant. Multū æris in plumbō esse argumentū est, quod in statuis aspicitur: plumbum enim quod pedes earum lapidibus ferruminat & annectit, ita plerūq; intumescit, ut ex his lapidib; crystalli modo pendeant uerrucæ. Multa plumbi genera cōnumerant chymistæ Græci. Marinū sordet, & asperū est: Sabyæsum & Dalmatense nitet, ac molle dicitur. In Sardinia teneritas & ærofitas aspicitur.

SCORIA PLUMBI. DCCCCXXXIII.

LAPIS PLUMBARIVS. DCCCCXXXIII.

Lapis plumbarius, hoc est molibdoideus, differt à molibdena hoc est plumbagine, ut statim constabit.

STIMMI. DCCCCXXXV.

Stimmī, nos stibū, & stibi dicimus, in argenti metallis inuenitur, spumæ lapidis candidæ nitentisq;, non tamen translucentis. Aliqui alabastrū uocant: alabandū, & alabandici Aërius. Duo eius genera: mas horridior scabriorq;, & minus ponderosus, minusq; radians: arenosior foemina, quā magis probant: nitet friabilis scissusq;, nō globis desinens. Platyophthalmon uocatur, quia dilatat oculos. Gyngeon quia mulieribus obseruat cilia tingentibus, semiorbeisq; pingentibus: unde scitum illud, *Γαμο-*

triam exerceat foeminas in cilio, præsertim in Hipsania. Hippocrates certe stibū significat, ut Galenus placet, aut crustas in eo inuentas, quociens tetragonū in medicina nominat. Democritus stibū nisi locis distinct, Italicum, & Chalcidionum prodendo. Quidā non adipe utuntur coquentes, sed simo bubulo. Habetur & stimmi cognomento regis Alexandri, sed cōpositio medicamenti ea est ad oculos rhyadas, hoc est qui delachrymationem arcere non possunt, quin per maxillas defluat.

MOLIBDÆNA. DCCCCXXXVI.

Molibdena hoc est plumbago, quā & Galenus nam uocamus, cōmunis est plumbi & argenti uena. Cōmendantur friabiles, & modice ponderosæ: quæ sint fossiles, metallicas appellant. Laudatissimæ quæ in Zephyrio fiant. Sunt q̄ molibdenam inter spumas argēti collocent. Fossilis molibdena est, & ad uicem ergasteriam uocatur, inter Cyzicum & Pergamū octo & quinquaginta milibus à Pergamo distantē. Nominatur & molibdena id est plumbago herba Plinio, contra serpentes, etiā in aruo, folio lapathi, crassa radice, hispida: quæ com manducata, si oculis subinde religetur, plumbum, quod est genus uitæ, ex oculis tollit.

SCORIA ARGENTI. DCCCCXXXVII.

SPUMA ARGENTI. DCCCCXXXVIII.

Spuma argenti hoc est lithargyros, distat à scoria, quā à sece spuma. Lithargyros purgantis se materię uitium est: scoria purgare. Spuma spumæ huius genera nostri habent: chrysitin, quæ fit ex ipsa uena, & est optima: secundā argyritin, ex argenti: tertiam molibditin, plumbi ipsius tursura quæ fit Putreolis: & plerūq; omnes hi colores in eisdem tubulis inueniuntur. Quidā duo genera eius nouere, quæ uocant scitelythida, & pumeinen: tertium molibdenam, de qua diximus. Omnis autem spuma fit ex cocta sua materia, ex superiore catino deflens in inferiore: eo, sublata uerruculis ferreis in ipsa flamma, cōuoluitur uerruculo, ut sit modici ponderis. Est autem, ut ex ipso nomine intelligi potest, feruescens & futuræ materię spuma. Differt argyrolithos à lithargyro, ut in lapide selenite diximus.

CERYSSA. DCCCCXXXIX.

Cerussa hoc est psymmithion, colos est & cædis, fuit & terra per se in Theodori fundo Smyræ ad nauium picturas ueteribus: de qua tamen in terra Melina differendū nobis est: nunc omnia cerussa ex plumbo & aceto fit. Sandyx uero excerussa, si torreatur æqua portione, rubrica admixta: q̄q; Vergilius herbam uidetur intellexisse uersu illo: Sponte sua sandyx pascens uestit agnos, si Plinio & Seruio grammatico credamus, qui herbæ dicit esse sandycem, ex qua sandycinus color fiat. Quidam pro colore ipso acceptam à poetâ sandycē existimant. Pretium sandycis in libras asses bini & semis, hoc est dimidium eius, quod sandarachæ. Paulus sandycem, & syrcen & sericon uocari scribit: syrcen Aërius & Plinius: hinc hodieq; Mauritanii sarcon eam nominant. Syricum, inquit Plinius, sacitius est colos ex Sinopide ac sandyce mixtis, quo minimum sublinatur adulteraturq;: nam syricum aliud genus est, ut in ceruleo nominauimus.

CHRYSOCOLLA. DCCCCXL.

Chrysocolia humor est in puteorum trochibus, per uenam auri canaliculis deflens, crasso.

erassescere limo rigoribus hibernis usque in duriciam pumicis. Laudatorem eandem in ætarijs metallis, & proximā in argētarijs fieri competū est. Inuenitur & in plumbarijs, utilior etiam auraria. Macedonicā Democritus æris similē ærugini describit. In omnibus autē ijs metallis fit & cura multū infra naturalem illā, immixtus in uenā aquis leuiter hyeme tota usque in Iunij mensē, dein siccatis Iunio & Iulio, ut plane intelligatur nihil aliud chryfocolle quā uena putris. Nariūque duriciam maxime distinguī: uua uocant: & tamē illa quā herba quam luteā appellant, tingitur. Natiua est quæ lino lanæ uel ad succū bibendū cūditur in pila, dein tenui cribro cernitur, postea molitur. Demū tenuius sic cribrafi, quicquid nō transiit at, repetitur in pila, & iterum molitur, pulvis semper in catinos digeritur ex aceto macerandus, ut omnis duricia soluitur, ac rursus rudiē: dein lauitur in conchis siccatis. Tum tingitur alumine fissili, & herba supra dicta, pingiturque ante quā pingat, nisi rapiat colorē. Addunt & scytanū, & turbitū: ita uocatur medica menta sorbere cogētia. Cum cinere pictores tureō bicin uocāt, medici acellin, quæ nō sit tinctio. Duo etiā genera, pictoribus luteæ quæ seruat in lomenta, & liquidæ globulis sudore resolutis. Vtrūque in Cypro fit. Alij tribus eam generibus distinguunt: asperam, quæ taxatur in libras septe: mediā, quæ denarijs quintis: attritam, quā & herbacæ uocant, quæ tredecim. Luteā porro dictā putāt ab herba cognomine, à qua etiam adluterat: etenim cœruleo uiridi uel subtiliam, & pro chryfocolle inducit uilissimū generis fallacissimūq. Creta æstimat & festertis in libras. Nouitius est & annularius, sed candidus, quo muliebres picturæ illuminantur ex creta, & ipse admixtis uitreis gemmis ex uulgi annulis, unde & nomē. Chryfocolle in Hispania copiosissimā haberi narrat. Sublinunt autē arenosam priusq. inducā atramētō, & paratonio. Hæc sunt tenacia & colore blanda. Paretonij quā est naru pinguiusmodi, & propter leuorē tenacissimum, atramento inspergitur, ne paratonij cādor pallorē chryfocolle afferat. Strauit chryfocolle inspectaculis circi arenam princeps Nero.

ARMENIUM.

DCCCCXLI.

667

Armenij siue lapis Armenius & Armeniacus, inter colores floridos uocatos, deponit. Sunt autē colores floridi, quos dñs fingēti præstat: miniū, cinnabaris, chryfocolle, Indiciū, purpurissum. Ideo cū q. pretiosū sit, legibus excipitur, ut à dño nō à redēptore representetur. Cæteri austeri nominantur. Armenia hunc mittit. Lapis est chryfocolle modo infectus, optimūq. est qd maxime uisret, cōmunicato colore cū cœruleo in libras tricenis quondam nummis: nunc inuenta per Hispaniā arena, quæ similem curā recipiat: ad denarios senos utilitas redijt. Distat à cœruleo cādore modico, q. tenetior Armenio colore efficit. Differt sine dubio ab Armenio ea gleba quā bolon Armeniā uocant, dicendā inter cretas.

CŒRULEUM.

DCCCCXLII.

Cœruleū siue lapis cœruleus, hoc est cyaneus, à Theophrasto Galenōq. cyanos masculino & foeminino genere pronuntiā. In argenti & auris metallis fit, sicut & silis: de quo prius, ut agatur, cōmodius est. Color sili ut ochræ luteus: qui tamē cremato silis marmoroso acetoq. restincto, abie in purpureū, qd nos expertissimus, & testatur Vitruuius atq. Plinius, Optimū sil quod Atticū uocatur, Pretiū in

pondo libræ xxij. proximū marmorosum quo tantū utuntur ad abacos: quū marmor in eo resistit amaritudini calcis. Hoc subdimidio Attici pretio est. Tertij genus est pressum, qd alijs Scyricum uocāt, ex insula Scyro, iam quidē & ex Achaia, quo utuntur ad picturæ umbras, cuius pretium festertij bini uel octoni. At quod uocatur lucidum uenit ē Gallia, pretio Scyrici dupondij detractis, quo & Attico utuntur ad luminaria. Effoditur & ad uigessimū ab ure lapidē in montibus: quod quidē crematum adulerij est pressi. Deprenditur amaritudine, & quoniam resolutū est in puluerem. At cœruleum nō limus, sed lapis & arena est. Huius genera tria ueteribus fuerunt, Aegyptiū, quod ad syncera meracāq. lomenta maxime probatur: Scythiū ad dilutiora: etenim hoc dilui facile, cumq. teritur, in quatuor colores mutatur, candidiorē, nigriorem, crassiorē, tenuiorē: qd hoc cœruleo in commune Theophrastus, nō Scythico solū tribuit. Tertium quod & præferebatur Scythico Cyprij. Adulteratur autē Aegyptiū, ut idem Theophrastus ait, quodam genere, idē in gloria regis Aegyptij ascribitur, q. primus tinxit. Alio loco Plinius hæc tria cœrulei siue cyanei fastigia Aegyptij, Scythici & Cyprij, inter gemmas nescio quā recte collocauit, ut in castigatione Pliniana indica uimus. Etenim scire oportet, cyanon etiam gemmā esse proximā & germanā iaspidi. Ea uero de qua hic agitur, metallicam & arrosam esse. Ea res peperit errorē scribentibus, ut utrumq. genus pro uno ceu obliuī confunderent. Accessit his Puteolanū & Hispaniense, harena similiter ibi coepa confici. Vitruuius cœruleum ait fieri harena cum nitri flore in farinā contrita, & gris Cyprij scobe admixta factis orbiculis: qui siccati urceo sicili conduntur. In fornace ut confudent, argita cœrulei colorē præferunt. Tingitur autē omne cœruleū, & in sua coqueatur herba, bibitq. succū. Reliqua curatio eadē quæ chryfocolle. Ex cœruleo fit quod uocatur lomentū. Perficitur id lauando terendo uel: hoc est cœruleo candidius. Pretia eius xxij. in libras: cœrulei xviij. Vfus in Creta calcis impatiens. Nouissime superuenit Nestorianum, ab autore Puteolis id curante. Fit ex Aegyptij leuissimā parte: pretium xl. in libras. Idem & Puteolani usus, præterq. ad fenestras. Vocant cyllon. Est & subtilissimū genus lomentū quinis assibus taxatū, quod Atticum uocant, hoc est, ut puto, λευκωτε: qd lomentum ipsum à Theophrasto λευκωτε dici uideo. Cœrulei synceri experimentū in carbone ut flagret. Hæc datur uiola arida decocta in aqua, succoq. per lintum expresso in Cretam Eretrian. Sile primi infitatur re pingere Polygnotus & Mycon, Attico dumtaxat. Hoc fecuta ætas ad luminaria est usa: ad umbras autem Scythico & Lydio. Lydiū Sardis emebatur: quod nūc ut ait Plinius obmutuit. Difficillime teritur silis: ab hoc ut arbitrantur aliqui silatum unū, quod & sil uocatur & silaceus color. Sil & Aufonius poeta nominat, Latialis an peregrina fit uox, addubitan. De uino fil Cornelius mentionē habet. Silatum porro & ientaculum & prandicū dicebant: quoniam ientaculi & ante prandij uinum bibere meracum moris esset: autor Festus: ob id Græci dianestimon & acratima id appellabant. Sunt qui à festo quod tordylon & sile dicitur, silatum unum deriuant: sed autorem nec si uolum habent. Erat autem ientaculum, ut Athenæus tradit, buccæ ex uino: quod genus barbari à uino & pane uippam uocant.

INDI.

INDICVM.

DCCCCXLIII.

Indicum ceruleo proximum est, ex India nō pri-
dem, ut Plinius inquit, apportari ceptum: cuius
pretium in libras xvij. alibi denarios viginti red-
ditur: inexplorata sibi hoc inuentionis fuisse tradēs,
& inter cerulei genera constitutis. Ratio in pictura
ad incursas, hoc est umbras diuidentias ab lumine.
Quod ex India, inquit, uehitur, harundinū spuma ē,
adhærescente limo, cum retitur, nigrum: at in dilu-
en do mixturam purpuræ, ceruleiq; mirabilem presen-
tat. Alteram spuma est purpuræ. Adulteratur uero In-
dicum stercore columbina, uel cretam Selinusiam
uel anulariam uitro insipientes, ut Vitruuius ac Plini-
us testantur. Probatur carbone: reddit enim synceris
flammam excellentis purpuræ, & dum fumat, sapit
mare: ob id quidam ex scopulis id colligi putant.

OCHRA.

DCCCCXLIIII.

Ochram Iuba tradit in insula rubri maris To-
pazono gigni: sed inde nō peruehitur ad nos,
inquit Plinius. Ochram si quis interpretari cu-
piat, luteam aptissime conuerterit: nisi lutea ut herbe
& chrysocollæ genus esset. Exoleuit, inquit, Attica
ochra, Vitruuius. Inueniebatur autem tum multis lo-
cis etiam in Italia.

CINNABARI.

DCCCCXLV.

Cinnabari ueteres usi sunt ad monochromata,
hoc est ad ea quæ coloribus singulis pingebā-
tur. Adulteratur sorbis tritis, aut caprino san-
guine. Pretium syncere nummi quinqueaginta. Est au-
tem cinnabari siue cinnabaris uera fanies draconis
elisi elephantorū in pugna commorientium ponde-
re, permixto utriusq; animalis cruore. Neq; alius est
color qui in picturis proprie sanguinem referre pos-
sit. Pinxerunt & Ephesio minio, ubi primū id repertū
est, auctore Theophrasto ac Vitruui. Vtrumq; omni-
sum est inquit Plinius, quia nimis acre existimabatur
tum quia curatio magni operis erat, ideoq; trāsire
ad rubricam & Sinopiden. Minium sane inter pigmē-
ta magnæ autoritatis fuit: quando & Iouis ipsius si-
mulacri faciem festis diebus miniandam censores lo-
cabant. Triumphantium quoq; corpora minio lini
folia leguntur: ideo & in unguenta triumphalis cœ-
næ addebatur. In Aethiopia & totos tingi proceres,
& deos hoc colore moris fuit. Inuentū Theophrast⁹
tradit hanc multo an se à Callia Atheniense, initio sperā-
te aurum posse excoqui harenā rubente in metallis
argenti. R. eperiebatur tamen, inquit, iam tum in Hi-
beria, (malo enim ita q̃ in Hispania conuerrere, ut in
castigatione Pliniana diximus) sed durum & hare-
nosum item apud Colchos in rupe inaccessa, decu-
tiendum sagittis: sed id esse adulter, optimum autē
supra Ephesum. Clibianis agris liba minium scripsit
nasci, & in Carmania & Aethiopia. Harenam illam
Ephesi quam diximus, cocci colorem habuisse præ-
dicat. Hanc teri solitam, dein lauari: & quod subsidat,
iterum lauari. Differentiam artis esse, qua alij minii
faciunt prima lotura, apud alios dilutus id esse: pro-
pterea q̃ phrygia dici: sequentes autem loturæ opti-
mum. Minij uenæ Romæ ex Hispania signatæ perfe-
rebantur, ad dena milia fere pondo annua: Romæq;
lauabatur, statuto lege pretio, septuaginta in libras,
officinis eius inter ædem Floræ & Quirini posita:
atq; hoc uerum erat minii: quod uero Dioscor⁹ ideo
commemorat adulterum ac deterius. Namq; est
alacrum genus in omnibus fere argentarijs & plum-

barijs metallis, quod sit exusto lapide uenis permix-
to: non ex illo cuius u omicam liquoris æterni argenti
tum uitrum nominat, sed alij similis repertis, qui ste-
riles etiam sunt plumbi, nedum argenti. Tales crema-
ti tunduntur in farinam, & hoc est secundariū minii,
per q̃ paucis notum, multū infra naturale illud fabu-
lum: hoc ergo adulteratur minium in officinis, unde
prædicocti etiam in syrco. Sublimi autem syrco mi-
nium compendij ratio monstrauit, & alio modo fur-
tis oportunitas erat, pictoris plenus subinde peni-
cillos abluentibus: Sedit enim in aqua minium con-
statq; furantibus. Syncero cocci nitor: secundarij au-
tem splendor in parietibus sentire debet imaginem:
q̃q; hoc rubigo quædam metalli est. Sifaponensibus
autem miniarijs in Betica, unde ad nos nec aliud fere
inuehebatur, suæ uenæ. Harena excoquitur, sine argē-
toq; ex contrā quam alijs regionibus: idq; celeritū
auri modo probatur ferro, & melius auro candēte.
Fucatum quod est, nigrescit: syncerum retinet mini
accum colorē. Inuenio & calce adulterari. Solis atq;
lunæ contactus inimicus. Vindicatur ab hac iniuria,
si parietis siccato cera Punica cum oleo liquefacta
condens setis inducatur, iterumq; ad motis gallæ car-
bonibus, aduratur ad carbonem usq; postea can-
delis subigatur, ac deinde liuteis puris, quo modo & si-
gna nuda marmore a nitefcunt, quæ loracatio Græce
appellatur consilias: aut Vitruuius. Minium in uo-
luminum quoq; scriptura usurpatur, clarioresq; literas
uel in auro uel in marmore, etiam in sepulchris
facit. Inter uenena esse minium nemo dubitat.

HYDRARGYROS.

DCCCCXLVI.

Hydargyros siue hydrargyron, ex minio sit
tantum secundario. Apolpermatissimum dra-
conis non desunt qui uocent in arte chymica
hydrargyrum, ut feli draconis hydargyrum quod ē
stanno fit: & quod ex auro, discum solia. Fit & ex mar-
more, ut Vitruuius refert, argentumq; id uitrum no-
minat. Sudor calici deterfus in confectura hydargy-
ri liquorem aquæ habet, argenteo colore, unde nomē
hydrargyro. Idem guttis facile diuiditur, & lubrico
humore confluit. Hydargyro quemadmodū & ar-
gento uiuo, argentum inauratur solum nunc prope:
cum & in æra simili modo aurum duci legitimū quō-
dam fuerit. Sed alia ratio inuenta est ē uiliori mate-
ria, ut paulo post dicemus. Quæ autem hic de noxa
hydrargyri à Dioscoride scribuntur, Plinius argento
uiuō tribuit. Credo hydrargyri gen⁹ haberi duplex:
facilitium quod proprie hydrargyron dicitur: & me-
tallicum, cui sit argenti uiui nuncupatio dicata. Est
autem argentum uiuum argenti liquoris uomicæ,
qui in lapide in uenis argenti reperit, inuenitur: qui
& ipse in argentum excoquitur, & achrosyalon pri-
uatim uocatur à chymistis: q̃q; pro seichteris lapide
aphrosyalos alij accipit. Venenū rebus omni-
bus est argentū uiuum. Omnia ei innatant præter au-
rum: id uinum ad se trahit mere: ideo & optime pur-
gat, cæteras eiusordes expuens, crebro laciatu ficti-
libus in uasis: ita uictis eius abiectis, ut & ipsum ab au-
ro discedat, in pelles suba ctas effunditur, perq; eas tu-
doris uice defluens, purum telinquit aurum. Ergo &
hoc cum æra inauratur, substitū bracteis pertinet ad-
simile retinet, uerum pallore detegit simplice s earum
aut prætenues: quæ propter id furtum quærentes, a-
oui liquore candido usum eum adulterat, mox & hy-
drargyro. Inaurandū uero æs cruciatur ignibus accē-
sumq;

669

lumq; restingitur sale, aceto, alumine: postea exare natur: an satis recoctū sit, splendore dependente: ite rumq; exhalatur igni ut edomitū mixtis pumice, alumine, argento uiuū indutas bractes accipiat. Argenti uiuū nō large inueniri solitū affirmant. Cādidum id & fugaci corpore, nec usq; consistens: omne tamen corpus fusile recipiens atq; in se contrahens. Qui metallicas species adulterant, & chymistę a fundendo appellantur, siue a succis quos herbarę maxime conquirunt, immutat rebus nomina: siue ut alijs maligne occultent, in quibus ipsi hallucinantur: siue ut pręstigias suas, uel ut quędam mysteria, uenerabiliores faciant. Argentū uiuū Hermę, hoc est Mercurium appellant, sed aliter q̃ Gręci: Aurum solem, argentum lunam, & alia ferē ad hunc modū omnia. Multos huc auaritia sola compulsi frustra, nondum inuento, qui non oleū & impensam perdidit, ut de rjsiure dici possit, quod Demetrius Phalereus in eos cauillatus est, qui aurum per cauernas scrutantur, et in eam spem patrimonii sua conferunt & absunt: *ἄνθρωποι, οὐκ ἔλαβον, ἀλλ' ἐπὶ τῶν ἀντρίων, hoc est quę capere debuerant, non ceperunt: quę possidebant, amisserunt, ut Athenęus, & ante ipsum Strabo meminit.* Argentum eos uiuū pręcipue torquet, indignantes tam proximā argenti probi spem elabi manibus, nec spillari aut in inheri motum eius ullo ferē modo posse. Argentū quidem iam tingitur tam simili colore auri, ut nec marculo, nec cotica, nec ponderē, nec alio q̃ lateris & igni argumento deprehēdatur: quę probatio cōmenticia & cupellaria uocari solet, quoniā cōmentum illud, hoc est laterculus in cupa uratur. Malum hoc iam late patet: nec auaritia folii aut luxuria censenda, sed puerilis quędā uanitas & ostentatio diuitiarū ludica, totis abacis ex hoc adulterio uel principū epulas ornantibus. Hinc passim moneta falsā cuditur pręsertim Venetę: maiore furto, quia nullū sit aurum uel argentū Venetę syncerus. Pręsertim omnibus nummis oborto Venetus. Huic crimini decemuralis potestas nō aliter q̃ aut lesę maiestatis, aut uiolatę religionis obiecta est. Nihil ferē tamen aut graues poenę fontibus constituta, aut immensa pręmia deferentibus propoita iuuere. Non erat prius cautū, ne cui liceret metallicę cruciare. Monetarios tantū leges oderant, chymistas esse patiebatur. Hoc ipso anno quo hęc prodigia, chymistas quoq; ipsos capitales fecere: simul ut occasione sceleris adimeret, simul ne quis ætatem suā tereret in follibus, & ustrinis, & capūculis furilibus: quę iam conuicio desidia choridiola, siue scoridiola Gręce nominantur.

RVBRICA SINOPIS. DCCCCXLVII.

Rubrica Sinopsis quam Celsus minium Sinopium appellat, inuenta primū in Ponto dicit. Nasctur rubrica & in Aegypto, & Balarib⁹, & Africa: sed optima in Lemno & Cappadocia, ut in mentionibus duabus proximis indicabitur. Species Sinopidis aut Sinopicę res: rubra, & minus rubens, & inter has media, quę pręsertim omnibus: quia minus adulteretur, ob id & autarcen uocant Theophrastus eam prodidit. Pretiū optimę in libras xii. denarij, eam ad penicillū, ut signū colorare libeat: quę plus rubet, utilior est abacis. Idem pretium eius, quę pressior uocatur, & est maxime fusca. Vfus eius ad bāses abacorum. In medicina quoq; blandus emplastris & malagmatis quę dicuntur phazę. Troianis

etiam temporibus rubrica, hoc est milto in honore fuit Homero teste, qui naues *μυλτοπαρῖνος* commendandi gratia uocatur, alioqui rarus in picturis. Rubrica & in ferrarijs metallis nascitur picturis apta. Fit & ex ochra, ut dice mus. Quid sit apud Columellam in apum curalutū Punicū, nisi fit rubrica, non satis uideo. Legitur sanē rubricā ex Africa uenire quā circulum uocabant, cuius pretiū octonī asses. Legit & lutum Venetū, abluendis maculis quæsitū, de quo & Martialis poetā meminit: nisi quis hanc intelligat, quā dixi pressiorē uocari & maxime fuscam esse.

RVBRICA FABRILIS. DCCCCXLVIII.

Rubrica fabrilis, hoc est milto tectonice, utilissima fabris est, quę in Aegypto nascitur & Africana: quoniā maxime forbetur. Hęc & in Lemno fit, diuerso genere ab eā quę sphragis appellatur: sicut & qua linearij fullonesq; utuntur, in lauando extergendoq; uiribus præcipua. Galenus autem Ochra excoquitur in rubricam, ollis nouis luto circumlitis. Cōmentus hoc esse dicitur Cydus quidam, incensis casu officinis: quod magis arsit in caminis, hoc melior, quia nigrior & carboni similis efficitur. Vt cunq; talis rubrica deterior q̃ natia semper, ut Theophrastus inquit.

RVBRICA LEMNIA. DCCCCXLIX.

Rubrica siue terra Lemnia, quā Celsus minij glebam uocat. Palmam huic dedere minio proximam. Hęc est antiquis multū celebrata, cū insula sua in qua nascitur. Hac minium sublinunt adulterantq; qualis & in Cappadocia effoditur speluncis: quę saxis adhæsit excellere existimatur. Glebis suis color, extra maculosus: hac uisi sunt ueteres ad splendore. At sphragis uocatur, inquit Galen⁹, quoniā Dianę signū habeat a sacerdotē impressum: nec animalium sanguinē misceri, sed triticum & hordeum piamenigratia illi terre dari. Rubet ambusti modumulus in Lemno: ubi hæc legitur, prope opidum Ephestiada cognominatū, quod in eum locū Vulcanus ceciderit: quō orientem spectat insula. Ibi nihil iuxta nasci aut uirere. Siccat Lemniam, nec remollescere sub digito protinus tactam, ut rubrica. Philoctetem sanatum ea ex hydri morfu Philostratus scribit: ob eamq; rem nouum insulę nomen inditū, ut pro Lemno diceretur Acesa. Huius insulę uestigialia senatus populusq; Romanus concessit Atheniensibus fouendo.

CHALCANTHON. DCCCCL.

Chalcanthum, aut chalcantus, aut chalcantides, ut Strabo appellat, at Cornelio Cello atractionem æris Græci nomine fecerunt. Fit in Hispania ē puteis stagnisq; id genus aquę habentibus. Decoquitur ea admixta dulci pari mensura, & in ligneas cortinas funditur. Immobiles super has transtris dependent testes lapillis extente: quibus adhærescens limus, uitre acinis imaginem quandā tuarē reddit. Exemptum ita siccatur diebus xxx. hoc ipsū uocant, quod fit & salis modo, flagrantissimo sole, admissas dulces aquas cogente. Color est ferrugineus, siue cœruleus perq̃ spectabili nitore, utrumq; eē creditur. Diluendo fit atramentū tingendis corijs. Fit & pluribus modis genere eo terrę in scrobibus cauato, ut Dioscorides tradit. Purissimū est quod Italictida, siue Italagmiam, hoc est Italicium uocant.

Sed ex eo candidū colore uiolam sentiente leucoion nominant: cætera violacea. Fit autem quod pecton uocatur, & in saxos: catinis pluuia aqua coriuato li mo gelascente, à quo & nomē habet. Factitium palli dius est q̄ flosile, quantū colore, tantum & bonitate uincitur. Maxime probant Cyprii in medicing usu, quod & solum Possidonius esse credidit. Chalcanthū Galenus in chalciti lapidem mutari tempore, incipiens à superficie, cessatus est. In harena urforum & leonum ora chalcanti aspergi solita dicuntur: tan taq̄ erat uis in astringendo, ut mordere non possent. Differt *χάλκιστος* id est æris flos à chalcantho latius q̄ ut monendū sit: etiam si Democritus in chymicis florem æris dicendo, chalcanthum intellexisse uideatur: ut chalcāthum nominādo lutum oui significare uoluisset. Atramentū est & quod melanteriam Græci dicunt, explicandū suo loco, itemq̄ melan. Differt calacanthum à chalcantho, quod illud herbæ genus est, muscas muresq̄ necans, nec aliud de ea productū inuenio: q̄q̄ Græci uulgo calacanthum accipiunt pro chalcantho.

CHALCITIS LAPIS. DCCCCLI.

⁶⁷¹ **C**halcitis hoc est lapis ærarius ita dicitur, quoniam ex ipso æs coquitur. Distat à cadmia fosili: quod illa ex subdialibus petris cæditur, hic ex obrutis. Item quod chalcitis friat se statim, natura mollis, ut uideatur lanugo concreta. Est & alia distinctio, quod chalcitis tria præter se genera complectitur, æs, misy & fori. Habet autē æris uenas oblongas. Probatur mellei coloris, gracili uenasq̄ discursu. Putant & recentem meliorē esse, quoniam uetustate fori stat. Maceratur autem in ficitilibus ex aceto circumlitis simo, diebus xl. & colorē croci trahit. Chalcitis inueterata, ut Galenus inquit, etiam in misy trāsīt, à summa cito incipiens.

MISY.

DCCCCLII.

⁶⁷² **M**isy quidam putauere fieri exusto lapide in scrobibus, flore eius luteo, miscente se ligni pinea fauilla. Reuera autem ex chalciti fit la pide, concretū natura discretumq̄: optimo cum teritur, harenosa qualitas siue terreæ, similis chalcidei. Hoc miscent: aurū purgant: lapidosus est q̄ fori.

MELANTERIA.

DCCCCLIII.

⁶⁷³ **M**elanteria ex nomine quidem ipso atramentum significat: quemadmodū & melan, de quo post dicemus. Differt quod melan factitium, & librarium siue scriptorium atramentum est: melanteria uero terra.

SORI.

DCCCCLIII.

Sori Cyprii oculis utilius, cæterō superatur ab Aegypto. Alterius nationis sori q̄ Aegyptium si teratur, splendescit. Sori crassius est q̄ misy. Chalcitis mediā inter ea qualitatē habet. Galenus autor: Describitur fori à Democrito cœruleū, scaberrū, semper inueniri solum in ipso misy, uocatum ab aliquibus chalcanthum uiride.

DIPHRYGES. DCCCCLV.

⁶⁷⁴ **Q**uatuor habent qui æs perficiunt: æs, scoria, florem, diphyrga: æs ipsum in catino desluit: scoria extra for naces: flos supernat: diphyrges remanet, autor Plinius: Quidā perhibent in fornacibus globos lapidis qui coquantur, ferruminari: circa hunc æs feruere: ipsum uero non percoqui, nisi translatum in alias fornaces, & esse nodum quandā

materia: id qd relinquit ex cocto diphyrga uocari.

ARSENICVM. DCCCCLVI.

Arsenici siue arthenici tria genera: coloris in auro excellentis: alterq̄ pallidus & sandarachæ similis, quod sit deterius: tertiu q̄d miscetur aureus color sandarachæ, quasi ex prioribus duobus iunctum. Vtraq̄ hac squamosa, illud uero siccum purumq̄, grati uenasq̄ discursu fissile. Arsenicum nos & auripigmentū uocamus, ut Paulo & Virruuo, & Plinio, & Celso placet. Democriti chymistæ androdamanta quondam hoc appellant. In Carmania duos haberi montes Onesicritus tradidit: terum arsenici, alterum falsi.

SANDARACHA. DCCCCLVII.

Sandaracha inuenit & in insula rubri maris Topazono, ut ochra: sed inde ad nos importari negant. Inuenitur autē & in aurarijs & argentarijs metallis, ut in Paphlagonia Pimolifeno tractu, urbe Pompeiopoli. Sed & in Scythia proxime flumen Hypanin optima. Fit & adulterina ex psimmyrtho ita fornace cocto: idq̄ incendio facto ex casu reperitum est. Colos esse debet flammeus, pretiū in libras asses quini. Virruuius multo meliorem usum præstari ex ficticia q̄ ex fossili sandarachæ pictoribus existimat.

ALVMEN.

DCCCCLVIII.

Alumen Græci ab astringendo hyperia dicitur. Qui uolunt hoc exprimere, assurgunt tetræ finiunt. In Cypro candidum & nigrū, exigua coloris differentia, cum sit usus magna: quoniam inficendis claro colore lanis pellibusq̄, candidum liquidumq̄ utilissimum est: contra fuscis atq̄ obscuris, nigrum: ob id byrsoedepicon utrunq̄ cognominatur. Et aurum nigro purgatur. Fit autem omne ex aqua limoq̄, hoc est terræ exundantis natura, corruatum hyeme: foliibus æstius maturatur. Quod fugit ex eo præcox, candidum efficitur. Laudatissimum in Aegypto alumen, proximum in Melo: q̄q̄ in medicina Aegypto prælatum. Nascitur & in Hispania, & Ponto, & Strongyle insula. Phorimon uocatur liquidum, cui noræ optimi respondeant: quod an sit adulteratum, deprenditur succo punici mali: syncetis enim mixtura eius nigrescit. Est & genus alterum, quod paraphoron uocant, pallidæ & scabræ naturæ, & quod inficitur galla. Concreti uero aluminis genus id quod trichitin appellauerunt, siue arbiterantur ex lapide: propterea & chalciti uocant, quem Hippocrates Meliada: quia sit & Melo, no minat: ut sit sudor quidam eius lapidis in spumam coagulati. Strongyle duas habet species, fungosum atq̄ omniū ore diluifacile, quod in totum rescitur: melius pumicofo, & foraminum fistulis simile spōgie, nec inficiens nigritia. Optimum ex omnibus rotundis Melinon. Aluminis, ut breui comprehendā, sex habetū Galeno summa genera: scissum siue scissile, rotundum, astragaliores hoc est talare: hygron id est liquidum: placitis, & plinthitis: hoc est, crustarium, & latercularium. Alumine prælitā non incenduntur: id quod & obsidione Athenarum sub L. Sylla Quadrigraris compertum scribit.

SVLPHYR.

DCCCCLIX.

Sulphur Græce *θέρ*: nascitur in insula Aeois inter Siciliam & Italiam, quas ardere cernimus. Nobilissimum in Melo: sed & Neopolitano Campanoq̄ agro collibus, qui uocantur Leuco.

Leptogæi. Libyæ cuniculi effossum curatur igni. Genera quatuor: uiuum, hoc est apyrton, siue ignes non expertum: gignitur solidum id est glebosum, coq̃ uno ex omnibus generibus medicatur: cætera liquore constant, & perficiuntur oleo incocta. Viuum effoditur, transluet & ac uiret. Alter genus appellatur bolon: quidam pro sulfure tantum crudo bolon capiunt. Tertium uocatur egula: cuius unus duntaxat usus ad sufficendas lanas, follosum officinis: quoniã candorem tantum molliet & confert. Quarto utuntur ad ellychnia maxime conficienda, ex eo cauton uocant. Cæteræ tanta uis est, ut morbum fonticum deprehendat niodore. Lufit & Anaxilaus eo, condens in calice nouo, prunãq̃ subdita circumferens, exardescens reperculu pallorem dirum uelut defunctorum effundente conuiuio. Harpacticon siue harpax appellatur in medicamentis, à celeritate uellendi. Habet & in religionibus locum, ad expiandas suffitu domos. Sentitur uis eius & in aquis feruētibus: neq̃ alia res facilius accenditur. Fulmina quidem & fulgura sulfuris odorem habent: ac lux ipsa eorum sulfurea est. Porro sulfur in uenis terræ ceu de coctus quidam adeps est, tam ualida & firma consensione partium, ut oleum eius arte nulla separari possit in rebus cæteris. Propterea cum oleacea & ignea non falsiginea sit eius natura, haud facile diluitur. In spiritum siue nebulam facile attollitur ac sublimis fit. Crematū cum ære, uiolaceum colorem: cum hydrargyro, cœruleum facit. Sunt hæc chymistis notissima: nō aliud magis in cōficiendo auro commendatibus, q̃ sulfur: quippe quod splendorem & colorem metallis afferat: ut corpus & materiam hydrargyros: proindeq̃ sit maris uice sulfur: hydrargyros uero, id est argentum uiuum ferminæ: ut Democritus propterea omnis generis metallici spumam esse argentum uiuum prodidit. Duobus ijs pharmacum illud famigeratum potius q̃ coemptū etiam Philosophici lapidis nomen clatura nobile. Conscit ut Osthanæ, Mercurio, Chane, Zosimo, Agathodæmone, Democrito: q̃q̃ & alij scriperunt de miris ne dicā signemētis huius peritæ. Orus chrysochites. Pebichius, Comerius, Ioannes, Apuleius, Petasius, Pelagius, Africanus, Theophilus, Synesius, Olympiodorus Alexandrinus: Recentiores ijs, Stephanus ad Heraculum Cæsarem, Heliodorus ad Theodosium. Iam ferminæ tres, Cleopatra uirgo Taphnutia, quæ minus probatur, & Iudegætis Maria, quam plurimi sequuntur. Autores q̃ occultendæ rei gratia nihil ferē suis nominibus appellant: ut ipsam sulfuris & hydrargyri fuliginem argyron noma, hoc est argenteum fontē dicant: rasemon uero fuliginis eius ferruginem.

P V M E X.

DCCCLX.

Pymicis farinam potioresin certamine bibendi præsumere, sed nisi uniuerso potu impleantur periclitari, Theophrastus auctor est: qui & eudemum pharmacopolam in uigefimas sextundas uices durasse scribat: in gressuq̃ balneas, nihil omnino reiecit, sed quasi non bibisset, ita cenitasse: pumice uidelicet ab septima statim potione hausto: primum ex aceto aspero, mox ex uino: ut errauerint qui locum cum in Theophrasto de uigintiduabus el lebori potionibus acceperunt: cum ex Plinio id facile deprehendi possit. Pumice in musti caduos ad dolo, non ad præsens modo, sed in totum feruere u in a desinunt uisificifica. Pumicis duo significatus: alter no

tus omnibus, altero dicuntur ita & cætera laxa erosa annis, qualia in ædificiis, ut Plinius inquit, musæa uocant dependentia, ad imaginem specus natui arte reddendā. Nunc inde musæica uulgo nominatur, pretiosissimis dicata templis, inuentum id Agrippæ quidā referunt acceptum. Huiusmodi operis artifices musæcios Cassiodorus, & Iustiniani leges uocant: etiam si muscarios corrupte multi leſtitent. Ammianus Marcellinus musicium opus nominat. In uitis cæsarium, quas ab Adriano Julius Capitolinus & alij complures scripsere, picturā de musæo nominatur, etiam si mendose legebatur de musco. Laudatissimi pumices sunt in Melo, Scyro Acolijsq̃ insulis. Probat tur teri faciles. Poliendis libris accommodantur, unde repumicatos appellamus. Pumex Græce cilleris uocatur: quod nō aliud nihil significat q̃ erofum: etenim uermiculus triticarius & hordearū, eis dicitur ut ipsi, cotniculari? thrips, lignari? sis, uestiari? ix, uitiari?, si Photioni grāmatico fides habenda est. Pumicē ueteres etiam spōgiam uocabant: nam & ē maris q̃q̃ spuma coalescunt aliquando, itemq̃ ex harena littorali, ut in insula Cyclade Nisyro. Vitruuius: Quæ nūc, inquit, sub Vesulio monte spongia siue pumex Pompeianus uocatur, ex cocto alio genere lapidis, in hanc redactus uidetur generis qualitatem. Talis autem pumex, inquit, & circum Aetnam gignitur, & collibus Mysiæ qui catacecaumenos à Græcis, hoc est deustus appellatur. Talis & lipareus est ut inquit Theophrastus: alioqui ante q̃ uratur, niger, leuis, atq̃ farctus. In Melo quoq̃ insula idem auctor est, pumices quandoq̃ in altero gigni lapide: ponderosum, & nigrum esse Siculum, qui & cæteris præfertur.

S A L.

DCCCLXI.

S Alomnis: Græci halas uocant, panacæam Lucretius à remediorū multitudine. Aut fit, ut palustris, & maritimus: aut gignitur, ut sollicitus: utrunq̃ pluribus modis, sed causa gemina: coacto humore, aut siccato: Siccat in lacu Tarentino, itē lacu Cocanico in Sicilia, & alio iuxta Celan & Pachynum, tanti splendoris ut sentiat imaginem: item in Phrygia, Cappadocia, Apendi, ubi tantū noctu subuenit, quantū inter diu auferas. Omnis est alius salmi nutus atq̃ non gleba. Lacus duo in Baetris sale aestuant, In Cypro Citteum, ab oppido id nomen. Extrahunt & Memphis stagna, dein sole siccant. Apud Caspias portas, quæ salis flumina appellantur, superficie densantur in sale, amne reliquo fluente, uelut sub gelu. Item circa mardos & Armenios, & in Baetris amnes Ochus & Oxus, ex appositis montibus deferunt salisamenta. Lacus in Africa & quidē turbidi, sale ferunt. Calidi quoq̃ fontes sicut Pegase. Oromenus salis mons natui est apud Indos, in quo exortitur renafces, magno uictigali regū. Carris Arabia oppido, muros domosq̃ massis salis faciūt, aqua fertuminantes. Inuentus & iuxta Pelusium, inter Aegyptū quoq̃ Arabiam etiam per Africā sequentia detrahit harenis usq̃ ad Ammonis oraculū, qualis crescere affirmatur cum luna noctibus. Ammonia & tractu Cyrenæico celeberrimus sub harenis, unde nomen, similis est colore alumini filisili, longis glebis, neq̃ per lucidas, ingratas sapore, sed medicinæ utilis, leuissimus, intra specus suos in lucem uniuersam prolatus, uix credibili pondere ingrauescens. Adulterat Cocanico & Cypro mire simili. In Hispania ceteriore Egelestæ caditur glebis penē translucentibus, cui

n a iampril.

iam pridē palma à pleriq; medicis tributa. In Medis Atropatena regione, stagno cui Spauta est nomen, sal coit, pruritus & dolorē tactu ciens: Remedium oleo inungere. Omnis locus in quo reperitur sal, sterilis est. Vulgaris plurimus in salinis mari affuso, non sine aqua dulci, sed imbre maxime iuante, ac super omnia sole multo. Africa circa Vticam construit acer uos salis ad collisū speciem: & in agro Rauennati ceruia, ob id ita, ut puto, nominata quasi aceruia, quiso le & luna indurere, nullo humore diluuntur, uix ut ferro cædi possint. Fit tamen & in Creta sine riguis aq̃e dulcis, & in Aegypto. Fit & puteis in salinas ingestis. Prima densatio Babylonæ, in bitumen liquidum cogitur, oleo simile, quo & in lucernis utuntur: detracto subest sal. Et in Cappadocia puteis ac fonte quē in salinas ingerunt, ubi & specularium modo lapidum effoditur, magno glebas pondere, quas uulgus micas uocat. In Chaoia excoquitur aquam ex fonte, refrigerando q̃e salem faciunt inerte, nec candidū. Gallia Germanizē aquā salisam lignis ardentibus infundunt. Hispaniē quādam parte puteis hauriunt saluginē, muriam appellantes. Quercus ad id optima: alibi corylus laudatur. Cæto etiam in sale uertitur. Quicunq; ligno conficitur sal, niger est. Umbri harundinum, & Iuandæ cinerem excoquunt aqua, donec exiguū super sit humoris. Quin & muria salamentorum recoquitur ad naturā suam, cōsumpto rediens liquore, uulgo ē menis iocundissimis. E' stagis maxime laudatur Phrygius Tartæ cognomen, & Tarentinus quē antiqui ad medicinæ usum uehementer probant. Tartæus ē Cappadocia magna Phrygiæ parte stagno, Tartæ Morimenoꝝ gente nascitur: nam qui fossilis in Cappadocia sal est, in laterculis affertur. Colopeno & Camiseno tractu multo, ut Straboni placet, feciminis gratissimus, quia cutis nitorem faciat: magis tamē extendit Citreus. Salissimum salem putant qui sit siccissimus. Sua uisum effe Tarentini, eundemq; candidissimum. Fragilis qui cunq; candidus: pluuia dulcescit omnis. Suauiorē rores faciunt, copiosum aquilones. In igni nec exilit nec crepitat Acanthus, ab oppido ubi nascitur uocatus: nec Tragæus prope Smynthiū in Troade, ab aquis quæ Tragala dicunt, appellatur: siue ut Iulius Pollux à Trageo, cui Neptunus agros in salem uerte rit. Licebat hunc omnis gratuito colligere. Ve tīgalem fecit Lyfimachus, obaruit: ue tīgilibus remis sis, denuo erupit. Sed nec ullius spū crepitat in igne, nec ramentū, aut tenuis sal. Agrigentinus ignis patiens: ex aqua crepitu exilit. Rubens Memphis, croceus in Cappadocia, idemq; odoratissimus. In Baetris rufus cæca Oxum, Centurpis, & in Aetna purpureus, & in Lusitania, ut inquit Strabo, purpureus albet. Iu mentoꝝ & boum oculis Tragæus & Beticus præfer tur. Ad obsoniū & cibū uilior, quisquis facile lique scit, item humidior: minus em̃ amari sunt ut Atticus & Euboicus. Seruandis carnibus aptior Megaricus, qm̃ acer & siccus est. Condif sal odoribus, quo & pulmentarij uice uisi ueteres: adeo q̃e necessarii elementum est, ut transiret intellectus ad uoluptates animi quoq; nam ita, ut inquit Plinius, sales appellant: hinc dicta salsa & uia salaria: qm̃ ea sal ad populos portari cōsueuisset. Ancus Martius salinas prim' instituit, & populo congiariū ē sale dedit. Sine sale, hoc est mo la salsa, nullū sacru fiebatur. Caunites efficax in collyria, Thebaci ad parcutiū, Iundac & à Sodomis Ga-

leno, Sal, utriū atq; nitrū, sulfuri concoctū in lapidens uertit. Cornea piscatorū corpora dicunt, quia sole, & sale obdurnentur. De agrico sale mētionē in Columella inuenias, nisi pro genere utri capiat, qd̃ agrion uo cari docebitur: haud scio præterea qualis sit.

H A L O S A C H N E. DCCCCLXII.

Halofachne salis genus, & hoc spōte natū, spuma ex aquis maris in extremis litoribus ac scopulis relicta: hæc em̃ omnis rore densat, & est acrior quę in scopulis inuenit. In igni nec crepitat nec exilit. Ad omnia in quę sales, probat: spuma iocundior & uilior. Halofachnen uocat & unū ē quinquagyonij generib'. SALSUGO DCCCCLXIII.

Salsugo. i. halme, itēq; muria uocari potest: & aliud genus muria inter sales diximus. A' garo differt halme, etiāsi utriq; ad pisces, Galeno teste, prinet. Garus est sanies intestinoꝝ ipsa, ut dixim' secūdo libro: halme uero muries & salislagō pisciū inueteratoꝝ, hoc est ius salum in q̃ seruatur, quā mulie res nostrę uulgo salinuria appellat. Hec à ueterib' & salugo Thasia uocari solita: cēra cōdebant inuetera. bāturq; pisces ij, quicūq; in pruna & craticula cōmode coqui possent: ob id eos Aristophanes anthracidas, hoc est prunarios & carbonarios uocauit: nos ut arbitror, aleculas. Huiusmodi sunt fmarides & mæne: itē chalcides, quas & chalcidicas & Sardas & Sardinios q̃q; appellā: nā chalceus id est faber, alius piscis est orbiculari specie Cyzici frequēs. Carbonarij sunt & trichides, quas & trichias uocant: nam trichiades ab Aristotele dicuntur q̃e thynnides sint, quas tū ipas ut Athenęus quinto de partibus aialii volumine, trichidas nominat. Eiusdē sortis arbitror hepseos à coquēdo noiatos, q̃s Artemidorus etiam plectos uocauit: sed in Aristotele Theodoros naricas interpretatus est, nescio q̃ uere. Piscis certe minutus est narica, ut Fest' inq̃r, Plaut' muricā nariā in uasis stācis apporat in comœdia. Illud in transcurso dixerim, Sardinios ab Aristotele intelligi nōnunq; eos, q̃ a nōnullis eritimi uocat. Differūt porro eritimi ab erythinis: nam eritimos, ut dixi, sarda est uel sardæ similis: erythinus autē is est, qui à nostris uocatur rubellus. His generibus proximæ sunt & thryssæ, quas Gaza noster & ante Gazam Georgius Tiphernās in Strabone alofas, cōmuni pisciū cū mugil' & delphinis Nilo: sed ita cur uocēt, nōdū comperi: A' quibus distant q̃ thrattæ siue thrassæ nominant, & à quibūdā chette, Pisciculus & hic pusillus ac uersicolor. De alofis est quod dubitem, sint hæc quas Romanū uulgus lacias appellat, alofas Gallia & Germania, culpes Venetia: in immensum prælatas, quę Tiberino amne capiant: an genus aliud. Athenæus quidē laron piscem cōmemorat, quē Archeltratus poëtā præstantissimum in Italia nasci cecinit, præferim' q̃d̃ fredo Siculo. Hunc in Nilo grandissimū euadere ducentas excedentē q̃q; libras. Esse autem candidissimū & suauissimū omnibus modis paratū, similē glandi uocato, q̃ amne istro capiatur. Ex aceto & muria fit qd̃ oxalme dicit: sicut apud Cratinum ex alio & muria scorodalmē. Qui ioculare quæstione siue gryphū in cōuiuij propositione nō soluissent, multabant hauſtu muria: sed ita, ut in uino paulatim, & cum interſpiratione bibere. Apud alios uictis meraci, uictoribus oculū dabat.

F L O S S A L I S. DCCCCLXIII.

Flos salis id est halofanthros, siue halofanthron & halafanthron, non sit nisi aquilonibus. Est

autem fauilla salis quæ leuissima: ex eo est & candidissima, in totumq; diuersa res à sale, humidiorisq; naturæ, & crocei coloris aut ruffi. Si feces imæ conuertantur in uasis, uelut rubigo salis, adulteratur: & testa trita. Florem salis Cato uocat qui è populari sale candidus arte factus sit, propterea & alabaster à Democrito quandoq; dicitur.

NITRVM.

DCCCCLXV.

Nitrum Græci, & litron uocant Attice. Veteres hoc ignorauere medici. Non multum à sale distat: nec quisq; Theophrasto diligentius de eo prodidit. Exiguum fuit apud Medos, canescentibus siccitate conuallibus, uocabant halmirhaga: minus etiam in Thracia iuxta Philippos. Sordidum terram, quod appellat agiron. Omisum est è quercu cremata fieri, propter impendia: nitrosæ uero aquæ multis locis repetæ, sicut & sulphurosæ aluminosæ, sed sine uiribus densandi. Optimum copiosumq; in Clitis Macedoniæ: quod uocat chalcæstricum, quo in pane uruntur pro sale, cui & proximum est natura, purum & candidum, nitroso ibi lacu exiliente è medio dulcis aquæ fonte: quo semper emicante, nec augeat tamen nec effluit. Ibi fit nitri canis ortu, nouenis diebus: si flere imbres, salisus: per aquilones cessat: toridemq; deterius: ac rursus innat, ac deinde cessat. In Aegypto non nascitur, sed conficitur fuscum lapidosumq;, nitrarijs Nilo infuso: Siccantur excedente eodecedente, madent. Succo nitri quadraginta diebus continuis, non ut in Macedonia itati: & rotundusq; ut densari est ceptum, rapitur ne liqueat. Condunt in aceris durat in lacu Asinio, & quibusdam circa Chalcedon fontibus. Sumas aquas dulces & poculentas tradunt: inferiores nitrosas. In nitro optimū quod tenuissimū, & ideo spuma melior, aphronitru uocata. Sordidum tantum probant ad insidicias purpuras, tincturasq; omnes. Nitrariæ circa Memphim peiores, ubi & circa Naucratin duntaxat solebant esse in Aegypto: nunc multis in eadem provincia locis egregie usuntur. Lapidescir circa Memphim, multis ibi tumulis ex eo faxeis. Faciunt ex his uasa. Liquidum cum sulfure coquentes, carbonibus ferrumant in lapide. Ruffum ibi exit à colore terræ. Adulteratur calce, quod & pungit gustu, odoremq; reddit uehementē: syncetum uero facile resoluitur. Inuectant ibi nitro res pro sale. Igni non exilit nitrum, nisi è testa, nihilq; gignit aut alit: cum in salinis herbæ, in mari tantum algæ, tot animalia nascuntur. Nitraræ calceamenta protinus cōsumunt. Vlcera alla eò, celerime sanantur: ibi facta, tarde. In nitrarijs non lipiunt. Aegyptiū teneriores facitraphanos: sed obsonia alba, & olera uiridiora. Salnitru uocabulo uulgi dicitur pulueri conficiendo necessarium, quo ad bellica tormenta utuntur: nouitia pœnitendaq;, ac pessimo publico inuenta. Diuersum à nitri generibus existimo, indictumq; ueteribus, etiā locus in Plinio est, ubi de hoc genere loqui uidetur: sed eum nos mendosum credimus.

APHRONITRVM. DCCCCLXVI.

Aphronitrum siue aphrolitron maxime laudatur, quia fit nitri pars tenuissima. Hoc ueteres negabant fieri, nisi cum ros cecidisset prægnantibus nitrarijs, sed non diu parientibus: itaq; non fieri incitatis, etiā si cadere. Alij operimento: ac uetorumq; fermento gigni existimauere. Proxima ætas in Asia colligi tradit in speluncis distillans

molibus, specusq; eos colycas uocat: dein siccat in sole. Lydium in pastillis affertur. Aegyptiū in uasis picatis, ne liqueat. Vasa quoq; ea sole inarescentia perficiuntur. Differt aphronitru ab aphonitro: id qd spuma sit, tritum esse in pollinem affirmant, candidum & triticæ farinæ simile: aphonitrum uero siue apholitrum, cōgelati specie coit, eod; in balneis quotidie, ut Galenus inquit, ad exterandas sordes utimur.

FEX VINI.

DCCCCLXVII.

Vinifex Græce tryx uocatur, utiq; non usia, sicut usia sphecle quasi fecula, interim spheclē pro fece cruda quoq; Græci capiunt, ut Paulus. Feci tanta uis est, ut descendentes in cupas, enecet. Experimentū dimissa præbet lucerna: q̄diu extinguitur, descensiois periculū denuntians. Siccata recipi ignes, ac sine alimento perflagrat, cuius uis & natura quæ nitro. Fex cum expirauit, lauidans corporibus & uestibus est utilis. Fex aceri pro materia acrior sit oportet. Virg: multum adificit uirum crematio. Habet & suam sapa fecem. Cratinus poeta comicus, hoc est tryga pro uino quoq; accipit aliquando: apud nos quoq; seculam qui dixerit pro uino, meminisse uideor.

CALX VIVA.

DCCCCLXVIII.

Calx uiua id est asbestos. Differt ab ea calce, quæ Græci titanon appellant, ut species à genere item à maltha, quæ sit ex calce recenti. Vtino restinguitur, mox tunditur cum adipe suillo, & sicu, duplici linamento: quæ res omniū tenacissima, & duritia lapidis antecedit: quod malchat, oleo præficatur ante. Galenus in Hippocrate maltham pro cera capit.

GYPSVM.

DCCCCLXIX.

Gypsum siue gypsius, siue spygos, ut Theophrastus quoq; nominat, plura habet genera: nam & coquitur è lapide, ut in Syria & Phœnicæ, ac Thurijs: & terra seditur, & quidē summa eius cute, ut in Cypro: copiosa item Aetolia circa Perxbiam atq; Tymphem, à quo & Tymphaciū siue Tymphetici uocatur. Qui coquitur lapis non dissimilis alabastris esse debet, aut marmoris crofo. In Syria durissimos ad id eligūt, coquantq; simo bubulo, ut celerius urantur. Optimū fieri comperitū est ex speculari lapide, q & diaphanes uocatur, squamam uitæ habente. Gypso madido utendum est, quoniam celerime coit. Incepta fit operi durities, tamen rursus tundi & in farinam resolui patitur. Natura gyphi calor in terendo tanti, ut rudiculus non manibus tractari possit: tenacissimus ob id usus eius in albarijs sigillis, ædificior & coronis gratissimus, & ad uaporaria conclauium apud nos, quæ mappas ex nostra consuetudine uocamus. Græci pro Cymolia uestibus poliendis Tymphaico utebātur gypso Theophrasti ætate: hinc gypsiati uenaliorem pedes, ut in Cymolia dicitur. Est & in gypso quod slos appellatur. Veteres chymistæ argentum uiuum gelu astrictum hoc est spissatum iam addensatumq; gypson uocabant.

CINIS VITIUM.

DCCCCLXX.

Cinix Græce conis, & spodium & tephra dicitur, & colofertos poetice: sed lixiuium, conia. Apud nos lix unde lixiuium & lixtua, & ut Columella uocat, lixiuia, cinis foci uocatur: dictus forte quia luxaris in potu proficit: unde gladiatores cū delissent, hac iuuari potione uidebantur. Cinis omnium astrictoriam inesse Dioscorides uoluit. Negat

n id Gale.

id Galenus, utiq; ficulneo. Ipsum quoq; uinum, quod anteq; prælo pressum fit, aut nimii calcatæ uug in lacum musti fluxerit, lixiuum, aut lixiuii mustum appellatur, à Græcis uero prochymanam & protoctactum inuenio apud Pauli: sed pro cinere lixiuo qui primus distillauerit, ut coniectura capio. Calidum cinerem Hippocrates marilem appellauit.

A L C Y O N I V M DCCCCLXXI.

Flit in mari alcyonium ex nidis utaliqui existimant cæcum & alcyonium, quas nostræ alcedonas uocant: quasi algedonas ab algore: ut alij, & for dibus spurnæ crassescuntibus: alij è limo, uel quodam maris lanugine: quò candidius hoc minus probabile. Dioscorides quinq; genera dinumerat, Plinius quatuor: primum quale Dioscorides: secundum molle, lenius, odore ferè algæ: tertium candidioris uermiculi: quartum pumici & spongig putri simile, pene purpureum: quod optimum, hoc & Milesium uocatur.

A D A R C A. DCCCCLXXII.

A Darca & adarchion, & adarches, & adarcos dicitur item calamochnus, id est calamianu go. Plinius Latinè adarcæ nomen putauit, in Italia nascens circa tenues harundines, hoc est in cortice calamorum sub ipsa coma, è spuma aquæ dulcis ac marinæ, ubi se miscet.

S P O N G I A E. DCCCCLXXIII.

S Pongia Græce σπγγια appellatur, itemq; σπγγια ut dicunt Attici: inter zoophyta, hoc est quæ nec animalium nec fructuum naturam, sed tertiam ex utroq; fortiantur. Nascuntur omnes in petris. Aluntur conchis, pisce, limo. Vbi auulso rem sensere, contrahunt se, ac multo difficilius uelluntur, exprimentes humores: abscessus uero sanie emittentes. Circa Toronem, ut inquit Aristoteles, uel scilicet conchis minutis intra eas repletis, constituta uulsaq; aiunt & ex relictis radicibus recrefcent. In petris cruoris quoq; inhæret color, Africis præcipue, quæ generantur in Syrtibus. Maximæ sunt Mauræ: sed mollissimæ circa Lyciam penicilli: in profundo autem nec uentofo molliores, unde ablatae sunt spongiae: In Helleponto circa Maleam uero asperæ ac densæ. Putrescunt in apricis, ideo optimæ in gurgitibus. Viuentes madentesq; ac illoræ nigricant. Adhærent nec parte nec toto: inter sunt enim fistulæ quæ dā inanes quater nā ferè aut quinq; per quas pasci existimatur: item aliæ sed superne concretæ, & subesse membrana quædam radicibus earum intelligitur. Viunt longo tempore. Pessimæ sunt Aplysæ, quia trui non possunt, in quibus maximæ sunt fistulæ, & reliqua densitas spissa. Cæteræ aliter discreuere genera earū quidam, tria faciendo, spissum ac prædurum, & asperum, quod tragos id est hirculus uocetur: alterū spissum & mollius, quod Inauos: tertium tenue densumq; Achilleum, inuentu rarum. Hoc galeis & ocreis inferitur, ne strepitum gestatū ciant. Ex eo penicilli sunt. Medici inficitia ad duo eas genera redegere: Africanas, quarum firmissus fit robur: Rhodiacas, quæ ad fouendum molliores. Nunc autem mollissimæ circa Lyciæ urbis Anipelli muros inueniuntur. Mares quæ dicuntur perforbent, tingunturq; in deliciis aliquando & purpura. Foeminis fistulæ maiores ac perpetuæ, tragis tenuissimæ ac densissimæ. Ab aquilone

genitas cæteris præferunt: nec usq; diutius durare spiritum medici, q̄ in spongias affimant. Sic & prodesse corporibus quia nostro suum miscant. Hoc genus remediij apoplegismum Archigenes & secuti eūme dici, appellant. Quia uero de peniculis diximus, scire oportet, non spōgiasmo, sed & eodis quoq; fetas penicillos à ueteribus esse nominatos, quibus calcaementa tergebantur: ob id & tergentes uocabant eas aliqui, nos uulg osetulas. Est enim penis idē quod cauda: unde penita offa oblegmen carnis porcinæ cum coda significat.

C O R A L L I V M. DCCCCLXXIIII.

Quantum apud nos Indiciis margaritis pretiū, tantum apud Indos corallio. Gignitur & in rubro mari, sed nigros corallum in Persico uocatur iace. Laudatissimum in Gallico sinu circa Orchadas, & in Siculo circa Heliam & Depranum. Nascitur & apud Grauiacas in Italia, & ante Corniculum, & Neapolin Campaniæ, maximeq; rubens, sed molle: & ideo uulsiſſimum Erythris. Color sub aqua uiridis. Baccæ eius candidæ ac molles. Extra rubescunt induranturq; ceu cornu fatiua magnitudine ac specie. A iunt tactu protinus lapidescere, si uiuacitas occupari uellitq; crebris, aut acri ferramento præcidi, à quo & corallio quasi curallio & πύλλος nomen inditū: nec aliter sane Theophrastus q̄ curallum appellat, à radendo scilicet, ob id & Gorgonia quoq; dictum putatur, itemq; dendrite hoc est arboreum. Probant q̄ maxime rubens, & q̄ ramosisſimū. Damnant inane aut concanum. Auctoritas baccarum Indis, utroq; sexu pretiosa. Religiosum etiam id gestamen auspices eorum uacatq; inprimis habere, priusq; hæc nostercerent. Galli gladios, scuta, galeas adornant corallio: postea Indis uniones suas pro corallio mutantibus, in penuria effe cepit. Surculi eius infantie adalligari, tutelam habere creduntur: ignibus diu reputant. Est & lapis corallius, uel ut quidam scribūt corallaris, multum à corallio diuersus, pyrites à quibuldā appellatus, quoniā sit plurimus ignis illi. Sed est alius etiam nūm pyrites in mentionem suam seruand⁹. Qualis porro lapis erythros hoc est rubens ab Hippocrate significetur, quo mulieres, inquit, explorantur an sint prægnantes, nisi aut corallium sit, aut pyrites, aut etiam hæc matres, affirmare nihil habeo.

A N T I P A T H E S. DCCCCLXXV.

A Ntipathes pro genere coralli, quale sit in Plinio, haud facile docuerim: nisi quis intelligat fruticem circa Troglodytarum insulas nascentem in alto quem Isidos plocamton uocari tradit, corallio similem: sine folijs sententium, se capi durariq; colore in nigrum: cum cadat frangi. Theophrastus corallij duo uidetur statuere fastigia: unum quod rubens rotundumq; est, ut radícula in mari nascens: alterum huic non multum dissimile, quod calamus, inquit, uocatur Indicus, qui duratur in silicem. Plinius inter gemmas enumerat corallida, minio similem, quæ in India Syeneq; gignatur: fortasse per Theophrasti tempora minus erat corallij uulgatus usus.

L A P I S P H R Y G I V S. DCCCCLXXVI.

L Apis Phrygius, gleba est pumicosa. Plinius medicinæ uilem negauit.

L A P I S A S I V S. DCCCCLXXVII.

A Sius & asia petra dicitur. Est & Asius perduplex. Ab Asso Troadis, ut inquit Plinius, sed ab asio diuersus: ille sarcophagos quoq; nomina,

minatur ab effectu, qualis & in Lycia & in Oriente habetur, & in Myſia quoque inueniri cum Stephanus affirmat: nosſter hic per ſimplex ſ. ſere ſcribitur ab autoribus noſtris, guſtu ſaliſus. Corpora deſunctorū condita ſarcophago, conſumi intra quadrageſimū diem. Sed illa quoque mortuis lapidea ſere traditur. In Oriente adalligata uiuentibus, erodunt ea.

PYRITES. DCCCCLXXVIII.

Pyrites ſunt qui & ſideriten uocentur, & androdamanta & bolſtrychiten. In Cypro reperiuntur & in metallis, quæ ſunt circa Acamaniam: unum argenteo colore, qui & argyritis à Democrito cognominatus uidetur, alterum aureo: aliqui tertium genus faciunt, quod plurimum ignis habeat ponderoſiſſimumque ſit, quos & uiuos appellamus. Hi exploratoribus caſtrorum maxime neceſſarij: quia clauo alato o' ue lapide percuffis, excutuntur ſcintillæ: quæ ſulfure exceptæ, aut fungis aridis aut folijs, ceſſerrime ignem trahunt. Pyrites & gemma eſt: neſcio an diuerſa ab hac. Nigram eſſe inuenio, & attritu digitos urentem. Pro pyrite in medicinis venit myliſos ſive mylitis, cochlaæ appellatus, hoc eſt molarius, inſula Niſyro plurimus, ab Hippocrate lapis niger, ut Galeno placet. Myſias ab Theophaſto & Aeliano ex Aethna monte fluens, Iui nigri modo in Sicilia, poſt dureſcens colore cuſt odito. Fluunt & pyromachi dicti, ut idem Theophaſtus ait.

LAPIS HAEMATITES. DCCCCLXXIX.

Haematites reperitur in metallis. Viſtus miniſ colore mimitur. Adulterant ſchiſto: ſed diſtinguunt uenæ rubentes. Eſt & Magnetis ge-
690 nus unum hæmatites appellatum. Præter hoc quinq; genera hæmatitarum traduntur: Aethiopicum, cui & principatus datur: alterū androdamanta uocant, colore nigro, pondere ac duritia ignem, & inde nomen, præcipueſq; in Africa. Trahere autem in ſe argenteum, æs, ferrum. Experimentum eius eſſe in cote ex lapide baſanite, reddere enim ſuccum ſanguinei. Tertium genus Arabici, uix reddentis ſuccum ad coctem aquariam, aliquando croco ſimilem, pari duritia cum ſecundo. Quarti generis Helatites uocatur, quid diu crudus ſit: coctus uero milites aut etiam milites, ad omnia utilior quæ rubrica. Quartum iſs adſciſtur ſchiſtos, de quo protinus mox agitur.

LAPIS SCHISTOS. DCCCCLXXX.

Lapis ſchiſtos cognationem cum hæmatite habet: ſed peculiare in ſchiſto, quod ſplendet. Eſt & ſchiſtos aliteris omnino generis quæ hæmatites, quem cognominant anthracin, naſci tradentes in Africa nigram, quia attritus reddat aquariſ coctibus ab ea parte quæ fuerit ab radice, nigrum colorem: ab altera parte croci. Sunt & gemmæ plures hoc nomine carbunculi, quarum aliæ pretioſæ ſunt, aliæ uiſiores, ut quæ naſcuntur in Grecia: Theophaſtus autor ac Plinius.

LAPIS GAGATES. DCCCCLXXXI.

Gagatem aiunt & in Leuco Pamphyliæ, ut arbitror, promontorio, aut Lyciæ prope Cyprū inſulam expelli mari, æquiſ infra duodecim ſtadia colligi. Solinus & in Britania gagatem gigni tradidit. Planus eſt pumicoſus, non multū à ligno diſferens, fragilis odoreſcit teratur, grauis. Fiſtilia ex eo inſcripta non deſcunt. Accenditur aqua, oleo reſtinguitur. Deprehendere dicitur uirgines ſuffitu. Hoc &

magi utuntur in ea quam à ſecuris argumēto uocant axinomantiā, periri cum negantes, ſi euentus ſit quid quaſi optet. Dictum à fluuio in Lycia cognomine Dioſcorides aſſeruit. Nullum ſe Galenus in Lycia cōperiffe tradit amnem, qui Gages aut Gagates uocetur. Phorion grammaticus oppidum in Lycia fuiſſe Gagas à Rhodis conditum ſcribit. Plinius Rhodiopolin à Gagiſ diuerſam facit. Stephanus Gagas oppidū in Lycia fuiſſe, quod Palæontichos ante dicitur: Cruſtaceos uero lapides argnigros, & qui in ignem additi exilem flammam ederent, bituminiſ odore in Syria coele inuentos ſibi meminit, in collibus mari mortuo circumdatis ad orientem ſolem ſpectantibus, ubi & bitumen quoque naſcitur: utiliſſimos tumoribus ingenu diuturnis.

LAPIS THRACIAS. DCCCCLXXXII.

Eſt lapis Thracias, qui exemplaribus Plinij quibusdam merulla dicitur, trium generis, uiridis, pallidæ, ſanguineiſ guttis, nō habeo certū proferre. Nomengentiſus habet, ut cecinit Nicander, quemadmodum & Cappadoces in Argæo Cappadociæ naſcentes, ſimilium prioribus natura, qui & in lacteum cremorem ſoluuntur, ut Galenus & Paulus Aegineta ſcribunt: qui & ageraton lapidem commemorant, aſtrictoriam & diſcuſſoriam uim habentem, & gutturis inflammationibus auxiliarem, quo ſutores uti ſoleant ad dandū cakeis nitorem: præterea & hiera citin, ut Diogenes ſcriptum reliquit, ſub uiridem ex atro, coloribus item alijs reſperſum: quæ quigeſter, muſcæ non inſeſcent. Hunc literis quibusdam inſcriptis contra ſanguinis eruptiones ualere perhibent. Ad diderunt iſs & Indicum, ſubruſſum colore, attrituſq; ſucco purpureo manantem: nec ualido nec denſo corpore. Inuenio & perdicitin ſive perdicatin, & alium à forbi ſimilitudine, ut uirium cognomento ſcythicum, ad omnes duritias pollentes, in compoſitionem illam quæſitas quæ pamplethes, & diacinnabareos uocatur ab Aegineta Paulo. Viſe ad oculorum quoque ſuffuſiones commendant, cū ſelle aſpidis ac ſonitæ uocatæ, mirabili effectu, poſt quintum diem reſentata curatione: id ſel in ſerpētis eius dorſo iocinori annectitur, ut Aëtio placet.

LAPIS MAGNES. DCCCCLXXXIII.

Lapis Magnes, quem & Magnitū Græci dicunt. Item ſideritū & Heraclon id eſt Herculeum. Magnes ab inuatore uidetur appellatus. In India nunc, & paſſim inuenitur in Hiſpania quoque. Repertus autem ſcribitur clauis ctepidarum, & baculi cuſpide ferrata hærentibus, cum armenta paſceret. Quinq; genera eius ſeruntur: Aethiopico principatum dant, argentoſq; reſpendit. Inuenitur in Aethiopia Zmiri: ita uocatur regio harenoſa: ibi & ſanguineiſ coloris ſanguinemque reddens, ſiteratur: ſed & crocum hæmatites cognomine, in trahendo ferrum non eadem natura qua cæteri Magnetes. Aethiopici argumentum eſt, quod Magnetem quoque alium ad ſe trahit. Secundum genus Magnetia cum eſt Magnetia, & contermina eſt Macedonia, à Bebone locatum petentibus dextra. Tales ruſſi nigriſq; ſunt. Tertium in Echio Boeticiæ, ruſſi coloris, plus habens nigriti. Quartum circa Alexandriam, Troadem nigrum, & ſcæminei ſexus, ideoſq; ſine uiribus. Quintum in Magnetia Aſiæ, deterrimum: nam & candiduſ eſt, neque attrahit ferrum, ſimilis pumici. In eadem Aethiopia

mons haud procul gignit lapidem theamedem, cui contraria Magneti natura, ferrum omne abigens respuens. Trahitur ad Magnetem ferrum, quia sola fere materia ea vires ab eo lapide conceptas diu retinet. Aliud apprehendens ferrum, ut annuloꝝ catena uideatur: quod quidem imperitū uulgus appellat ferrū uiuum, uulneraꝝ ex tali asperiora fiunt. Lapis hic & in Cantabria eruitur. Non ille Magnes uerus caute cōtinua, sed sparsa bubbatio ne, ita appellant, nescio an uitro fundendo perinde ut utilis: nondum enim expertus est quisq; autor Plinius: ferri utiq; inficit aciem ut Magnes. Dinocrates archi tectus Alexandrie templū Arfinoes concamerare coeperat Magnete lapide: in tercessit mors & ipsius, & Ptolemæ regis, qui id fori suæ hericupierat, ut simulacrum eius & ferro pendere in aëre uideretur: quod genus præstigiæ ad superstitutionē suam Arabes commenti dicuntur in eo feretro, ubi autō eius sectæ conditus existimatur. Diogenianus Magnetem utrum argento scribere esse tam similem, ut decipiat. Nec hunc lapidē, qui ferrū ad se trahat, Magnetē, sed Heracleoten appelladū eē.

LAPIS ARABIVS. DCCCCLXXXIII.

LAPIS GALACTITES DCCCCLXXXV.

Galactites ait Plinius ex uno colore lactis est, succo quoq; eius & sapore, à quo nomen: de hac intelligat an diuersa, dubiū: quando cineris colore traditur à Dioscoride, nō lactis. Est & galaxia, quā aliqui galactitem uocant, intercurrentibus sanguineis aut candidis uenis: nam chalcia grandinum & colorem & figurā habet, unde appellata est, adamantinæq; duritiæ: narrat etiam in ignem additæ manere suū frigus. Ergo Pliniana galactites, quā aliqui & leucogeam, & sinephyten, & leucographin appellant, uidetur ei proprior quæ & morochthos, & leucographis, & galaxia Dioscoridi & Galeno dicitur, ut paulo post liquebit. Vt cunctis infantiū adalligata collo, saluam facere dicitur: in ore autē liquefcere: memoriam adimere ut in iuriarum. Mitte eam Nilus, & Achelous quoq; amnis. Sunt qui & sima ragdum albis uenis circumligatū galactiten, inquit, uocent. Est & gemma galaicos distans ab hac, argyrodamanis similis, paulo sordidior. Inueniuntur autem binæ aut senæ.

LAPIS MELITITES. DCCCCLXXXVI.

Melites lapis dictus, quia succum tonsus melicem emitat. Differt ab hoc melichros, cuius plura sunt genera: Melleus colore: differt & melitis à malo, cuius imitator colorem appellat.

LAPIS MOLOCHTHVS. DCCCCLXXXVII.

Lapis molochthos aut morochthos, siue ut Galenus & Paulus uocauit, moroxus & graphis, haud uideo cundē cum eo esse, qui molochitis à colore malux dicitur, spissius, uirens, nec translucida: reddēdis laudata signis, & infantiū custodiæ. Sic autem morochthos, quē Plinius in ore ait liquefcere, de quo in galactite diximus, ex collatione Dioscoridis subodorari potest aliquib; aliquid, dicentis mollem eum esse, diluig; facilem: ut uel idem cum Pliniano, uel similis esse uideri possit. Nominatur & morochthos Plinio, sed inter gemmas, lacte sudas portaceo. Idem autor & leucographin inter herbas collocat: nec qualis ea sit, reperisse unq; fateatur, eosdē ei esse ctus reddens, quos hoc loco Dioscorides, Galenus, ceteri: ut propterea non desint, qui Plinio quasi pro herba lapidem accepere, increpant: sed autor gra-

uissimus, alioꝝ sententiā, non suā, opere toto recitat.

LAPIS ALABASTRITES. DCCCCLXXXVIII.

Alabastrites siue onyx, in Alabaistro Aegypti circa Thebas nascitur, quē in ædificiis quoꝝ ornamentis includunt. Nascitur in Syria Damascus, candore inter cincto, uariis coloribus, ceteris omnibus candidior. Probatissimus in Carmania, mox India. Iam quidem & in Syria Asiaq; uisissim⁹ & sine ullo nitore in Cappadocia. Probatur maxime mellei coloris in uertice maculosi, atq; non translucidi. Vitia in ijs corneus color atq; candidus, & quicqd uitro simile est. Alabastrites ad unguentoꝝ fidem laudatissimus: unde uas id est onychem unguentarium uocamus, quod & Alabastrum, & Alabastrum quoq; dicitur, etiam ē uitro interim. Est & onyx inter ostrea, ut uolumine secundo patuit. Habetur & onyx gemma, in qua unguis humani similitudine candorem esse dicunt. Alabastrites porro & in Arabia montibus & Germania quoq; reperitur, ex quo & uasa potiora, & pedes lectorum, & sella delicis factæ: item amphoræ & urci cadorum magnitudine. Iam colūnx triginta duos pedes longæ. Sunt qui hac amplitudine non onychem, sed onychirin uocent. Differt ab Alabastrite alabandicus, siue alabandicus: etenim utroq; modo legitur. Color alabandico subnigra: ex rusto. Perspicuus est ut ignis, & quibusdam quasi rimulis uenisq; dehiscit. Capillos albos attritus inficit, dicitur Alabastrum Democrito & sal omnis, & calx uiua, quæ de putaminibus ouorum conficitur. Hac ipsa encephalos quoq; dicit à chymicis, & marmor Thebaicum, & Claudianum.

LAPIS THYITES. DCCCCLXXXIX.

Lapis Thyites à Plinio mortarium uocatur, quoniam thya mortariū significet, etiam acone dictum Hippocrati, ut Galeno placet.

LAPIS IYDAICVS. DCCCXC.

Hic & teolichos uocari coepit, quia calculus absumat, & à Galeno falsum existimatur.

LAPIS AMIANTVS. DCCCXCI.

Lapis amiantus ueneficis resistit omnibus præsertim magis. Hoc q; de lapide adianto dicit, texti ex eo uelā, quoq; ignis uelut aqua sordes eluat, de lapide quodā nascente in Carysto Euboræ, Strabo retulit.

LAPIS SAPPHIRVS. DCCCXCII.

Sapphiri aureis punctis collucet: coruleæ, færoq; cum purpura. Optimæ apud Medos, nusq; tamen perlicuæ: præterea inutiles sculpturæ, interuenientibus cristallinis centris. Sapphirū gemmarū inter iaspides collocant.

LAPIS MEMPHITES. DCCCXCIII.

Lapis Memphites gemmantis est naturæ.

LAPIS SELENITES. DCCCXCIII.

Selenites, fulgore melleo perspicuus: nomine accepto, quia imaginē lunæ reddat, in dies singulos augescens inueniensq; numero. Hunc semper Galenus asphroselenon appellat, chymistq; aphroselenon, etiam comarin, & à leuitate ponderis cupholithon, & argyrolithon quandoq; uocitant. Habetur & comaris apud eos Scythica pro arsenico & sulphure: itemq; pro lapide philosophico toties à nobis indicato, coarguendipotius & irridentis propositio, q̃ monstrandi. Seleniten Eustachius alium quoq; lapidem intelligit, qui & asterius & lychnis uocetur, nascens in Thracia Pallenes littoribus, autore Dionysio.

fi. Plinius lychnites ab asterio diuidit, itēq; selenite: sed ut herbas, sic & lapidū uocabula confundimus.

LAPIS IASPIDIS. DCCCCXCV.

Lapis sæpe trāllucet ac uiret. Smaragdo similis Indica est. Cypria colore glauco & pingui. Per ficia similis aëri, quæ ob id aërizusa uocatur. Thermodonica coerulesca, & Scythica inter coerulescas omnes optima. Phrygia purpurea. Cappadox ex purpureo coerulesca atq; non refulgens. Thracia Indica similis. Chalcidica turbida. Præfertur omni bus, quæ purpuræ quicq; habet: secunda, quæ rosæ: tertia, quæ smaragdi: quarta celo aut umnali matutino similis, quæ boëa appellatur & aërizusa. Similis est & Sardæ imitata & uiolæ. Non minus multæ species reliquæ, sed omnes in uitro coerulescæ, aut cristallo similes, aut pituitæ atq; muco, siue ut Plinius, myxis: item resina terebinthi, quam & terebinthi Zulfam uocant, inter coerulescas & ipsam marem existimantes: nam quæ iaspachares appellatur, ex iaspide smaragdo simili & achate proprietatem suā habet. Præstantiores sphendone, id est funda cludi solent, id est patientes nec præterq; margines auro amplectente. Vitium est & breuis nitor, & longe splendēs, & sal, & omnia quæ in cæteris gemmis. Vitro aduice rara coarguitur extra fulgorem spargendo, atq; non cōtinendo in se: nec in diuersa, quæ sphragides uocantur, quoniam optimæ omnium signent: ea quæ smaragdo similis per transferum linea candida præcingitur. Orienti familiarissima pro amuleto Garamantias uocatur, quæ pluribus polygrammos. Est & onychipuncta, quæ iaspopyx dicitur, & nubem complexa, & niues imitata, quæ stellata rutilis punctis est, & sali Megarico similis & fumida, capniæ siue capniæ appellata. Magnitudinem iaspidis undecim unciarum uidit antiquitas, effigie Neronis thoracata. Inter coerulescas post Scythicam Cypria: post quam Aegyptia. Adulceratur maxime tinctura: idēq; in gloria regum Aegypti ascribitur: eliqui primus tinxit. Inest aliquando coerulesca aureus puluis: non ut in sapphiris puncta. Galenus iaspidem medicinæ utilem chloiron iaspin, hoc est uiridem cognominat. Inscribi iussit in iaspide drā conem radios habentem Necepsos rex, ad stomachi futuram: sed idem profectus est in torque suspensio eo rudi, ita ut os stomachi attingat.

LAPIS AETITES. DCCCCXVI.

Lapis aetites, quem aliqui gagiten dixerunt, Strabo gangiten in Armenia repertum scribit, quo serpentes fugantur: hunc an alium accipiat, nondum liquet. Inædificatur nido aquilarum non tamen omnium, nihil igne deperdens: sed uis eius medica non nisi nido direpti. Aiunt binos inueniri marem & forminam: nec sine ijs parere aquilas, & ideo binos tantum. Genera eius quatuor feruntur. In Africa pusillus & mollis, ac uelut in aluo habens argillam suauem, candidam. Ipse friabilis, quem forminam existimant. In Arabia mas durus, & similis gallæ aut subrutilis, in utero continens lapidem durum. Tertius in Cypro, colore Africani, amplior tamen atq; dilatatus: cæteris enim globosa facies. Habet in aluo harenam iocundam & lapillos: ipse ram mollis, ut etiam digitis fricetur. Quarti generis Taphiusus uocatur, nascens iuxta Leucadem in Taphiua, qui locus est dextrā nauigantibus ex hac ad Leucaden, inuenitur: q; in fluminibus candidus & crocundus. Huic est in alio lapis qui uocatur callimus,

nec quicq; tenerius: nam calais aliud genus est lapidis, à quo & calainus color pro Veneto, si Phorioni credendum est. Ego etiam sordidum colorem Plinius secutus, calaini appellatione possum capere: Amplitudine, inquit, conspicua sed fistulosa & sordium plena est calais. Hic & augures à multis dicitur. Quæ uero calaina ostraca nominat Aëtius, pilos extenuantia, considerantibus relinquo. Apud chymistas uiuæ calcis aquam inuenio calaion uocari. De calaino etiam colore Dioscorides in iaspide supra mox cōteminit. Idem aëtien per chrysolitho, & porphyrite, & chrysochromo cognomine Macedonico & polychromo accipiunt.

LAPIS OPHTHES. DCCCCXCVII.

Ophites marmor est serpentium maculis simile, à quo nomen. Duo eius genera: molle, candidum: nigricans, durum. Ex ophite colum, nā nisi parua admodum inueniuntur. Inter ophites existimari ferē possunt propter colorem quod Augustinum uocant & Tiberium, in Aegypto utriusq; principis temporibus reperta. Differunt, q; maculas diuerso modo colligunt: Augusteum uero datim crispatur in uertices: Tiberium sparsim conuoluta canicie spectatur. Theophrastus lapidem Chium uocando, uidetur ophitem intellexisse: In Aegypto, inquit, nascitur lapis niger, translucidus Chio similis: quem locum Plinius ita uerbi Theophrastus, inquit, autor est, translucidos lapides in Aegypto inueniri, quos ophitæ similes aut torasse quia ut scilicet illas maculas, ut ait Plinius, primæ Chiorum lapidicinæ ostenderunt.

LAPIDES SPONGIARVM. DCCCCXCVIII.

Lapides qui nascuntur in spongijs, & ipsi uocantur spongiæ: spādam eos cytholithos uocant, quia ut sic medeantur. Sunt & pumicum in genere quos spongijs uocant, ut in pumice docuimus.

LLITHOCOLLA. DCCCCXCIX.

Lithocolle non inue signficat glutinum ex lapidibus.

LAPIS OSTRACITES. M.

Ostracites à testa nomen habet. Transiluit & ad gemmas, siquidem ut Plinio placuit, ostracitas siue ostracites altera est testacea & durior, altera achate similis: nisi quod achates politura pinguefcit. Duriori tanta uis inest, ut alæ gemmæ scalpantur fragmentis eius. Habetur & ostracides, cui ostrea nomen & similitudinem dedit.

LAPIS SMIRIS. MI.

Nora uulgo smiris uel ipso nomine: q; smiris potius q; smirin officinæ appellant, cuius fragmenis gemmæ aliæ scalpantur: quo usa Plinius secundus non smirin sed ostraciten uocauit, ut superius proxime notauimus.

HARENA LITTORVM. MII.

Harena littorum Græce psammos & ammos ægalitis uocatur. Quæ porro calculosa lapidosaq; est, acholax poëtis dicitur. Harena fecantur marmora, premente eam terra, in prætenui linea uersando, tractuq; ipso diuident. Aethiopica ad hoc maxime probatur: proxima Indica & scabrior, qua combusta poliunt marmora. Scabra est & Naxia, & acopsis quæ uocatur Aegyptia: postea inuenta est non minus probata ex quodam Adriatici maris uado æstu nudante,

obfer-

obseruatione nō facili. Fraud deinde secandi quactūq; harena fluuiatili: quæ quod crassior est, laxioribus se gmentis teritur: ita sectæ attenuantur crustæ. Polituris accommodantur Thebaica, & quæ sit est pumice aut porro lapide, hoc est tofo. De fabulo Puteolano Campano uero, item de Echrusco, quod proprie carbunculus uocatur, nihil dicitur sum, nisi quod Campanū ex uista terra, carbunculus ex cocta materia efficit, auctor Vitruuius. Romæ uulgo Puteolana dicitur harena quocunq; loco fossilis, modo quæ in calcem conueniat.

COTES.

MIII.

COtes siue lapis Naxius id est acone, sicut olearis Cotes elgacone. Diu placuit cotes ē marmo re Naxio, ut & simpliciter Naxium dicitur: ita uocant in insula Cypro genitas. Vicere postea ex Armenia. Differre putant cotem à lapide coticula, non solum inueniri nisi in Humine Timolo siue Timolo: (nam utroq; modo recte dicitur) à mōte, ut arbitror, cognomine in terra Lydia: nunc uero passim quæ alijs Heracliū & Lydium appellat. Sunt autē lēues & calculis similes, quaternas uncias longitudinis binasq; latitudinis nō excedentes: siue, ut Theophrastus inquit, calculi amplissimi, dupla magnitudine, præterea specie lata, non rotunda: quod à sole fuit in ijs, melius q̄ quod à terra. Sed & caloribus immodiis deterius respondent: fūt em̄ alpergine quadā ex alto reuocata quasi lubricæ, ut idem Theophrastus ait. Iis coriculis periti cum ē uena siue nūmo lima rauerint, experimentū protinus dicunt, q̄tum auri, q̄tum argenti aut æris habeant, scrupulari differētia, nunq; fallente ratione. Incipiētibus à minimis notis, hoc erat granū, post colybus, tum duo chalchi, dein quatuor moria, ut Theophrasti uerbis agam. Lapis et chrysitis, & basanos chrysochoice, hoc est index aurarius uocatur, quo, ut Græci aiunt, aurū explora tur obryzum sit atq; probū, an improbū uideatū: q̄q; basanistes & pro mortario quandoq; accipitur. Porro dicitur obryzū quasi abryzū, hoc est delicatū syncerumq; ut Photonis etymo utar. Vocat autem obryzū quoties simili colore rubet ignis, ut inquit Plinius: & aurum quod apyron appellant purū est, idq; habet nomē, quia igne nō egeat quale Arabicū esse Diodorus tradit: quod inter Abileos Galandosq; foditur. De Arabico auro & literæ sacre meminerūt.

LAPIS GEODEOS.

MIIII.

GEoden ex argumēto appellat, quoniam amplexus est terram.

TERRA IN COMMUNE.

MV.

Terra hoc est ȳ omnis siccā est in medicina ui, præsertim appellata georgumene hoc est agri colaris: nam terra Aegyptia ē luto eius sit. Sūt qui Aegyptiam pro singulari terra interpretēt. In nomine est & Cretica, minus pollens, & plus habens aeris q̄ cæteræ: usus ad extendas sordes argenteis uasis celebratissimus. Et Armeniæ glebæ locus siue lapis ea, siue ut Galenus mauult, terra nominē est, quia mædæcat aqua interius, nō summa tantū cute, ut lapides: uulgaro eius usu contra pestilentia quæ Galeni ætate fuit, & contra deploratos phthisicos: ob id in Africam & Alexandriā nauigare solitos. Ex Armenia Cappadociæ contermina inuehitur, ui maxime sicca, luteo colore aut pallido, teri facilis, usi modo la pidis, minimū tamen arenosa lapidosa uē, sed Samio alteri lēiore similis, uerū ponderosior ac densior. Sy

rieam zazinacha appellant, ut Aëtius inquit: urbem in cuius monte nascitur, Vagauanaga uocari: agrū in quo mons ille sit, Agaraces uulgo dici: cui similis est effectū quæ Alane cognominatur. Est & Caralania ex oppido Tauricorum peninsulæ, qua uulnera omnia sanantur. Quod autē genus cretæ sit quā Hippocrates schediada nominauit, duos discernimus, haud plane scio: quemadmodū nec illam quā cœchilium Xenophoni: alij cenchiliū uocant lapidem, ut inquit Pollux. Agricolaris duæ summx differētiæ, infinitis inter eas medijs: nigra, quæ & pinguis est: alba, quæ Græci uocant argilon, hoc est argillam, fabuloni similem ac ieiunam, sordidā, famelicam. Sunt & alia duo terræ genera: pharmacitis, hoc est medicata, cuius species Eretrias, & Samia, & rubrica, & Lemnia, & quæ sequuntur cæteræ. Metallū in quo lapides & fere quæcunq; supradiximus, orsi à cadmia.

TERRA ERETRIA.

MVI.

ERetria & Eretrias terræ suæ nomen habet. Hac Nicomachus & Parasius usi.

TERRA SAMIA.

MVII.

Terra Samia genus est candidi coloris, quædam modum & melinon, de quo in creta Melina describitur. Porro Samia quæ after uocatur, glebifior est q̄ species eius altera collyrion, utraq; tamen candida. Nascitur & in Samo quoq; Melinū, sed piciores eo quod sit ē Samo, nō uetebant, propter nimiam pinguitudinē, sed eo quod ē Melo. Accubantes effodit ibi, hoc est non stantes, sed aut in obliquū aut supini uenas scrutantur in faxis, auctore Theophrasto, quæ ut Iulius Pollux inquit, Geophania uocantur. After non nisi quarta demum aggressionē proditur.

LAPIS SAMIUS.

MVIII.

TERRA CHIA.

MIX.

TERRA SELENSIA.

MX.

SElenus lactei coloris est, eademq; lacte diluta renouandis albarijs rectoriorum probatur.

TERRA CIMOLIA.

MXI.

Terra Cimolia, siue ut Hippocrates & Pollux & Nicocharis appellat, terra mectis siue mectis ab extenu, à Cimolo quidē una Cycladū: sed tamen laudatur maxime Thesfalica. Nascitur & in Lycia circa Bubonem oppidū. Est & alius usus Cimolix in uestibus: nam Sarda quæ affertur de Sardinia, candidis tantū probatur, inutilis uersicoloribus: & est utilissima omnī Cimolix generē. Pretiosior Vmbri ca, & quā uocent saxum. Proprietas saxi q̄ crescit in macerando, atq; pondere emittit: illa uero mensura, Vmbricam nō nisi poliendis uestibus assumerebāt. Pri mum igitur uestibus abluebatur Cimolia Sarda: de in sulphure suffebatur, mox desquamatur Cimolia, quæ est coloris uerifuscatū em̄ nigrescit & effundit sulfure. Veros autē & pretiosos colores emollit Cimolia & quodā nitore exhilarat, contristatos sulfure. Candidis uestibus saxum utilius alio sulfure, inimicū coloribus. Græcis uicem Cimolix gypsum Tymphaicum implebat.

TERRA PNIGITIS.

MXII.

PNigitis nigra est, ut ampelitis, glutinosior quæ doq; Samia.

TESTAE FORNACIVM.

MXIII.

Testas ostrea uocant Græci.

TERRA YSTA.

MXIII.

Terra

Terra usta siue tosta, itemq; ruffa, quæ à Græcis catopos, & caminitis atq; pyrrha dicitur, nō ea dem est cum ea de qua Plinius ita meminit: Vsta casu primum reperta incendio, pyræ cerussa in orcis cremata, quam primus Nicias tabulis inussert. Optima nunc Asiatica habetur usta, quæ & purpurea, inquit, uocatur. Pretium eius in libras æris quinq; fit & Romæ usta cremato siliçe marmoroso, restinctu aceti, purpureo colore, ut inquit Vitruuius. Sine usta non sunt umbræ.

TERRA MELINA. MXV.
Olores prætercerussam candidi erant antiquitus duo: Melinum ab insula Cycladum Melo dictum, quod & in Samo quoq; nascitur, ut diximus. Linguam tactu siccatur omne Melinum. Taxatur in libras singulis sestertijs. Melinum porro à terra Melina, siue ut Græci appellant, Meliade atq; Melia, nihil distat. Alterum candidi genus Paretonium uocatur, nomen loci habens ex Aegypto. Spumam maris esse dicunt, solidatam cum limo: Propterea & minutas in eo spectari conchulas. Fit & in Creta insula & Cyrenis. Adulteratur Cimolia decocta conspissa atq;. Pretium optimo in pondo sex librarum, & candidis coloribus pinguiissimo & propter leuorem tenacissimo testorijs. Fuit & Smyrnæ terra Theodotios, ita nominata, quia Theodoti fundus is erat, in quo id genus cretæ primo sit inuentum: hanc Plinius inter candidas enumerat: qua ueteres, inquit, ad nauium picturas utebantur: Vitruuius inter uirides opimam credi uoluit.

TERRA AMPELITIS. MXVI.
Mpelitis bitumini est simillima: uocatur ita, quoniam uitibus quæ gemmant illitis, arce-re creditur uermes ipas siue senipas à Græcis appellatos, à nobis uolucres & conuoluolos: etiam

si uolucem aliq; duntaxat intelligunt qui prærodam pubescentes uuas. Theophrastus hanc in Cilicia coqui tradit, atq; ita lentescere, uiresq; obungere. Hæc & pharmacitis dicitur, etiamsi nomen hoc medicamentis omnibus commune est, ut inquit Galenus.

FVLIGO PICTORIA. MXVII.

Fvligo hæc à Græcis asbolon & asbole uocari solet. Inuenti sunt pictores qui è sepulchris carbones infectos effoderent, ad atramentum testorium, siue quod idem est, pictorium: sed commodius tamen fit ex fuligine, resina exusta aut pice: propter quod officinas & Laconica etiam ædificauere fumo excipiendo. Fit ex sarmentis, sed laudatissimū è tædarum schedijs: ita enim uocat assulas Vitruuius. Igitur fuligo quæ parietibus & cameræ curuaturis adhærescit, collecta, partim componitur ex gummi subactio, ad usum atramenti librarij: partim testores glutino admixto in parietibus utuntur. Adulteratur fornacium balnearumq; fuligine, quo ad uolumina scribenda utuntur. Sunt qui & uinifecem arefactam excoquant, quæ si ex bono uino fuerit, Indici speciem imitari uideatur. Polygnocus & Mycon è uinaceis fecere, tryganon uocatum. Apelles commentus est ex ebore combusto, quod elephantium uocant. Fit & è tædis ligno combusto, tritisq; in mortario carbonibus. Mira in hoc sepiarum natura, sed ex ijs non fit. Omne autem atramentum sole perficitur, librarium & testorium, glutino admixto: quod autem aceto liquefactum est, ægre eluitur.

ATRAMENTVM SCRIPTORIVM. MXVIII.

De atramento scriptorio quod & librarium uocatur, & Græce melan graphicon, dictum est in fuligine pictoria, chalcantio, melanteria,

**HERMOLAI BARBARI PATRITII VENETI ET
AQVILEIENSIS PATRIARCHÆ, CO.
ROLLARII FINIS.**